

تم تحميل وعرض المادة من

موقع حلول كتبي

المدرسة اونلاين



موقع

حلول كتبي

<https://hululkitab.co>

\*جميع الحقوق محفوظة للقائمين على العمل\*

للعودة إلى الموقع ابحث في قوقل عن : موقع حلول كتبي


قررت وزارة التعليم تدريس  
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



وزارة التعليم  
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

# رياضيات ٣



التعليم الثانوي  
(نظام المقررات)

(مسار العلوم الطبيعية)

# حلول كتبي

قام بالتأليف والمراجعة  
فريق من المتخصصين



وزارة التعليم  
Ministry of Education  
2021 - 1443

طبعة ١٤٤٣ - ٢٠٢١

## ح) وزارة التعليم ، ١٤٣٨ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر  
وزارة التعليم  
الرياضيات ٣ (كتاب الطالب) التعليم الثانوي نظام المقررات (مسار العلوم  
الطبيعية). وزارة التعليم. - الرياض ، ١٤٣٨ هـ  
٢٣٦ ص ؛ ٢٧, ٥ x ٢١ سم  
ردمك : ٤ - ٤٧٣ - ٥٠٨ - ٦٠٣ - ٩٧٨

١- الرياضيات - مناهج - السعودية  
السعودية أ. العنوان  
ديوي ٣٧٥٠, ٥١  
١٤٣٨/٤٥٧٥  
٢- التعليم الثانوي - مناهج -

رقم الايداع : ١٤٣٨/٤٥٧٥  
ردمك : ٤ - ٤٧٣ - ٥٠٨ - ٦٠٣ - ٩٧٨

### حول الغلاف

ندرس في الفصل الرابع من هذا الكتاب تمثيل دوال الجذور  
التربيعية وحلها.  
وتعدُّ حركة البندول مثلاً على دالة جذرية.



حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم  
www.moe.gov.sa

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين"



IEN.EDU.SA

تواصل بمقترحاتك لتطوير الكتاب المدرسي



FB.T4EDU.COM



# موقع الحرمين حلول كتبي







# موقع حلول كتبي



# المقدمة

تعد مادة الرياضيات من المواد الدراسية الأساسية التي تهيئ للطلاب فرص اكتساب مستويات عليا من الكفايات التعليمية، مما يتيح له تنمية قدرته على التفكير وحل المشكلات، ويساعده على التعامل مع مواقف الحياة وتلبية متطلباتها.

ومن منطلق الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين بتنمية الموارد البشرية، وعياً بأهمية دورها في تحقيق التنمية الشاملة، كان توجه وزارة التعليم نحو تطوير المناهج الدراسية وفي مقدمتها مناهج الرياضيات، بدءاً من المرحلة الابتدائية، تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، لإعداد مناهج تعليمية متطورة وسعياً للارتقاء بمخرجات التعليم لدى الطلاب، والوصول بهم إلى مصاف أقرانهم في الدول المتقدمة.

وتتميز هذه الكتب بأنها تتناول المادة بأساليب حديثة، تتوافر فيها عناصر الجذب والتشويق، التي تجعل الطالب يقبل على تعلمها ويتفاعل معها، من خلال ما تقدمه من تدريبات وأنشطة متنوعة، كما تؤكد هذه الكتب على جوانب مهمة في تعليم الرياضيات وتعلمها، تتمثل فيما يأتي:

- الترابط الوثيق بين محتوى الرياضيات وبين المواقف والمشكلات الحياتية في مختلف المجالات العلمية والصحية والمالية والتنموية وبرؤية المملكة ٢٠٣٠.
- تنوع طرائق عرض المحتوى بصورة جذابة مشوقة.
- إبراز دور المتعلم في عمليات التعليم والتعلم.
- الاهتمام بالمهارات الرياضية، والتي تعمل على ترابط المحتوى الرياضي وتجعل منه كلاً متكاملًا، ومن بينها: مهارات التواصل الرياضي، ومهارات الحس الرياضي، ومهارات جمع البيانات وتنظيمها وتفسيرها، ومهارات التفكير العليا.
- الاهتمام بتنفيذ خطوات أسلوب حل المشكلات، وتوظيف استراتيجياته المختلفة في كيفية التفكير في المشكلات الرياضية والحياتية وحلها.
- الاهتمام بتوظيف التقنية في المواقف الرياضية المختلفة.
- الاهتمام بتوظيف أساليب متنوعة في تقويم الطلاب بما يتناسب مع الفروق الفردية بينهم.

ولمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، فإن المناهج سوف توفر للمعلم مجموعة متكاملة من المواد التعليمية المتنوعة التي تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، بالإضافة إلى البرمجيات والمواقع التعليمية، التي توفر للطلاب فرصة توظيف التقنيات الحديثة والتواصل المبني على الممارسة، مما يؤكد دوره في عملية التعليم والتعلم.

ونحن إذ نقدّم هذه الكتب لأعزائنا الطلبة، لنأمل أن تستحوذ على اهتمامهم، وتلبي متطلباتهم وتجعل تعلمهم لهذه المادة أكثر متعة وفائدة.

والله ولي التوفيق.



## الدوال والمتباينات

الفصل  
1

## الفهرس

- 11 ..... التهيئة للفصل 1
- 12 ..... 1-1 خصائص الأعداد الحقيقية.
- 18 ..... 1-2 العلاقات والدوال
- 24 ..... 1-2 توسع  معمل الجبر: الدوال المنفصلة والدوال المتصلة.
- 25 ..... 1-3 دوال خاصة.
- 31 ..... اختبار منتصف الفصل
- 32 ..... 1-4 تمثيل المتباينات الخطية ومتباينات القيمة المطلقة بيانياً
- 37 ..... 1-5 حل أنظمة المتباينات الخطية بيانياً
- 43 ..... 1-5 توسع  معمل الحاسبة البيانية: أنظمة المتباينات الخطية
- 44 ..... 1-6 البرمجة الخطية والحل الأمثل
- 50 ..... دليل الدراسة والمراجعة
- 55 ..... اختبار الفصل
- 56 ..... الإعداد للاختبارات المعيارية
- 58 ..... اختبار تراكمي

# حلول كتبي

## المصفوفات

الفصل  
2

- 61 ..... التهيئة للفصل 2
- 62 ..... 2-1 مقدمة في المصفوفات
- 68 ..... 2-1 توسع  معمل الجداول الإلكترونية: تنظيم البيانات
- 69 ..... 2-2 العمليات على المصفوفات
- 75 ..... 2-3 ضرب المصفوفات
- 82 ..... اختبار منتصف الفصل
- 83 ..... 2-4 المحددات وقاعدة كرامر
- 91 ..... 2-5 النظير الضربي للمصفوفة وأنظمة المعادلات الخطية
- 97 ..... 2-5 توسع  معمل الحاسبة البيانية: المصفوفات الموسعة
- 98 ..... دليل الدراسة والمراجعة
- 101 ..... اختبار الفصل
- 102 ..... الإعداد للاختبارات المعيارية
- 104 ..... اختبار تراكمي





## كثيرات الحدود ودوالها

الفصل  
3

107	التهيئة للفصل 3
108	3-1 الأعداد المركبة
115	3-2 القانون العام والمميز
123	توسع 3-2  معمل الجبر: مجموع الجذرين وحاصل ضربهما
125	3-3 العمليات على كثيرات الحدود
131	3-4 قسمة كثيرات الحدود
137	اختبار منتصف الفصل
138	3-5 دوال كثيرات الحدود
145	3-6 حل معادلات كثيرات الحدود
153	توسع 3-6  معمل الحاسبة البيانية: حل متباينات كثيرات الحدود
154	3-7 نظريتا الباقي والعوامل
160	3-8 الجذور والأصفار
167	دليل الدراسة والمراجعة
171	اختبار الفصل
172	الإعداد للاختبارات المعيارية
174	اختبار تراكمي

## حلول كئبي

## العلاقات والدوال العكسية والجذرية

الفصل  
4

177	التهيئة للفصل 4
178	4-1 العمليات على الدوال
185	4-2 العلاقات والدوال العكسية
190	توسع 4-2  معمل الحاسبة البيانية: الدالة العكسية
191	4-3 دوال ومتباينات الجذر التربيعي
196	4-4 الجذر النوني
201	توسع 4-4  معمل الحاسبة البيانية: تمثيل دالة الجذر النوني بيانياً
202	اختبار منتصف الفصل
203	4-5 العمليات على العبارات الجذرية
209	4-6 الأسس النسبية
215	4-7 حل المعادلات والمتباينات الجذرية
221	توسع 4-7  معمل الحاسبة البيانية: حل المعادلات والمتباينات الجذرية
223	دليل الدراسة والمراجعة
228	اختبار الفصل
229	الإعداد للاختبارات المعيارية
231	اختبار تراكمي
233	الصيغ والرموز



ستركز في دراستك هذا العام على عدة موضوعات رياضية، تشمل ما يأتي:

- الدوال وخصائصها.
- المتباينات وتمثيلها بيانياً.
- المصفوفات والعمليات عليها.
- كثيرات الحدود والعمليات عليها.
- نظريتا الباقي والعوامل واستعمالهما.
- العلاقات والدوال العكسية والجذرية.

وفي أثناء دراستك، ستتعلم طرائق لحل المسائل الجبرية وتمثيلها بصور متعددة وسوف تفهم لغة الرياضيات وتستعمل أدواتها، وتنمي قدراتك الذهنية وتفكيرك الرياضي.

# حلول كتبي





## كيف تستعمل كتاب الرياضيات؟

- اقرأ فقرة **فيما سبق** لتعرف ارتباط هذا الدرس بما درسته من قبل، ولتعرف أفكار الدرس الجديد اقرأ فقرة **والآن**.
- ابحث عن **المفردات** المظللة باللون الأصفر باللغتين العربية والإنجليزية، وقرأ تعريف كل منها.
- راجع المسائل الواردة في **مثال** والمحلولة بخطوات تفصيلية؛ لتوضيح أفكار الدرس الرئيسة.
- تذكر بعض المفردات التي تعلمتها من قبل، بالرجوع إلى فقرة **مراجعة المفردات**
- ارجع إلى المثال المشار إليه مقابل بعض التمارين في فقرتي **تأكد** و **تدرب وحل المسائل** ليساعدك على حل هذه التمارين وما شابهها.
- استعن بأسئلة **تدريب على اختبار** لتتعرف بعض أنماط أسئلة الاختبارات.
- ارجع إلى **مراجعة تراكمية** لتراجع أفكار الدروس السابقة.
- ارجع إلى **إرشادات للدراسة** حيث تجد معلومات وتوجيهات تساعدك في متابعة الأمثلة المحلولة.
- ارجع إلى فقرة **قراءة الرياضيات**؛ لتذكر نطق بعض الرموز والمصطلحات الرياضية.
- ارجع إلى فقرة **تنبيه!** دائماً لتعرف الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الطلاب حول بعض المفاهيم الرياضية فتجنبها.
- نفذ **اختبار الفصل** في نهاية كل فصل، بعد أن تراجع أفكار الدرس مستفيداً مما دونته من أفكار في **المسطويات**
- استعن بصفحتي **الإعداد للاختبارات**؛ لتتعرف أنواع أسئلة الاختبارات وبعض طرق حلها.
- نفذ **الاختبار التراكمي** في نهاية كل فصل لمراجعة الأفكار الرئيسة للفصل وما قبله من فصول.





# الدوال والامتباينات

## Functions and Inequalities

### الفصل 1



#### فيما سبق:

درست حل المعادلات والامتباينات الخطية.

#### والآن:

- أستعمل معادلات العلاقات والدوال.
- أحل أنظمة الامتباينات الخطية بيانياً.
- أحل مسائل من واقع الحياة مستعملاً البرمجة الخطية.

#### لماذا؟

**مصانع:** تسعى المصانع عادة لتحقيق أعلى ربح ممكن، ويتطلب ذلك من إدارتها إتقان مهارات رياضية معينة لتخفيض التكلفة، وفي هذا الفصل ستتعلم كيفية زيادة الربح أو تقليل التكلفة لتحقيق أكبر ربح ممكن من خلال استعمال البرمجة الخطية.

#### منظم أفكار

### المطويات

الدوال والامتباينات: اعمل هذه المطوية لتساعدك على تنظيم ملاحظتك حول الدوال والامتباينات. مبتدئاً بثلاث أوراق من دفتر الملاحظات.

- 1 اطوكل ورقة من المنتصف.
- 2 قُصّ الأوراق مع خط الطي، ثم ثبت أنصاف الأوراق الست الناتجة لتحصل على كُتيبٍ صغير.
- 3 قُصّ أطراف الأوراق، بحيث تترك سطرين من طرف الورقة الأولى و4 أسطر من طرف الورقة الثانية وهكذا.
- 4 سمّ طرف كل ورقة برقم درس من دروس الفصل، واكتب عنوان الفصل.







## التهيئة للفصل 1

تشخيص الاستعداد:

أجب عن الاختبار الآتي، وارجع إلى "المراجعة السريعة" : لمساعدتك على ذلك.

### مراجعة سريعة

#### مثال 1

أوجد ناتج:  $\left(\frac{3}{16}\right)\left(-\frac{4}{5}\right)$ .

اقسم العددين 16 , 4 على قاسمهما المشترك الأكبر (4)

→ اضرب البسطين  
→ اضرب المقامين

$$= \left(\frac{3}{4}\right)\left(-\frac{1}{5}\right)$$

بسّط



#### مثال 2


أوجد قيمة العبارة  $3a^2 - 2ab + b^2$  إذا كانت:

$$b = -3, a = 4$$

$$\begin{aligned} 3a^2 - 2ab + b^2 &= 3(4^2) - 2(4)(-3) + (-3)^2 \\ &= 3(16) - 2(4)(-3) + 9 \\ &= 48 - (-24) + 9 \\ &= 48 + 24 + 9 \\ &= 81 \end{aligned}$$

#### مثال 3

مثّل في المستوي الإحداثي  $y = 3x - 2$  بيانيًا.



كوّن جدولًا يتضمن قيمتين على الأقل للإحداثي  $x$ ، وأوجد الإحداثي  $y$  لكلٍّ منهما، ثم كوّن أزواجًا مرتبة ومثلها بيانيًا.

$x$	$y$	$(x, y)$
0	-2	(0, -2)
1	1	(1, 1)

### اختبار سريع

أوجد الناتج في كلٍّ مما يأتي: (تستعمل مع الدروس 1-1 إلى 1-6)

(1)  $15.7 + (-3.45)$  (2)  $-18.54 - (-32.05)$

(3)  $(-9.8)(6.75)$  (4)  $4 \div (-0.5)$

(5)  $3\frac{2}{3} + \left(-1\frac{4}{5}\right)$  (6)  $\frac{54}{7} - \frac{26}{6}$

(7)  $\left(\frac{6}{5}\right)\left(-\frac{10}{9}\right)$  (8)  $-3 \div \frac{7}{8}$

(9) **صناعات يدوية:** تحتاج فاطمة إلى  $\frac{7}{8}$  m من الخيوط لصنع رباط شعر، فكم مترًا من الخيوط يلزمها لصنع 12 رباطًا؟

أوجد قيمة كلٍّ عبارة فيما يأتي إذا كانت:

(تستعمل مع الدروس 1-1 إلى 1-6)  $a = -3, b = 4, c = -2$

(10)  $4a - 3$  (11)  $2b - 5c$

(12)  $b^2 - 3b + 6$  (13)  $\frac{2a + 4b}{c}$

(14) **اتصالات:** تستعمل إحدى شركات الاتصالات العبارة

$$20 + 0.25m$$

الاتصال. أوجد تكلفة 80 دقيقة اتصال.

مثّل في المستوي كل مستقيم مما يأتي بيانيًا: (يستعمل مع

الدروس 1-3 إلى 1-6)

(15)  $y = 3$  (16)  $x + y = 1$

(17)  $3x - y = 6$  (18)  $x + 2y = 5$

(19)  $y = 4x - 1$  (20)  $5x - 4y = 12$

(21) **مشتريات:** اشترى صلاح ثلاجة بالتقسيط، على أن

يدفع 900 ريال دفعة أولى، ويدفع 400 ريال كل شهر.

اكتب معادلة للمبلغ الكلي الذي سيدفعه بعد  $x$  شهرًا، ثم

مثلها بيانيًا.





## خصائص الأعداد الحقيقية Properties of Real Numbers

### أنواع الكرات



### لماذا؟

يبيع محل للأدوات الرياضية 3 أنواع من الكرات بالسعر نفسه. إن شراء عدة أنواع لكل منها السعر نفسه يسهل عليك إيجاد المبلغ الإجمالي للشراء، وذلك باستعمال خاصية توزيع الضرب على الجمع.

### فيما سبق:

درست الأعداد الحقيقية، والعمليات عليها. (مهارة سابقة)

### والآن:

- أصنف الأعداد الحقيقية.
- أستعمل خصائص الأعداد الحقيقية لتبسيط قيم العبارات الجبرية.

### المفردات

#### الأعداد الحقيقية

real numbers

#### الأعداد النسبية

rational numbers

#### الأعداد غير النسبية

irrational numbers

#### الأعداد الصحيحة

integers

#### الأعداد الكلية

whole numbers

#### الأعداد الطبيعية

natural numbers

### الأعداد الحقيقية: تتضمن الأعداد الحقيقية مجموعات مختلفة من الأعداد منها:

- الأعداد النسبية هي الأعداد التي يمكن كتابتها على الصورة  $\frac{a}{b}$ ، حيث  $a$  و  $b$  عددان صحيحان، والعدد  $b$  لا يساوي صفراً. وتكون الصورة العشرية للعدد النسبي إما عدداً عشرياً منتهياً أو دورياً.
- الأعداد غير النسبية وتكون الصورة العشرية للعدد غير النسبي ليست منتهية وليست دورية. لذا فإن الجذور التربيعية للأعداد التي ليست مربعات كاملة هي أعداد غير نسبية.
- مجموعة الأعداد الصحيحة هي:  $\{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}$ ، ومجموعة الأعداد الكلية هي:  $\{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots \}$ . ومجموعة الأعداد الطبيعية هي:  $\{ 1, 2, 3, 4, 5, \dots \}$ ، وكل منها مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد النسبية؛ وذلك لأن كل عدد صحيح  $n$  يمكن كتابته على الصورة  $\frac{n}{1}$ .


أضف إلى

مطوبتك

### الأعداد الحقيقية (R)

### مفهوم أساسي

#### الأعداد الحقيقية R



أمثلة	المجموعة	الرمز
$0.125, -\frac{7}{8}, \frac{2}{3} = 0.66\dots$	الأعداد النسبية	Q
$\pi = 3.14159\dots$ $\sqrt{3} = 1.73205\dots$	الأعداد غير النسبية	I
$-5, 17, -23, 8$	الأعداد الصحيحة	Z
$2, 96, 0, \sqrt{36}$	الأعداد الكلية	W
$3, 17, 6, 86$	الأعداد الطبيعية	N

### مثال 1

#### تصنيف الأعداد

حدّد مجموعات الأعداد التي ينتمي إليها كل عدد مما يأتي:

- (a)  $-23$  مجموعة الأعداد الصحيحة (Z)، مجموعة الأعداد النسبية (Q)، مجموعة الأعداد الحقيقية (R)
- (b)  $\sqrt{50}$  مجموعة الأعداد غير النسبية (I)، مجموعة الأعداد الحقيقية (R)
- (c)  $-\frac{4}{9}$  مجموعة الأعداد النسبية (Q)، مجموعة الأعداد الحقيقية (R)

#### تحقق من فهمك

(1A)  $-185$

(1B)  $-\sqrt{49}$

(1C)  $\sqrt{95}$

(1D)  $\frac{6}{7}$



### إرشادات للدراسة

#### تصنيف الأعداد

يمكن أن ينتمي العدد إلى أكثر من مجموعة أعداد، فمثلاً يُعدّ أي عدد طبيعي عدداً كلياً وصحيحاً، ونسبياً، وحقيقياً.



خصائص الأعداد الحقيقية: يلخص الجدول الآتي بعض خصائص الأعداد الحقيقية:

ملخص المفهوم		أضف الى
<b>خصائص الأعداد الحقيقية</b>		
لأي أعداد حقيقية $a, b, c$ فإن:		
الخاصية	الجمع	الضرب
التبديلية	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
التجميعية	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
العنصر المحايد	$a + 0 = a = 0 + a$	$a \cdot 1 = a = 1 \cdot a$
النظير	$a + (-a) = 0 = (-a) + a$	$a \cdot \frac{1}{a} = 1 = \frac{1}{a} \cdot a, a \neq 0$
الانغلاق	$(a + b)$ عدد حقيقي	$(a \cdot b)$ عدد حقيقي
التوزيع	$a(b + c) = ab + ac, (b + c)a = ba + ca$	

### مثال 2 تمييز خصائص الأعداد الحقيقية

ما الخاصية الموضحة في:  $5 \cdot (4 \cdot 13) = (5 \cdot 4) \cdot 13$  ؟

الخاصية التجميعية في عملية الضرب.

وتنص الخاصية التجميعية لعملية الضرب على أن ناتج الضرب لا يتأثر بالطريقة التي يتم بها تجميع العوامل.

تحقق من فهمك

$$(2) \quad 2(x + 3) = 2x + 6 \quad ?$$

يمكنك إيجاد النظير الجمعي لأي عدد، والنظير الضربي لأي عدد حقيقي لا يساوي الصفر.

### مثال 3 النظير الجمعي و النظير الضربي

أوجد النظير الجمعي والنظير الضربي للعدد  $-\frac{5}{8}$

$$\text{بما أن } -\frac{5}{8} + \frac{5}{8} = 0, \text{ فإن النظير الجمعي للعدد } -\frac{5}{8} \text{ هو } \frac{5}{8}$$

$$\text{وبما أن } \left(-\frac{5}{8}\right)\left(-\frac{8}{5}\right) = 1, \text{ فإن النظير الضربي للعدد } -\frac{5}{8} \text{ هو } -\frac{8}{5}$$

تحقق من فهمك

$$(3B) \quad 2\frac{1}{2}$$

$$(3A) \quad 1.25$$

#### إرشادات للدراسة

**النظير الجمعي والنظير الضربي**  
إشارة النظير الجمعي لعدد هي عكس إشارة ذلك العدد، أما إشارة النظير الضربي لعدد فهي ذاتها إشارة ذلك العدد.





تتطلب الكثير من التطبيقات الحياتية التعامل مع الأعداد الحقيقية.

### مثال 4 من واقع الحياة خاصة التوزيع

السعر (بالريال)	الجهاز أو الملحق
1000	حاسوب
600	شاشة
500	آلة طباعة
150	كاميرا رقمية
300	برمجيات ملحقة

**مبيعات:** يبين الجدول المجاور أسعار جهاز حاسوب وملحقاته في أحد العروض. فإذا زاد السعر الأصلي للجهاز وملحقاته، بنسبة 6% فأوجد قيمة هذه الزيادة.

يمكن إيجاد قيمة هذه الزيادة بطريقتين هما:

**الطريقة 1:** اضرب ثم اجمع .

اضرب كل قيمة في 6%، أو 0.06، ثم اجمع.

$$T = 0.06(1000) + 0.06(600) + 0.06(500) + 0.06(150) + 0.06(300)$$

$$= 60 + 36 + 30 + 9 + 18$$

$$= 153$$

**الطريقة 2:** اجمع ثم اضرب .

أوجد السعر الكلي لجهاز الحاسوب وملحقاته قبل الزيادة، ثم اضربه في العدد 0.06

$$T = 0.06(1000 + 600 + 500 + 150 + 300)$$

$$= 0.06(2550)$$

$$= 153$$

فتكون قيمة الزيادة 153 ريالاً. لاحظ أن النتيجة متساوية في الطريقتين.

اليوم	ساعات العمل
الأحد	4
الاثنين	3
الثلاثاء	2.5
الأربعاء	3
الخميس	4

تحقق من فهمك

**(4) أعمال:** يتقاضى أحمد 20 ريالاً عن كل ساعة عمل في محل تجاري. فإذا كانت ساعات عمله في أحد الأسابيع هي 4، 3، 2.5، 3، 4، فما المبلغ الذي حصل عليه أحمد في ذلك الأسبوع؟

يمكنك استعمال خصائص الأعداد الحقيقية لتبسيط العبارات الجبرية.

### مثال 5 تبسيط العبارات الجبرية

بسط العبارة:  $3(2q + r) + 5(4q - 7r)$

$$3(2q + r) + 5(4q - 7r) = 3(2q) + 3(r) + 5(4q) - 5(7r)$$

$$= 6q + 3r + 20q - 35r$$

$$= 6q + 20q + 3r - 35r$$

$$= (6 + 20)q + (3 - 35)r$$

$$= 26q - 32r$$

خاصية التوزيع  
اضرب  
الخاصية التبديلية للجمع  
خاصية التوزيع  
بسط

تحقق من فهمك

**(5)**  $3(4x - 2y) - 2(3x + y)$



### الربط مع الحياة

زادت ملحقات أجهزة الحاسوب على نحو مطرد في السنوات الأخيرة، حتى أصبح الحاسوب يقوم مقام الكثير من الأجهزة الإلكترونية كآلات التصوير والتسجيل وغيرها.





مثال 1 حدّد مجموعات الأعداد التي ينتمي إليها كل عدد مما يأتي:

(1) 62 (2)  $\frac{5}{4}$  (3)  $\sqrt{11}$  (4) -12

مثال 2 ما الخاصية الموضّحة في كلّ ممّا يأتي؟

(5)  $(6 \cdot 8) \cdot 5 = 6 \cdot (8 \cdot 5)$  (6)  $7(9 - 5) = 7 \cdot 9 - 7 \cdot 5$   
 (7)  $84 + 16 = 16 + 84$  (8)  $(12 + 5)6 = 12 \cdot 6 + 5 \cdot 6$

مثال 3 أوجد النظير الجمعي والنظير الضربي لكل عدد مما يأتي:

(9) -7 (10)  $\frac{4}{9}$  (11) 3.8 (12)  $\sqrt{5}$

مثال 4 (13) تخفيضات: يبين الجدول المجاور أسعار أربعة أصناف من الملابس في أحد العروض. فإذا زاد السعر الأصلي لكلّ منها بنسبة 8% فأوجد قيمة هذه الزيادة.

الصنف	السعر (بالريال)
قميص	40
بنطال	60
ثوب	100
معطف	200

مثال 5 بسّط كل عبارة مما يأتي:

(14)  $5(3x + 6y) + 4(2x - 9y)$  (15)  $6(6a + 5b) - 3(4a + 7b)$

(16)  $-4(6c - 3d) - 5(-2c - 4d)$  (17)  $-5(8x - 2y) - 4(-6x - 3y)$

### تدرب وحل المسائل

مثال 1 حدّد مجموعات الأعداد التي ينتمي إليها كل عدد مما يأتي:

(18)  $-\frac{4}{3}$  (19) -8.13 (20)  $\sqrt{25}$  (21)  $0.6\bar{1}$   
 (22)  $\frac{9}{3}$  (23)  $-\sqrt{144}$  (24)  $\frac{21}{7}$  (25)  $\sqrt{17}$

مثال 2 ما الخاصية الموضّحة في كلّ ممّا يأتي؟

(26)  $-7y + 7y = 0$  (27)  $8\sqrt{11} + 5\sqrt{11} = (8 + 5)\sqrt{11}$   
 (28)  $(16 + 7) + 23 = 16 + (7 + 23)$  (29)  $(\frac{22}{7})(\frac{7}{22}) = 1$

مثال 3 أوجد النظير الجمعي والنظير الضربي لكل عدد مما يأتي:

(30) -8 (31) 12.1 (32) -0.25  
 (33)  $\frac{6}{13}$  (34)  $-\frac{3}{8}$  (35)  $\sqrt{15}$

مثال 4 (36) ترشيد: يبين الجدول المجاور أوجه إنفاق إحدى الأسر خلال شهر. إذا قررت الأسرة ترشيد إنفاقها بنسبة 15% من كل وجه لشراء سيارة جديدة، فما مقدار ما توفره في الشهر؟

وجه الإنفاق	المبلغ (بالريال)
الطعام والشرب	3000
المواصلات	1000
الفواتير	500
أخرى	750



مثال 5

بسّط كل عبارة مما يأتي:

$$-2a + 9d - 5a - 6d \quad (38)$$

$$8b - 3c + 4b + 9c \quad (37)$$


$$6(9a - 3b) - 8(2a + 4b) \quad (40)$$

$$4(4x - 9y) + 8(3x + 2y) \quad (39)$$

$$-5(10x + 8z) - 6(4x - 7z) \quad (42)$$

$$-2(-5g + 6k) - 9(-2g + 4k) \quad (41)$$

(43) **كرة قدم:** وضح خاصية التوزيع من خلال كتابة عبارتين تمثلان مساحة الملعب في الشكل أدناه. ثم أوجد مساحته.



السعر (بالريال)	نوع السلعة
170	جهاز تسجيل
350	مكنسة
110	مروحة

(44) **تخفيضات:** يبين الجدول المجاور أسعار بعض الأجهزة الكهربائية في محل. فإذا انخفض سعر كل منها بنسبة 30%، وأراد أحمد أن يشتري من ذلك المحل جهاز تسجيل ومكنسة ومروحة.

(a) وضح خاصية التوزيع من خلال كتابة عبارتين تمثل كل منهما المبلغ الذي سيدفعه أحمد.

(b) احسب المبلغ الذي سيدفعه أحمد بطريقتين مختلفتين مستعملاً خصائص العمليات على الأعداد.

بسّط كل عبارة مما يأتي:

$$\frac{2}{5}(6c - 8d) + \frac{3}{4}(4c - 9d) \quad (46)$$

$$\frac{1}{3}(5x + 8y) + \frac{1}{4}(6x - 2y) \quad (45)$$

$$-9(3x + 8y) - 3(5x + 10z) \quad (48)$$

$$-6(3a + 5b) - 3(6a - 8c) \quad (47)$$

(49) **ديكور:** يريد محمد شراء 5 ستائر لنوافذ منزله: نافذتان كبيرتان، و 3 نوافذ صغيرة. فإذا كانت النافذة الكبيرة تحتاج إلى ستارة طولها  $3\frac{3}{4}m$  من القماش، في حين تحتاج النافذة الصغيرة إلى ستارة طولها  $2\frac{1}{3}m$  من القماش.

(a) كم متراً من القماش يحتاج إليه محمد؟

(b) استعمل خصائص الأعداد الحقيقية لتبين كيف يمكن لمحمد حساب كمية القماش التي يحتاج إليها ذهنياً.

(50) **تمثيلات متعددة:** مستعملاً الأعداد:  $-\sqrt{6}, 3, \frac{-15}{3}, 4.1, \pi, 0, \frac{3}{8}, \sqrt{36}$ . أجب عما يأتي:

(a) **جدولياً:** نظم هذه الأعداد في جدول وفقاً لمجموعة الأعداد التي تنتمي إليها.

(b) **جبرياً:** اكتب كل عدد من الأعداد أعلاه على الصورة العشرية، ثم رتبها تصاعدياً.

(c) **بيانياً:** مثل هذه الأعداد على خط الأعداد.

(d) **لفظياً:** اكتب تخميناً حول ترتيب الأعداد الحقيقية باستعمال الصورة العشرية لها.

### مسائل مهارات التفكير العليا

(51) ما العدد المختلف عن باقي الأعداد؟ وضح إجابتك.

$$\sqrt{81}$$

$$\sqrt{67}$$

$$\sqrt{35}$$

$$\sqrt{21}$$

(52) **تحذّر:** أوجد قيمة العبارة  $48(30r + 36t)$  بدلالة  $w$ ، علمًا بأن  $w = 12(5r + 6t)$ .

(53) **اكتشف الخطأ:** بسّطت كلٌّ من فاطمة وخديجة العبارة:  $4(14a - 10b) - 6(b + 4a)$ . فهل أيٌّ منهما تبسيطها صحيح؟ وضح إجابتك.

**خديجة**

$$\begin{aligned} &4(14a - 10b) - 6(b + 4a) \\ &= 56a - 40b - 6a - 24b \\ &= 50a - 64b \end{aligned}$$

**فاطمة**

$$\begin{aligned} &4(14a - 10b) - 6(b + 4a) \\ &= 56a - 40b - 6b + 24a \\ &= 80a - 46b \end{aligned}$$

(54) **تبرير:** هل العبارة الآتية صحيحة أحيانًا، أو صحيحة دائمًا، أو غير صحيحة أبدًا. وضح إجابتك.

"العدد غير النسبي يتضمن رمز الجذر".

(55) **مسألة مفتوحة:** حدّد إذا كانت خاصية الانغلاق للضرب تنطبق على الأعداد غير النسبية. وإذا لم تكن كذلك، فأعط مثالًا مضادًا.

(56) **اكتب:** اشرح وأعط أمثلة توضح أن عمليتي الطرح والقسمة لا تحققان الخاصية التبادلية.

### تدريب على اختبار

(58) ما أبسط صورة للعبارة:  $2(x - y) - 3(y - 2x)$ ؟

**C**  $-4y$

**A**  $5x - 8y$

**D**  $-4x - 5y$

**B**  $8x - 5y$

(57) ما الحد العاشر في المتتابعة  $2, 4, 7, 11, 16, \dots$ ؟

**C** 56

**A** 46

**D** 72

**B** 67

### مراجعة تراكمية

(59) أوجد قيمة:  $8(4 - 2)^3$ . (مهارة سابقة)

أوجد ناتج الضرب في كلٍّ مما يأتي: (مهارة سابقة)

(61)  $(b - 7)(b - 3)$

(60)  $(x + 2)(x - 3)$

أوجد قيمة كلٍّ مما يأتي؛ علمًا بأن  $a = 3, b = \frac{2}{3}, c = -1.7$ . (مهارة سابقة)

(63)  $\frac{a \cdot b}{c}$

(62)  $\frac{1}{6}b + 1$







# العلاقات والدوال

## Relations and Functions

# 1-2

### لماذا؟

يبين الجدول أدناه المعدل الشهري التقريبي لأعلى درجة حرارة وأدناها في مدينة الرياض، لاحظ أن معدل كل من درجتي الحرارة الدنيا والعليا لكل شهر يمكن تمثيله بزواج مرتب. فعلى سبيل المثال، يمكن تمثيل معدلي درجات الحرارة لشهر يناير بالزوج المرتب (9, 20).

### فيما سبق:

درست تحديد كل من مجال ومدى علاقة معطاة. (مهارة سابقة)

### والآن:

أحلل العلاقات والدوال. أستعمل معادلات العلاقات والدوال.

### المفردات

الدالة المتباينة

one-to-one function

العلاقة المنفصلة

discrete relation

العلاقة المتصلة

continuous relation

اختبار الخط الرأسي

vertical line test

المتغير المستقل

independent variable

المتغير التابع

dependent variable

رمز الدالة

function notation

معدل درجات الحرارة الشهرية (°C) في مدينة الرياض

الشهر	يناير	فبراير	مارس	إبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الدنيا	9	11	15	20	26	28	29	29	26	21	15	11
العليا	20	23	27	33	39	42	43	43	40	35	27	22

العلاقات والدوال: تذكر أن الدالة هي علاقة يرتبط فيها كل عنصر في المجال بعنصر واحد فقط في المدى.

**مفهوم أساسي** الدالة المتباينة

**الدالة المتباينة:** هي دالة يرتبط فيها كل عنصر من المجال بعنصر مختلف من المدى، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يرتبط عنصران من المجال بالعنصر نفسه من المدى.

المجال

1  
2  
3

المدى

D  
B  
A

أضف إلى مطوبتك

### مثال 1 المجال والمدى

حدّد مجال كل علاقة فيما يأتي ومداهما، وبيّن ما إذا كانت دالة أم لا، وإذا كانت كذلك فهل هي متباينة أم لا؟


(a)  $\{(-6, -1), (-5, -9), (-3, -7), (-1, 7), (-6, -9)\}$

المجال =  $\{-6, -5, -3, -1\}$  المدى =  $\{-9, -7, -1, 7\}$

هل هي دالة: لا، لأن العنصر -6 في المجال ارتبط بكل من العنصرين -9, -1 في المدى.

المجال =  $\{-2, -1, 2, 3\}$

المدى =  $\{-2, -1, 0, 4\}$



وهي متباينة؛ لأن كل

هذه العلاقة دالة؛ لأن كل عنصر في المجال ارتبط بعنصر واحد فقط من المدى. وعنصر من المدى ارتبط بعنصر واحد فقط من المجال.

### إرشادات للدراسة

**العلاقة:** تمثل العلاقة

عادة على شكل أزواج

مرتبة  $(x, y)$ ، كما يمكن

وصفها بعدة طرق أخرى،

منها المخطط السهمي،

والجدول، والتمثيل

البياني.

**المجال:** مجموعة

إحداثيات  $x$  في الأزواج

المرتبة الممثلة للعلاقة.



**المدى:** مجموعة

إحداثيات  $y$  في الأزواج


المرتبة الممثلة للعلاقة.



تحقق من فهمك



العلاقة التي يكون فيها المجال مجموعة من العناصر المنفردة، وتمثل بيانياً بنقاطٍ منفصلة، مثل العلاقة A أدناه تسمى **علاقة منفصلة**. لاحظ أن تمثيلها البياني يتكون من نقاط غير متصلة، والعلاقة التي يكون مجالها فترة جزئية من الأعداد الحقيقية وأمكن تمثيلها بيانياً بمستقيم أو بمنحنى متصل مثل العلاقة B أدناه، فإنها تكون **علاقة متصلة**.



إرشادات للدراسة

**العلاقة المتصلة**  
يمكنك تمثيل العلاقة المتصلة بيانياً دون رفع القلم عن الورقة.

يمكنك استعمال **اختبار الخط الرأسي** مع كل من العلاقات المتصلة والمنفصلة لمعرفة إذا كانت العلاقة دالة أم لا.

أضف إلى مطوبتك

مفهوم أساسي اختبار الخط الرأسي

التعبير اللفظي: إذا لم يقطع أي خط رأسي التمثيل البياني للعلاقة بأكثر من نقطة، فالعلاقة دالة.

النموذج:

إذا قطع خط رأسي التمثيل البياني للعلاقة في أكثر من نقطة فالعلاقة ليست دالة.


وزارة التعليم

Ministry of Education

2021 - 1443



## مثال 2 من واقع الحياة تمييز العلاقة



**حوادث المرور:** يبين التمثيل البياني المجاور أعداد الوفيات في إحدى مدن المملكة نتيجة الحوادث المرورية من عام 1433 هـ إلى عام 1437 هـ، هل العلاقة التي يمثلها منفصلة أم متصلة؟ وهل تمثل دالة؟

بما أن التمثيل البياني مكون من نقاط منفصلة، فالعلاقة منفصلة. وباستعمال اختبار الخط الرأسي نلاحظ أنه لا يمكن رسم أي خط رأسي يمر بأكثر من نقطة من نقاط التمثيل، إذن فالعلاقة تمثل دالة.

تحقق من فهمك

**2 عمال:** إذا كان عدد العاملين في إحدى المؤسسات في الأعوام من 1433 هـ إلى 1438 هـ على الترتيب هو: 33, 34, 35, 36, 37, 38. مثل هذه البيانات بيانياً، وهل العلاقة التي تمثلها هذه البيانات منفصلة أم متصلة. وهل تمثل دالة؟




### الربط مع الحياة

هل تعلم أن لكل 8 حوادث مرورية في المملكة العربية السعودية يحدث 6 إصابات، بينما النسبة العالمية إصابة واحدة لكل 8 حوادث؟

**معادلات العلاقات والدوال:** يمكنك تمثيل العلاقات والدوال بمعادلات، وقيم المتغيرين  $x, y$  في المعادلة هي مجموعة الأزواج المرتبة  $(x, y)$  التي تحقق المعادلة. ومن السهل في أغلب الأحيان تحديد إذا كانت المعادلة تمثل دالة من خلال تمثيلها البياني.

## مثال 3 تمثيل العلاقة بيانياً

مثل المعادلة  $y = \frac{1}{2}x - 3$  بيانياً، ثم حدّد مجالها ومداهما، وحدّد ما إذا كانت تمثل دالة أم لا، وإذا كانت كذلك، فهل هي متباينة أم لا؟ ثم حدّد ما إذا كانت منفصلة أم متصلة. كوّن جدولاً لبعض القيم التي تحقق المعادلة، ثم مثل المعادلة بيانياً.



x	y
-4	-5
-2	-4
0	-3
2	-2
4	-1

مجال هذه العلاقة ومداهما هو مجموعة الأعداد الحقيقية، لأن أي عدد حقيقي يمكن أن يكون الإحداثي  $x$  لنقطة ما على المستقيم، كما أن أي عدد حقيقي أيضاً يمكن أن يكون الإحداثي  $y$  لنقطة ما على المستقيم.

التمثيل البياني للعلاقة يحقق اختبار الخط الرأسي؛ لذا فإن المعادلة تمثل دالة؛ لأن كل قيمة لـ  $x$  ترتبط بقيمة واحدة فقط لـ  $y$ .

وحيث إن كل قيمة لـ  $y$  مرتبطة بقيمة واحدة فقط لـ  $x$ ، لذا فالدالة متباينة. وبما أن التمثيل البياني عبارة عن مستقيم متصل دون انقطاع، فالدالة متصلة.

تحقق من فهمك

$$y = x^2 + 1 \quad (3)$$

### إرشادات للدراسة

#### تمثيل الدالة بيانياً

لتمثل دالة ما بيانياً، أولاً يجب أن تحدّد مجالها (جميع قيم  $x$  التي تكون عندها الدالة معرفة أي قيم  $x$  التي تكون عندها  $f(x) \in \mathbb{R}$ ، وهذا يمكنك من معرفة بعض الأزواج المرتبة التي تسهل عليك تمثيل الدالة بيانياً. ثم تحدّد مداهما (جميع قيم  $y$  التي تقابل قيم  $x$ ) ويكون من السهل إيجاد المدى من التمثيل البياني، ومن الجدير بالذكر أن المجال والمدى لجميع الدوال الخطية هو مجموعة الأعداد الحقيقية.





إذا كانت المعادلة تمثل دالة، فإن المتغير من المجال (غالبًا ما يكون  $x$ )، يسمى **المتغير المستقل**. والمتغير الثاني (غالبًا ما يكون  $y$ )، يسمى **المتغير التابع** لأن قيمه تعتمد على قيم المتغير  $x$ .

المعادلات التي تمثل دوالًا تكتب عادة باستعمال **رمز الدالة**. فالمعادلة  $y = 5x - 1$  يمكن كتابتها على الصورة  $f(x) = 5x - 1$ . وإذا أردنا إيجاد قيمة في المدى ترتبط بالعنصر  $-6$  في مجال الدالة  $f$ ، فإن هذه القيمة هي  $f(-6)$  ويمكن إيجادها بالتعويض عن كل  $x$  في المعادلة بالعدد  $-6$ ؛ لذا فإن  $f(-6) = 5(-6) - 1 = -31$ .

### قراءة الرياضيات

#### رمز الدالة

يستعمل الرمز  $f(x)$  للدوال بدلاً من  $y$ ، ويُقرأ  $f$  لـ  $x$ ؛ حيث  $f$  هو اسم الدالة وليس متغيرًا مضروبًا في  $x$ .

### مثال 4

#### إيجاد قيمة الدالة

لتكن  $f(x) = 2x^2 - 8$ ، أوجد قيمة كل مما يأتي:

(a)  $f(6)$

الدالة الأصلية  $f(x) = 2x^2 - 8$

عوض  $f(6) = 2(6)^2 - 8$

$6^2 = 36$   $= 2(36) - 8$

بسّط  $= 72 - 8 = 64$

(b)  $f(2y)$

الدالة الأصلية  $f(x) = 2x^2 - 8$

عوض  $f(2y) = 2(2y)^2 - 8$

$(2y)^2 = 2^2y^2$   $= 2(4y^2) - 8$

بسّط  $= 8y^2 - 8$

### تحقق من فهمك

$$g(x) = 0.5x^2 - 5x + 3.5$$



(4A)  $g(2.8)$

(4B)  $g(4a)$

### تأكد

**مثال 1** حدّد مجال كل علاقة فيما يأتي ومداهما، وبيّن ما إذا كانت دالة أم لا، وإذا كانت كذلك، فهل هي متباينة أم لا؟

x	y
-2	-4
1	-4
4	-2
8	6



**مثال 2** (4) **كرة قدم:** يبين الجدول المجاور متوسط عدد

الأهداف التي أحرزها فريق كرة قدم في مبارياته خلال 4 مواسم ومتوسط أعمار الفريق في كل موسم.

(a) مثل البيانات الواردة في الجدول بيانيًا، على أن يمثل المحور الأفقي متوسط أعمار الفريق، والمحور الرأسي متوسط عدد الأهداف في كل مباراة.


(b) حدّد كلاً من المجال والمدى.

(c) هل العلاقة التي تمثل البيانات منفصلة أم متصلة؟

(d) هل تمثل العلاقة دالة أم لا؟ وضح إجابتك.

متوسط عدد الأهداف في الموسم الواحد	متوسط أعمار الفريق	الموسم
16.2	22	1434-1435
24.1	23	1435-1436
27.2	24	1436-1437
23.5	25	1437-1438

**مثال 3** مثل كل معادلة فيما يأتي بيانيًا، ثم حدّد مجالها، ومداهما، وحدّد ما إذا كانت تمثل دالة أم لا، وإذا كانت كذلك، فهل هي متباينة أم لا؟ ثم حدّد إذا كانت منفصلة أم متصلة.



(7)  $y = 3x^2$

(6)  $y = -4x - 2$

(5)  $y = 5x + 4$

أوجد قيمة كل مما يأتي:

(9)  $f(-3)$  إذا كانت  $f(x) = -4x - 8$


وزارة التعليم

Ministry of Education  
2021 - 1443



مثال 1 حدّد مجال كل علاقة فيما يأتي ومداهما، وبيّن ما إذا كانت دالة أم لا، وإذا كانت كذلك، فهل هي متباينة أم لا؟

(13)  $\{(3, -4), (-1, 0), (3, 0), (5, 3)\}$



(12)

x	y
-0.3	-6
0.4	-3
1.2	-1

(11)

عدد الإناث	عدد الذكور	المنطقة الإدارية
938251	1194428	المدينة المنورة
313564	386210	حائل
398617	511413	تبوك
219061	289414	الجوف

مثال 2 (14) سكان: بين الجدول المجاور عدد الذكور وعدد الإناث في 4 مناطق إدارية مختلفة في المملكة لعام 1438هـ.

- (a) مثل البيانات الواردة في الجدول بيانياً على أن يمثل المحور الأفقي عدد الذكور والمحور الرأسي عدد الإناث.
- (b) حدّد كلاً من المجال والمدى.
- (c) هل العلاقة التي تمثل البيانات منفصلة أم متصلة؟
- (d) هل تمثل العلاقة دالة أم لا؟ وضح إجابتك.

مثال 3 مثل كل معادلة فيما يأتي بيانياً، ثم حدّد مجالها ومداهما، وحدّد إذا كانت تمثل دالة أم لا، وإذا كانت كذلك، فهل هي متباينة أم لا؟ ثم حدّد إن كانت منفصلة أم متصلة.

(16)  $y = 4x^2 - 8$

(15)  $y = -5x^2$

أوجد قيمة كل مما يأتي:

(18) إذا كانت  $f(x) = 16x^2$  إذا كانت  $f(2.5)$

(17) إذا كانت  $f(x) = 5x^3 + 1$  إذا كانت  $f(-8)$

العمق (ft)	0	20	40	60	80	100
الضغط	1	1.6	2.2	2.8	3.4	4

(19) غوص: بين الجدول المجاور مقدار الضغط الواقع على الغواص عند أعماق معينة تحت سطح الماء:

- (a) مثل العلاقة بيانياً.
- (b) حدّد كلاً من مجال العلاقة ومداهما، وهل هي منفصلة أم متصلة؟
- (c) هل هذه العلاقة دالة أم لا؟ وضح إجابتك.

إذا كانت  $f(x) = 3x + 2$ ,  $g(x) = -2x^2$ ,  $h(x) = -4x^2 - 2x + 5$ ، فأوجد قيمة كل مما يأتي:

(22)  $h(8)$

(21)  $h(3)$

(20)  $g(-6)$

(25)  $h\left(\frac{1}{5}\right)$

(24)  $g\left(\frac{3}{2}\right)$

(23)  $f\left(\frac{2}{3}\right)$

(26) تمثيلات متعددة: ستكتشف في هذا السؤال الدوال المتباينة.

(a) بيانياً: مثل كل دالة مما يأتي بيانياً:

$f(x) = x^2$        $g(x) = 2^x$        $h(x) = -x^2$        $j(x) = x^2 + 2$

(b) جدولياً: استعمل التمثيلات البيانية في الفرع a لعمل جدول يبين عدد المرات الممكن أن يقطع فيها أي خط أفقي، التمثيل البياني لكل دالة مما سبق.

(c) تحليلياً: حتى تكون الدالة متباينة يجب ألا يقطع أي خط أفقي تمثيلها البياني في أكثر من نقطة واحدة. أي الدوال السابقة تحقق هذا الشرط وأيها لا تحققه؟

(d) جدولياً: كوّن جدولاً، وصنّف فيه الدوال السابقة إلى متباينة أو غير متباينة.



الربط مع الحياة

الضغط الواقع على الغواص عندما يكون على عمق 10 أمتار تحت الماء يعادل ضعف الضغط الجوي على السطح تقريباً.



(27) يملك فهد 800 ريال، فإذا قرر أن يضيف إلى هذا المبلغ 200 ريال شهرياً، فإن الدالة  $p(t) = 800 + 200t$ ؛ تمثل مقدار ما معه من نقود  $p(t)$  بعد  $t$  شهراً. فكم يكون معه بعد 8 أشهر؟

### مسائل مهارات التفكير العليا

(28) **اكتشف الخطأ:** أوجد كل من أحمد وخالد قيمة  $f(3d)$  حيث  $f(x) = -4x^2 - 2x + 1$ . فأَيُّ منهما حله صحيح؟ وضح إجابتك.

خالد	أحمد
$f(3d) = -4(3d)^2 - 2(3d) + 1$ $= 12d^2 - 6d + 1$	$f(3d) = -4(3d)^2 - 2(3d) + 1$ $= -4(9d^2) - 6d + 1$ $= -36d^2 - 6d + 1$

(29) **مسألة مفتوحة:** مثل كلاً من العلاقات الآتية بيانياً:

(a) سرعة سيارة متجهة نحو نقطة معينة وزمنها إذا علمت أنها توقفت عند إشارتين ضوئيتين.

(b) طول شخص وعمره في الفترة من 5 سنوات إلى 60 سنة.

(c) درجة الحرارة في أحد الأيام خلال الفترة من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 11 مساءً.

(30) **تحديد:** إذا كانت  $f(x), g(x)$  دالتين بحيث  $f(b) = 31, g(b) = 51, f(a) = 19, g(a) = 33$ . وكانت  $a = 5, b = 8$  فأوجد دالتين  $f(x), g(x)$  تحققان المعطيات السابقة.

(31) **اكتب:** وضح كيف يحدد اختبار الخط الرأسي إذا كانت العلاقة دالة أم لا.

### تدريب على اختبار

(33) إذا كان  $g(x) = x^2$ ، فأَيُّ عبارة مما يأتي تساوي  $g(x + 1)$ ؟

- A 1  
B  $x^2 + 1$   
C  $x^2 + 2x + 1$   
D  $x^2 - x$

(32) تحتوي بركة سباحة على 19500 جالون من الماء إذا تم تفرغها بمعدل 6 جالونات لكل دقيقة. فأَيُّ المعادلات الآتية تمثل عدد جالونات الماء  $g$  المتبقية في البركة بعد  $m$  دقيقة؟

- A  $g = 19500 - 6m$   
B  $g = 19500 + 6m$   
C  $g = \frac{19500}{6m}$   
D  $g = \frac{6m}{19500}$

### مراجعة تراكمية

بسّط كل عبارة فيما يأتي: (الدرس 1-1)

(36)  $-7(2c - 4d) + 8(3c + d)$

(35)  $-4(5x - 3y) + 2(y + 3x)$

(34)  $6(3a - 2b) + 3(5a + 4b)$

حل كل معادلة فيما يأتي، ثم تحقق من صحة الحل: (الدرس 1-1)

(39)  $10y - 5 - 3y = 4(2y + 3) - 20$

(38)  $8d - 4 + 3d = 2d - 100 - 7d$

(37)  $4(2y - 3) + 5(3y + 1) = -99$






## الدوال المنفصلة والدوال المتصلة

### الهدف

أستعمل الدوال المنفصلة والدوال المتصلة لحل مسائل حياتية.


### سعر عبوات العصير



تُباع عبوة العصير الواحدة من أحد الأنواع بسعر 2 ريال، ويمكن إيجاد سعر  $x$  عبوة عصير باستعمال الدالة المتصلة  $y = 2x$  حيث  $y$  السعر الكلي بالريال. ويمكن تمثيل هذه الدالة بيانياً كما هو موضح في التمثيل المجاور.

بالنظر إلى التمثيل البياني، يمكن أن ترى أن سعر عبوتي عصير يساوي 4 ريالاً، وسعر 3 عبوات يساوي 6 ريالاً وهكذا. يبين التمثيل البياني أن سعر 1.5 عبوة هو  $2(1.5)$  ويساوي 3 ريالاً. إلا أن عبوات العصير لا تُباع مملوءة جزئياً. فهذه الدالة تُمثل بدقة أكثر بدالة منفصلة.

### سعر عبوات العصير




التمثيل البياني المجاور هو تمثيل الدالة المنفصلة التي تمثل سعر عبوات العصير. والمجال في هذا التمثيل البياني مقبول ومنطقي في هذا الموقف.

عند اختيار دالة منفصلة أو متصلة لتمثيل موقف من واقع الحياة يجب الأخذ بعين الاعتبار إذا كانت كل الأعداد الحقيقية تعد منطقية ومقبولة كعناصر في المجال أم لا.


### تمارين

بيّن إذا كانت كل علاقة فيما يأتي متصلة أو منفصلة، وفسر إجابتك.

#### (1) تحويل الوحدات



#### (2) البريد الإلكتروني



(3)  $y$  تمثل المسافة التي تقطعها سيارة في زمن مقداره  $x$  ساعة.

(4)  $y$  تمثل العدد الكلي لراكبي لعبة العجلة الدوارة بعد  $x$  دورة من تشغيل اللعبة.

(5) **اكتب:** مثلاً من واقع الحياة على دالة منفصلة وآخر على دالة متصلة، وفسر إجابتك.







## دوال خاصة Special Functions

### لماذا؟

السمنة حالة مرضية يمكن تعريفها طبيياً بأنها زيادة الدهون في الجسم، وتنتج السمنة عن أخذ مقدار طاقة أكبر من حاجة الجسم دون استهلاكها. ويبين الجدول المجاور نسب المصابات بالسمنة لفئات عمرية مختلفة في المملكة.

النسبة	إلى	من
19%	24	15
38%	34	25
53%	44	35
58%	54	45
49%	64	55

المصدر: مسح المعلومات الصحية في المملكة، وزارة الصحة، 1435 هـ.

**الدالة المتعددة التعريف:** الدالة التي تربط بين العمر ونسبة المصابات بالسمنة ليست خطية؛ لأن كل فترة من مجال الدالة معرفة بعبار مختلفة، فالدالة التي تكتب باستعمال عبارتين أو أكثر تسمى **دالة متعددة التعريف**. وعند تمثيل الدالة المتعددة التعريف بيانياً توضع دائرة صغيرة مظلمة عند الطرف لتشير إلى أن النقطة تنتمي إلى التمثيل البياني، وتوضع دائرة غير مظلمة لتشير إلى أن النقطة لا تنتمي إلى التمثيل البياني.

### فيما سبق:

درست حل معادلات تتضمن القيمة المطلقة.  
(مهارة سابقة)

### والآن:

- أكتب الدوال المتعددة التعريف وأمثلها بيانياً.
- أكتب الدوال الدرجية ودوال القيمة المطلقة وأمثلها بيانياً.

### المفردات:


الدالة المتعددة التعريف  
piecewise-defined function

الدالة المتعددة التعريف الخطية  
piecewise-linear function

الدالة الدرجية  
step function

دالة أكبر عدد صحيح  
greatest integer function

دالة القيمة المطلقة  
absolute value function



### مثال 1 تمثيل الدالة متعددة التعريف

$$\text{مثل الدالة } f(x) = \begin{cases} x - 2, & x < -1 \\ x + 3, & x \geq -1 \end{cases} \text{ بيانياً.}$$

ثم حدّد كلّاً من مجالها ومداهما.

**الخطوة 1:** مثل  $f(x) = x - 2$  بيانياً عندما  $x < -1$ .

احسب قيمة المقدار  $x - 2$  عندما  $x = -1$ ، وعند قيمة أخرى لـ  $x$  أقل من  $-1$  ولتكن  $-2$

$$f(x) = x - 2$$

$$f(-2) = (-2) - 2 = -4$$

$$f(x) = x - 2$$

$$f(-1) = (-1) - 2 = -3$$

حدّد النقطتين  $(-2, -4)$ ،  $(-1, -3)$  وصل بينهما بنصف مستقيم.

وبما أن العدد  $-1$  لا يحقق المتباينة لذا نبدأ بدائرة غير مظلمة عند النقطة  $(-1, -3)$ .

**الخطوة 2:** مثل  $f(x) = x + 3$  بيانياً عندما  $x \geq -1$ .

احسب قيمة المقدار  $x + 3$  عندما  $x = -1$ ، وعند قيمة أخرى لـ  $x$  أكبر من  $-1$  ولتكن  $0$

$$f(x) = x + 3$$

$$f(0) = (0) + 3 = 3$$

$$f(x) = x + 3$$

$$f(-1) = (-1) + 3 = 2$$

حدّد النقطتين  $(-1, 2)$ ،  $(0, 3)$  وصل بينهما بنصف مستقيم.

وبما أن العدد  $-1$  يحقق المتباينة، لذا نبدأ بدائرة مظلمة عند النقطة  $(-1, 2)$ .

وبما أن الدالة معرفة عند جميع قيم  $x$ ، لذا فالمجال هو مجموعة الأعداد الحقيقية.

قيم  $f(x)$  للأزواج المرتبة في التمثيل البياني للدالة هي جميع الأعداد الحقيقية الأقل من  $-3$  وكل

الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي  $2$ ، لذا فإن المدى هو  $\{f(x) \mid f(x) < -3 \text{ أو } f(x) \geq 2\}$



تحقق من فهمك

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases} \quad (1)$$




تمثل الدوال المتعددة التعريف غالبًا بعدة دوال خطية. وتسمى حينئذٍ **الدالة المتعددة التعريف الخطية**.

### إرشادات للدراسة

تمثيل الدوال المتعددة التعريف بيانيًا  
قد تكون الدوال المتعددة التعريف متصلة أو غير متصلة.

### مثال 2

#### كتابة الدالة المتعددة التعريف



اكتب الدالة المتعددة التعريف الممثلة بيانيًا في الشكل المجاور.

اكتب الدالة التي تمثل كل جزء في التمثيل البياني.

الجزء الأيسر يمر بالنقطتين  $(-2, -1)$  و  $(0, 3)$ ، وميله  $2 = \frac{-1-3}{-2-0}$ ،

وباستعمال صيغة الميل ونقطة مثلاً، فإن هذا الجزء تمثله الدالة  $f(x) = 2x + 3$ ، ولوجود دائرة غير مظلمة عند النقطة  $(1, 5)$ ، فإن هذا يعني أن الدالة معرفة على الفترة  $\{x | x < 1\}$ .

وبالطريقة نفسها فإن الجزء الأوسط تمثله الدالة  $f(x) = -x + 2$ .


وتوجد دائرتان مظلمتان عند النقطتين  $(1, 1)$  و  $(2, 0)$ ، وهذا يعني أن الدالة معرفة على الفترة  $\{x | 1 \leq x \leq 2\}$ .

كذلك الجزء الأيمن تمثله الدالة  $f(x) = 3$ . وتوجد دائرة غير مظلمة عند النقطة  $(2, 3)$ .

وهذا يعني أن الدالة معرفة على الفترة  $\{x | x > 2\}$ ، ونكتب الدالة المتعددة التعريف على النحو الآتي:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3, & x < 1 \\ -x + 2, & 1 \leq x \leq 2 \\ 3, & x > 2 \end{cases}$$

**تحقق:** يبين التمثيل البياني نصف مستقيم ميله موجب عندما تكون  $x < 1$ . ويبين أيضًا قطعة مستقيمة ميلها سالب عندما تكون  $1 \leq x \leq 2$  ونصف مستقيم آخر ميله صفر عندما تكون  $x > 2$ . لذا يكون تعريف الدالة منطقيًا للتمثيل البياني المعطى.



### تحقق من فهمك

2) اكتب الدالة المتعددة التعريف الممثلة بيانيًا في الشكل المجاور.

**الدالة الدرجية:** من الدوال المتعددة التعريف الخطية الشهيرة **الدالة الدرجية** التي تتكون من قطع مستقيمة أفقية، وقد سُميت بهذا الاسم لأن تمثيلها البياني يشبه الدرج، كما أن **دالة أكبر عدد صحيح** التي تكتب على

الصورة  $f(x) = [x]$ ، هي مثال على الدالة الدرجية؛ حيث يعني الرمز  $[x]$  أكبر عدد صحيح أقل من أو يساوي  $x$ . فعلى سبيل المثال:  $[3.25] = 3$  وكذلك  $[-4.6] = -5$ .

أضف إلى


مطوبتك

### دالة أكبر عدد صحيح

### مفهوم أساسي

الدالة الرئيسية (الأم):  $f(x) = [x]$ ، وتُعرف على النحو التالي:

$$f(x) = \begin{cases} -1 & -1 \leq x < 0 \\ 0 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & 1 \leq x < 2 \\ 2 & 2 \leq x < 3 \\ \vdots & \vdots \end{cases}$$



شكل التمثيل البياني:

المجال:

المدى:

المقطعان:

قطع مستقيمة أفقية.

مجموعة الأعداد الحقيقية

مجموعة الأعداد الصحيحة

$f(x) = 0$  حيث  $0 \leq x < 1$ ،  $x = 0$

وزارة التعليم

Ministry of Education

2021 - 1443



### مثال 3 من واقع الحياة استعمال الدالة الدرجية

**عقار:** يتقاضى مجمع للشقق المفروشة 300 ريال مقابل تأجير الشقة ليوم واحد أو جزء منه، و250 ريالاً مقابل تأجير الشقة ذاتها لأي يوم إضافي أو جزء منه. اكتب الدالة التي تمثل هذا الموقف واملأها بيانياً.


**افهم:** المعطيات: أجره الشقة لليوم الأول أو لجزء منه هي 300 ريال، وأجره أي يوم إضافي أو جزء منه بعد اليوم الأول 250 ريالاً.

**المطلوب:** كتابة الدالة التي تمثل الموقف، وتمثيلها بيانياً.

**خطط:** كون جدولاً يمثل الموقف؛ لتكتشف النمط، وتكتب الدالة وتمثلها بيانياً.

**حل:** إذا كان زمن التأجير أكبر من 0 يوم وأقل من أو يساوي يوماً، فإن الأجره هي 300 ريال. وإذا كان الزمن أكبر من يوم وأقل من أو يساوي يومين فإن الأجره هي 550 ريالاً وهكذا، لذا استعمل نمط الزمن مع الأجره لعمل الجدول التالي، حيث  $x$  هي عدد أيام تأجير الشقة. و  $T(x)$  هي أجره الشقة، ثم مثله بيانياً.

$x$	$0 < x \leq 1$	$1 < x \leq 2$	$2 < x \leq 3$	$3 < x \leq 4$	$4 < x \leq 5$
$T(x)$	300 ريال	550 ريال	800 ريال	1050 ريال	1300 ريال



وعليه فإن الدالة المطلوبة وتمثيلها البياني يكونان كما يلي:

$$T(x) = \begin{cases} 300 & 0 < x \leq 1 \\ 550 & 1 < x \leq 2 \\ 800 & 2 < x \leq 3 \\ 1050 & 3 < x \leq 4 \\ 1300 & 4 < x \leq 5 \\ \vdots & \end{cases}$$

**تحقق:** بما أن المجمع يحول أي كسر للعدد الصحيح التالي، فإن كل قطعة مستقيمة ستحتوي على دائرة غير مظلمة عن يسارها، وأخرى مظلمة عن يمينها كما في الشكل.

تحقق من فهمك

**3 إعادة تدوير الورق:** تدفع شركة لإعادة تدوير الورق 25 ريالاً عن كل صندوق من الورق يتم إحضاره للشركة ولا تدفع أي شيء مقابل أي صندوق غير ممتلئ بالكامل. اكتب الدالة التي تمثل هذا الموقف واملأها بيانياً.



### الربط مع الحياة

تقدر المخلفات الورقية في السعودية بـ 1.5 مليون طن سنوياً، يستغل منها في عمليات التدوير 700 ألف طن فقط.

المصدر: جريدة الاقتصادية / العدد 6081، عام 1431 هـ

وهناك نوع آخر من الدوال المتعددة التعريف يسمى **دالة القيمة المطلقة** وهي الدالة التي تحتوي على عبارة جبرية يستعمل فيها رمز القيمة المطلقة.

**أضف إلى مطوبتك**

وزارة التعليم  
Ministry of Education  
2021 - 1443

**مفهوم أساسي**

**دالة القيمة المطلقة**

الدالة الرئيسية (الأم):  $f(x) = |x|$ ، وتُعرف على النحو الآتي:

$$f(x) = \begin{cases} x & , x > 0 \\ 0 & , x = 0 \\ -x & , x < 0 \end{cases}$$

على شكل حرف V

مجموعة الأعداد الحقيقية

مجموعة الأعداد الحقيقية غير السالبة

$x = 0, f(x) = 0$

$f(x) < 0$

شكل التمثيل البياني:

المجال:

المدى:

المقطعان:

ولا يمكن أن تكون:

شكل التمثيل البياني:

المجال:

المدى:

المقطعان:

ولا يمكن أن تكون:




### مثال 4

#### دالة القيمة المطلقة

مثل الدالة  $f(x) = |2x| - 4$  بيانيًا، ثم حدّد كلاً من مجالها ومداهما.

- (3) مثل الأزواج المرتبة في المستوى الإحداثي.  
(4) صل بين النقاط.



المجال هو مجموعة الأعداد الحقيقية، والمدى هو  $\{f(x) \mid f(x) \geq -4\}$ .

- (1) اجعل ما بداخل القيمة المطلقة يساوي الصفر، أي  $2x = 0$  أو  $x = 0$   
(2) كوّن جدولاً للقيم، يحوي قيمًا لـ  $x$  أكبر من 0 وقيمًا أصغر من 0

$x$	$ 2x  - 4$
-2	0
-1	-2
0	-4
1	-2
2	0

تحقق من فهمك

$$f(x) = -|x| + 1 \quad (4B)$$

$$f(x) = |x - 2| \quad (4A)$$

تأكد


مثل كل دالة مما يأتي بيانيًا، ثم حدّد كلاً من مجالها ومداهما:

مثال 1


$$f(x) = \begin{cases} 8, & x \leq -1 \\ 2x, & -1 < x < 4 \\ -4-x, & x \geq 4 \end{cases} \quad (2) \quad f(x) = \begin{cases} -3, & x \leq -4 \\ x, & -4 < x < 2 \\ -x+6, & x \geq 2 \end{cases} \quad (1)$$

اكتب الدالة المتعددة التعريف الممثلة بيانيًا في كل ممّا يأتي:

مثال 2



(4)



(3)

(5) محاضرات طبية: يريد أحد الأطباء إلقاء محاضرة حول العدوى في قاعة تتسع لـ 250 شخصًا فقط،

مثال 3

وكان عدد راغبي حضور المحاضرة أكثر من ذلك بكثير. مثل بيانيًا دالة متعددة التعريف تبين العلاقة بين عدد المحاضرات  $y$  التي يمكن أن يلقيها الطبيب، وعدد الحضور  $x$ .

مثل كل دالة فيما يأتي بيانيًا، ثم حدّد كلاً من مجالها ومداهما:

المثالان 3, 4



$$g(x) = |-3x| \quad (8)$$

$$h(x) = [x - 5] \quad (7)$$

$$g(x) = -2[x] \quad (6)$$

$$s(x) = |-2x| + 6 \quad (11)$$

$$h(x) = |x + 4| \quad (10)$$

$$f(x) = 2|x| \quad (9)$$



## تدرب وحل المسائل

مثال 1


مثل كل دالة فيما يأتي بيانًا، ثم حدّد كلاً من مجالها ومداهما:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \leq -6 \\ 5, & -6 < x \leq 2 \\ -2x + 1, & x > 4 \end{cases} \quad (13)$$


$$f(x) = \begin{cases} -3x, & x \leq -4 \\ x, & 0 < x \leq 3 \\ 8, & x > 3 \end{cases} \quad (12)$$

مثال 2


اكتب الدالة المتعددة التعريف الممثلة بيانًا في كلٍّ مما يأتي:



(16)



(15)



(14)

مثال 3 (17) **جمعية خيرية:** تقوم جمعية خيرية بجمع الصدقات لإيصالها إلى مستحقيها، وتبرع الجمعية أيضًا بمبلغ مساوٍ لأي صدقة دون 100 ريال أو تساويها، كما تضيف الجمعية 100 ريال إلى أي صدقة تزيد على 100 ريال.

(a) حدّد نوع الدالة التي تمثل هذا الموقف.

(b) اكتب الدالة التي تصف هذا الموقف، ثم مثلها بيانًا.

مثل كل دالة فيما يأتي بيانًا، ثم حدّد كلاً من مجالها ومداهما:

$$f(x) = |x - 5| \quad (20)$$

$$h(x) = 3[x] - 8 \quad (19)$$

$$f(x) = [x] - 6 \quad (18)$$

$$k(x) = |-3x| + 3 \quad (23)$$

$$h(x) = |2x| - 8 \quad (22)$$

$$g(x) = |x + 2| \quad (21)$$

$$h(x) = -3|0.5x + 1| - 2 \quad (25)$$

$$f(x) = 2|x - 4| + 6 \quad (24)$$

استئجار الدبابات الشاطئية




الزمن (ساعة)	السعر (بالريال)
$0 < t \leq \frac{1}{2}$	60
$\frac{1}{2} < t \leq 1$	100
$1 < t \leq 2$	160
$2 < t \leq 3$	240

(26) **ترفيه:** يوضّح الجدول المجاور: تكلفة استئجار دباب شاطيء.


(a) حدّد نوع الدالة التي تمثل هذا الموقف.

(b) اكتب الدالة التي تمثل هذا الموقف، ثم مثلها بيانًا.

اكتب دالة القيمة المطلقة الممثلة بيانًا في كلٍّ مما يأتي:



(28)



(27)



### الربط مع الحياة

تهدف جمعيات البر بالمملكة إلى ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتحويله إلى واقع عملي من خلال رعاية المحتاجين وتخفيف معاناتهم بتوفير الغذاء والدواء واللباس والأثاث.



مثل كل دالة فيما يأتي بياناً، ثم حدّد كلاً من مجالها ومداهما:

$$h(x) = \begin{cases} -|x|, & x < -6 \\ |x|, & -6 \leq x \leq 2 \\ |x|, & x > 2 \end{cases} \quad (30) \quad g(x) = \begin{cases} [x], & x < -4 \\ x + 1, & -4 \leq x \leq 3 \\ -|x|, & x > 3 \end{cases} \quad (29)$$

(31) تمثيلات متعددة: لتكن  $f(x) = |x| - 4$ ,  $g(x) = |3x|$

(a) جدولياً: كوّن جدولاً لبعض قيم كل من  $f(x)$  و  $g(x)$  ما بين  $x = -4$ ,  $x = 4$ .

(b) بيانياً: مثل كلاً من الدالتين بيانياً على مستوى إحداثي مختلف.

(c) عددياً: احسب الميل بين كل نقطتين متتاليتين في الجدول.

(d) لفظياً: صف العلاقة بين ميل كل من جزأي دالة القيمة المطلقة.

### مسائل مهارات التفكير العليا

(32) مسألة مفتوحة: اكتب علاقة باستعمال القيمة المطلقة بحيث يكون المجال هو مجموعة الأعداد الحقيقية غير السالبة والمدى هو مجموعة الأعداد الحقيقية.

(33) تحد: مثل المعادلة  $|y| = 2|x + 3| - 5$  بيانياً.

(34) تبرير: أعط مثلاً مضاداً للجملّة الآتية، وفسّر إجابتك.

“حتى تجد أكبر عدد صحيح لعدد غير صحيح  $x$ ، فإنك تقرّب  $x$  إلى أقرب عدد صحيح”

(35) مسألة مفتوحة: اكتب دالة قيمة مطلقة  $f(x)$ ، تحقق  $f(5) = -3$ .

(36) اكتب: اشرح من خلال مثال كيف تستعمل الدوال المتعددة التعريف لتمثيل مسائل من واقع الحياة.

### تدريب على اختبار

(38) أي دالة مما يأتي يكون فيها  $f(-\frac{1}{2}) \neq -1$ ؟

$f(x) = [x]$  C       $f(x) = 2x$  A  
 $f(x) = [2x]$  D       $f(x) = |-2x|$  B

(37) إجابة قصيرة: ما العبارة التي تعطي الحد النوني للنمط في الجدول التالي؟

2	4	6	8	n
7	13	19	25	?

### مراجعة تراكمية

إذا كان  $f(x) = -4x + 6$ ,  $g(x) = -x^2$ ,  $h(x) = -2x^2 - 6x + 9$  فأوجد كل قيمة مما يأتي: (الدرس 1-2)

$h(6)$  (41)

$g(a + 1)$  (40)

$f(2c)$  (39)

حدّد مجموعات الأعداد التي ينتمي إليها كل عدد مما يأتي: (الدرس 1-1)

$\sqrt{11}$  (45)

$\frac{2}{5}$  (44)

-3 (43)

$\sqrt{36}$  (42)





إذا كان  $f(x) = 3x^3 - 2x + 7$ ، فأوجد قيمة كل مما يأتي :

(12)  $f(-2)$

(13)  $f(2y)$

(14)  $f(1.4)$


(15) **اختيار من متعدد:** يقدر الدخل بالريال لسيارة أجرة بالدالة  $f(x) = 0.35x + 49$ ، حيث  $x$  عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة. قدر دخل السيارة إذا قطعت 250 km .

- A 84 ريالاً  
B 112.50 ريالاً  
C 136.50 ريالاً  
D 215 ريالاً


(16) مثل بيانياً الدالة:

$$f(x) = \begin{cases} -x, & x < -2 \\ x + 2, & -2 \leq x \leq 2 \\ 5, & x > 2 \end{cases}$$

(17) اكتب الدالة المتعددة التعريف الممثلة بيانياً فيما يأتي:



(18) حدّد كلاً من المجال والمدى للدالة:  $y = [x] + 2$ .



حدّد مجموعات الأعداد التي ينتمي إليها كل عدد مما يأتي:

(1)  $\frac{25}{11}$

(2)  $-\frac{128}{32}$

(3)  $\sqrt{50}$

(4)  $-32.4$

(5) اذكر الخاصية الموضحة في المعادلة الآتية:

$$4(7 + 15) = 4(7) + 15(7) ?$$

(6) بسّط العبارة  $-3(7a - 4b) + 2(-3a + b)$

(7) **ملايس:** يريد سعد شراء 3 قمصان و3 بناطيل. فإذا كان سعر القميص الواحد 35 ريالاً. وسعر البنطال الواحد 55 ريالاً. فأوجد المبلغ الذي يدفعه سعد بطريقتين مستعملاً خاصية التوزيع.

(8) **اختيار من متعدد:** أي العبارات التالية تكافئ

$$\frac{2}{3}(4m - 5n) + \frac{1}{5}(2m + n)$$

A  $\frac{46}{15}m - \frac{47}{15}n$

B  $46m - 47n$

C  $-\frac{mn}{15}$

D  $\frac{5}{4}m - \frac{9}{8}n$

(9) أوجد كلاً من النظير الجمعي والنظير الضربي للعدد  $\frac{7}{6}$ .

(10) حدّد كلاً من مجال العلاقة الآتية ومداهما، ثم بين هل تمثل دالة أم لا:  $\{(3, 2), (4, 1), (0, 3), (5, -2), (3, 7)\}$

(11) مثل المعادلة  $y = 2x - 3$  بيانياً، ثم بين إذا كانت تمثل دالة أم لا. وهل هي متباينة أم لا؟ وهل هي منفصلة أم متصلة؟

(19) مثل الدالة  $f(x) = |2x|$ ، ثم حدّد كلاً من مجالها ومداهما.





## تمثيل المتباينات الخطية ومتباينات القيمة المطلقة بيانياً Graphing Linear and Absolute Value Inequalities

### لماذا؟

دعا تركي زملاءه إلى وجبة من الفطائر والعصير الطبيعي، ورصد لتلك الدعوة مبلغ 150 ريالاً فقط.

ويمكنه أن يستعمل المتباينة الخطية:  $6p + 5d \leq 150$  حيث  $p$  عدد الفطائر و  $d$  عدد أكواب العصير؛ للتأكد من أن سعر عدد معين من الفطائر وأكواب العصير سيكون ضمن ميزانيته.

### فيما سبق

درست تمثيل الدوال الخطية. (مهارة سابقة)

### والآن

- أمثل المتباينات الخطية بيانياً.
- أمثل متباينات القيمة المطلقة بيانياً.

### المفردات

المتباينة الخطية

linear inequality

منطقة الحل


feasible region

الحد

boundary




**تمثيل المتباينات الخطية بيانياً:** تشبه المتباينة الخطية المعادلة الخطية، فالفرق بينهما فقط هو وضع رمز المتباينة بدلاً من رمز المساواة. فمثلاً،  $y > -3x - 2$  هي متباينة خطية، و  $y = -3x - 2$  هي المعادلة الخطية المرتبطة بها.



التمثيل البياني للمتباينة  $y > -3x - 2$  مبين في الشكل المجاور على صورة منطقة مظللة تسمى **منطقة الحل**، فكل نقطة في المنطقة المظللة تحقق المتباينة، والتمثيل البياني للمستقيم  $y = -3x - 2$  هو **حد** منطقة الحل وقد رُسم المستقيم بشكل متقطع ليدل على أنه لا يحقق المتباينة. أما إذا احتوت المتباينة على الرمز  $\leq$  أو  $\geq$  فإن النقاط الواقعة على الحد ستحقق المتباينة وعندئذ يكون تمثيل المستقيم خطاً متصلًا.

### مثال 1 الحد المتقطع

مثل المتباينة  $x + 4y > 2$  بيانياً.



**الخطوة 1:** مثل الحد وهو المستقيم  $x + 4y = 2$ . وبما أن رمز المتباينة هو  $>$  فإن الحد سيكون متقطعاً.

**الخطوة 2:** اختبر النقطة  $(0, 0)$  والتي لا تقع على حد المتباينة.

$$\text{المتباينة الأصلية} \quad x + 4y > 2$$

$$(x, y) = (0, 0) \quad 0 + 4(0) > 2$$

$$0 > 2 \quad \times$$

ظلل المنطقة التي لا تحوي  $(0, 0)$ .

**تحقق:** بين التمثيل البياني أن النقطة  $(0, 3)$  تقع في منطقة الحل.

$$\text{المتباينة الأصلية} \quad x + 4y > 2$$

$$(x, y) = (0, 3) \quad 0 + 4(3) > 2$$

$$12 > 2 \quad \checkmark$$

إذن، الحل صحيح.

**تحقق من فهمك**

$$(1A) \quad 3x + \frac{1}{2}y < 2$$

$$(1B) \quad -x + 2y > 4$$





## مثال 2 من واقع الحياة الحد المتصل

**رسم:** يقدم مركز تدريب نوعين من دروس تعلم اللغة الإنجليزية، الأول: دروس مدتها 30 دقيقة للدرس الواحد، والثاني: دروس مدتها 60 دقيقة للدرس الواحد. وقرر مدير المركز ألا يزيد زمن دروس تعلم اللغة الإنجليزية على 20 ساعة أسبوعياً.

(a) اكتب متباينة تمثل عدد دروس تعلم اللغة الإنجليزية التي يمكن تقديمها أسبوعياً، ثم مثلها بيانياً.

لتكن  $x$  عدد الدروس التي مدتها 30 دقيقة ( $\frac{1}{2}$  ساعة)، و  $y$  عدد الدروس التي مدتها 60 دقيقة (ساعة واحدة). وبما أن مجموع زمن الدروس لا يزيد على 20 ساعة أسبوعياً، فهذا يعني إمكانية أن يساوي 20 ساعة. ولهذا فإن المتباينة تحتوي على الرمز  $\leq$ ، ولذا يكون المستقيم الذي يمثل الحد متصلًا. إذن المتباينة هي  $\frac{1}{2}x + y \leq 20$ .

**الخطوة 1:** مثل الحد وهو المستقيم  $\frac{1}{2}x + y = 20$  بيانياً.


**الخطوة 2:** اختبر النقطة  $(0, 0)$  والتي لا تقع على الحد.

$$\text{المتباينة الأصلية} \quad \frac{1}{2}x + y \leq 20$$

$$(x, y) = (0, 0) \quad \frac{1}{2}(0) + (0) \leq 20$$

$$0 \leq 20 \quad \checkmark$$

ظلّ المنطقة في الربع الأول فقط التي تحوي  $(0, 0)$ ؛ وذلك لأن كلا المتغيرين لا يمكن أن يكون سالبًا.



(b) هل يمكن أن يقدم المركز 25 درسًا من الدروس التي مدتها 30 دقيقة، و 15 درسًا من الدروس التي مدتها 60 دقيقة خلال أسبوع ما؟ فسّر إجابتك.  
النقطة  $(25, 15)$  تقع خارج المنطقة المظللة؛ لذا فهي لا تحقق المتباينة، وعليه، فلا يمكن أن يقدم المركز ذلك العدد من الدروس خلال أسبوع ما.

تحقق من فهمك

(2) ألعاب: مع صالح 60 ريالاً يستطيع إنفاقها في مدينة الألعاب. فإذا كان ثمن تذكرة الألعاب الإلكترونية 5 ريالات، وثمان تذكرة كل لعبة عادية 6 ريالات. فاكتب متباينة تصف هذا الموقف، ثم مثلها بيانياً.

**تمثيل متباينة القيمة المطلقة بيانياً:** تمثيل متباينة القيمة المطلقة مشابه لتمثيل المتباينات الخطية، مثل بيانياً معادلة القيمة المطلقة المرتبطة، وبعد ذلك حدّد إذا كان حد المتباينة متقطعاً أو متصلًا، ثم حدّد المنطقة التي يجب تظليلها باختبار نقطة ما.

## مثال 3 تمثيل متباينة القيمة المطلقة بيانياً

مثل المتباينة  $y \geq |x| - 4$  بيانياً.

مثل المعادلة المرتبطة  $y = |x| - 4$ ،

وبما أن المتباينة تحتوي على إشارة  $\geq$ ، فإن الحد يكون متصلًا. والآن اختبر النقطة  $(0, 0)$ .


$$\text{المتباينة الأصلية} \quad y \geq |x| - 4$$

$$(x, y) = (0, 0) \quad 0 \geq |0| - 4$$

$$0 \geq -4 \quad \checkmark$$

ظلّ المنطقة التي تحتوي على النقطة  $(0, 0)$ .

تحقق من فهمك





مثال 1 مثل كل متباينة فيما يأتي بيانياً:

$$(1) y \leq 4$$

$$(2) x > -6$$

$$(3) x + 4y \leq 2$$

$$(4) 3x + y > -8$$

مثال 2 (5) وقود: مع عامر 120 ريالاً، ويريد تزويد سيارته بالوقود، وشراء علب زيت للمحرك بالمبلغ المتبقي. فإذا كان سعر لتر الوقود 1.37 ريال، وسعر عبوة زيت المحرك 17 ريالاً.


(a) اكتب متباينة تمثل هذا الموقف، ثم مثلها بيانياً.

(b) هل يستطيع عامر تزويد سيارته بـ 20 لتراً من الوقود وشراء 4 عبوات زيت محرك؟ فسر إجابتك.

مثال 3 مثل المتباينتين الآتيتين بيانياً.

$$(6) y \geq |x + 3|$$

$$(7) y - 6 < |x|$$



موقع

تدرب وحل المسائل

حلول كتبي

مثال 1 مثل كل متباينة فيما يأتي بيانياً:

$$(8) x + 2y > 6$$

$$(9) y \geq -3x - 2$$

$$(10) 2y + 3 \leq 11$$

$$(11) 4x - 3y > 12$$

$$(12) 6x + 4y \leq -24$$

$$(13) y \geq \frac{3}{4}x + 6$$

مثال 2 (14) مشتريات: مع سعاد 200 ريال. وتريد أن تشتري عددًا من الأطباق. وعددًا من الكؤوس؛ لتجهز لمناسبة اجتماعية، فإذا كان سعر الطبق 15 ريالاً وسعر الكأس 5 ريالات، فأجب عمّا يأتي:

(a) اكتب متباينة تمثل العدد الممكن شراؤه من الأطباق والكؤوس، ثم مثلها بيانياً.

(b) هل تستطيع سعاد شراء 10 أطباق و 10 كؤوس؟





مثال 3

مثل كل متباينة فيما يأتي بيانياً:

$$y - 6 < |-2x| \quad (17)$$

$$y + 4 \leq |x - 2| \quad (16)$$

$$y > |3x| \quad (15)$$

$$-y \leq |3x - 4| \quad (20)$$

$$2y > |4x - 5| \quad (19)$$

$$y + 8 < 2 \left| \frac{2}{3}x + 6 \right| \quad (18)$$

(21) **أعمال:** يؤدي سعيد عملين ليحقق دخلاً أسبوعياً لا يقل عن 1500 ريال، إذا كان الأجر الذي يتقاضاه عن كل ساعة موضحاً في الجدول المجاور، فأجب عما يأتي:

العمل	الأجر في الساعة
بائع في محل تجاري / صباحاً	20 ريالاً
سائق خاص / مساءً	25 ريالاً

(a) اكتب متباينة تمثل هذا الموقف.

(b) مثل المتباينة بيانياً.

(c) هل سيحصل سعيد على المبلغ المطلوب إذا عمل 30 ساعة أسبوعياً في كل عمل؟

مثل كل متباينة فيما يأتي بيانياً:

$$y - 3 > -2|x + 4| \quad (24)$$

$$y \leq |x - 3| + 4 \quad (23)$$

$$y \geq |-2x - 6| \quad (22)$$

(25) **زينة:** تصنع ميساء عقوداً وأساور من الخرز، لتشارك بها في المعرض الفني للمدرسة، ولديها من الخرز ما يكفي لصنع 50 قطعة. لتكن  $x$  عدد الأساور،  $y$  عدد العقود.

(a) اكتب متباينة تبين عدد العقود والأساور التي يمكن أن تصنعها ميساء.

(b) مثل المتباينة بيانياً.

(c) أعط ثلاثة حلول لعدد العقود والأساور التي يمكن لميساء صنعها.



الربط مع الحياة

يصنع الخرز من طين لين، حيث يجفف في فرن حرارته عالية، ويمكن تشكيله إلى أشكال عديدة.

مثل كل متباينة فيما يأتي بيانياً.

$$y \geq |[x]| \quad (28)$$

$$y < [x + 2] \quad (27)$$

$$y \geq [x] \quad (26)$$

مسائل مهارات التذكير العليا

(29) **مسألة مفتوحة:** استعمل القيمة المطلقة لتكوين متباينة على أن لا يقع حلها في الربعين الثاني أو الثالث.


(30) **تحدي:** مثل المتباينة الآتية بيانياً:

$$g(x) > \begin{cases} |x + 1|, & x \leq -4 \\ -|x|, & -4 < x < 2 \\ |x - 4|, & x \geq 2 \end{cases}$$





(31) **اكتشف الخطأ:** مثل كل من زيد ومصعب المتباينة  $x - y \geq 2$  بيانياً. فأيهما تمثيله صحيح؟ فسّر إجابتك.



(32) **تبرير:** متى يكون من الممكن تظليل منطقتين مختلفتين عند تمثيل متباينة القيمة المطلقة؟ فسّر إجابتك.

(33) **اكتب:** اذكر مثلاً لمتباينة قيمة مطلقة ليس لها حل. فسّر إجابتك.

### تدريب على اختبار

- (34) أي النقاط الآتية تقع في منطقة حل المتباينة  $y + 3x > -2$  ؟
- A (-3, 1)  
B (1, -7)  
C (0, 0)  
D (-4, 0)
- (35) أي الدوال الآتية مداها هو  $\{f(x) \mid f(x) \leq 0\}$  ؟
- A  $f(x) = -x$   
B  $f(x) = [x]$   
C  $f(x) = |x|$   
D  $f(x) = -|x|$

### مراجعة تراكمية

مثل كل دالة فيما يأتي بيانياً: (الدرس 1-3)

$$f(x) = \begin{cases} -2x, & x \leq -2 \\ x + 1, & 0 < x \leq 6 \\ x - 5, & x > 6 \end{cases} \quad (38)$$

$$f(x) = \begin{cases} x + 3, & x < -2 \\ 2x, & -2 \leq x \leq 2 \\ -3x, & x > 2 \end{cases} \quad (37)$$

$$f(x) = \begin{cases} x, & x < 1 \\ 3, & 1 \leq x \leq 3 \\ -2x, & x > 3 \end{cases} \quad (36)$$

إذا كان:  $f(x) = 4x^2 - 10x$

$g(x) = -3x^2 + 2$

$h(x) = -7x + 8$

فأوجد كل قيمة مما يأتي: (الدرس 1-2)

$f(-9)$  (39)

$g(-4)$  (40)

$h(12)$  (41)








# حل أنظمة المتباينات الخطية بيانياً

## Solving Systems of Linear Inequalities by Graphing

# 1-5



**لماذا؟**  
تؤخذ الحالة الجوية بالاعتبار عند إطلاق المركبات الفضائية، فيجب أن تكون درجة الحرارة بين  $35^{\circ}\text{F}$  و  $100^{\circ}\text{F}$ ، وأن لا تزيد سرعة الرياح على 30 عقدة. ويمكن تمثيل هذه الشروط بنظام من المتباينات الخطية كما في الشكل المجاور.

**نظام المتباينات الخطية:** حل نظام المتباينات الخطية يعني إيجاد أزواج مرتبة تحقق جميع المتباينات في النظام.

### فيما سبق:

درست حل نظام من معادلتين خطيتين بيانياً. (مهارة سابقة)

### والآن:

- أحل نظام متباينات خطية بيانياً.
- أحدد إحداثيات النقاط التي تمثل رؤوس منطقة الحل.

### المفردات:

نظام المتباينات الخطية  
system of linear inequalities

### مفهوم أساسي

#### حل أنظمة المتباينات الخطية

أضف إلى مطوبتك

**الخطوة 1** مثل كل متباينة في النظام بيانياً.

**الخطوة 2** حدد المنطقة المظللة المشتركة بين مناطق حل متباينات النظام والتي تمثل منطقة حل النظام.

### مثال 1

#### مناطق الحل المتقاطعة

حل النظام الآتي بيانياً:

$$y > 2x - 4$$

$$y \leq -0.5x + 3$$

بتمثيل المتباينتين بيانياً نجد أن: حل المتباينة  $y > 2x - 4$  ← المنطقتان: 1, 3

حل المتباينة  $y \leq -0.5x + 3$  ← المنطقتان: 2, 3

المنطقة 3 هي منطقة مشتركة بين منطقتي حل المتباينتين، وعليه فتكون هي منطقة حل النظام.

### تحقق:

لاحظ أن نقطة الأصل تنتمي إلى منطقة حل النظام، ويمكن استعمال نقطة الأصل نقطة اختبار. والتحقق من صحة الحل بتعويض  $(0, 0)$  بدلاً من  $x, y$  في كلتا المتباينتين.

$$y \leq -0.5x + 3$$

$$0 \leq -0.5(0) + 3$$

$$0 \leq 0 + 3$$

$$\checkmark 0 \leq 3$$

$$y > 2x - 4$$

$$0 > 2(0) - 4$$

$$0 > 0 - 4$$

$$\checkmark 0 > -4$$

### تحقق من فهمك

$$y \leq -2x + 5 \quad \text{(1A)}$$

$$y > -\frac{1}{4}x - 6$$

$$y \geq |x| \quad \text{(1B)}$$

$$y < \frac{4}{3}x + 5$$






يمكن أن لا تتقاطع منطقتا حل متباينتين، وعليه فلا يوجد حل للنظام في هذه الحالة، وتكون مجموعة الحل هي المجموعة الخالية.

### قراءة الرياضيات

**المجموعة الخالية**  
هي المجموعة التي لا تحتوي على عناصر، ويرمز إليها بأحد الرمز  $\emptyset$  أو  $\{ \}$ .

### مثال 2

#### مناطق الحل غير المتقاطعة



حل النظام الآتي بيانيًا:

$$y \geq x + 5$$

$$y < x - 4$$

بتمثيل المتباينتين بيانيًا، نجد أن منطقتي الحل لا تتقاطعان، وبالتالي لا توجد نقاط مشتركة بينهما، ولذا فليس للنظام حل. ومجموعة الحل هي  $\emptyset$ .

### تحقق من فهمك

$$y \geq |x| \quad (2B)$$

$$y < x - 6$$

$$y \geq -4x + 8 \quad (2A)$$

$$y < -4x + 4$$

تستعمل أنظمة المتباينات الخطية في حل مسائل من واقع الحياة.

### كتابة نظام من المتباينات

### مثال 3 من واقع الحياة

**إدارة الوقت:** لدى فاطمة 25 ساعة على الأكثر للاستعداد لأداء 3 اختبارات في الرياضيات والفيزياء والتربية المهنية، فوضعت جدولًا زمنيًا استعدادًا لذلك، فخصصت ساعتين لدراسة التربية المهنية، وخصصت من 7 إلى 14 ساعة لدراسة الرياضيات، أما الفيزياء فخصصت لدراستها من 8 إلى 12 ساعة. اكتب نظام متباينات خطية يمثل هذا الموقف ومثله بيانيًا.

الرياضيات: بافتراض أن عدد ساعات دراسة الرياضيات  $x$ ، فإن هذا العدد لا يقل عن 7 ساعات ولا يزيد على 14 ساعة أي أن:

$$7 \leq x \leq 14$$


الفيزياء: بافتراض أن عدد ساعات دراسة الفيزياء  $y$ ، فإن هذا العدد لا يقل عن 8 ساعات ولا يزيد على 12 ساعة أي أن:

$$8 \leq y \leq 12$$

وبما أن إجمالي وقت الدراسة هو 25 ساعة، ساعتان منها لدراسة مادة التربية المهنية، ويتبقى 23 ساعة على الأكثر لدراسة الرياضيات والفيزياء فإن:

$$x + y \leq 23$$


مثل المتباينات بيانيًا. أي زوج مرتب في منطقة حل النظام يمثل حلًا للنظام؟ أحد الحلول الممكنة هو 10 ساعات لدراسة الفيزياء، و 11 ساعة لدراسة الرياضيات.



### تحقق من فهمك

**(3) سفر:** خرج مشاري وبدر في رحلة لزيارة بعض محافظات المملكة براً فتناوبا قيادة السيارة. فإذا كانت فترات قيادة مشاري للسيارة على نحو متواصل في اليوم لا تقل عن 4 ساعات، ولا تزيد على 8 ساعات، وكانت فترات قيادة بدر للسيارة على نحو متواصل في اليوم لا تقل عن ساعتين ولا تزيد على 5 ساعات، وكان إجمالي زمن قيادة كليهما يوميًا لا يزيد على 10 ساعات، فاكتب نظام متباينات خطية يمثل هذا الموقف، ثم مثله بيانيًا.





**إيجاد رؤوس منطقة الحل:** ينتج أحياناً عن التمثيل البياني لنظام متباينات خطية منطقة مغلقة على شكل مضلع، ويمكن إيجاد إحداثيات رؤوس تلك المنطقة بإيجاد إحداثيات نقاط تقاطع المستقيمات المحددة للمنطقة (الحدود).

#### مثال 4 إيجاد رؤوس منطقة الحل

أوجد إحداثيات رؤوس المثلث الناتج عن التمثيل البياني للنظام الآتي:

$$y \geq 2x - 8, y \leq -\frac{1}{4}x + 6, 4y \geq -15x - 32$$

**الخطوة 1:** مثل كل متباينة بيانياً.

**الخطوة 2:** من التمثيل البياني يمكنك إيجاد إحداثيات رأسين من رؤوس المثلث وهما الزوجان المرتبان  $(-4, 7), (0, -8)$ .

**الخطوة 3:** أوجد إحداثيي الرأس الثالث بحل النظام المكون من المعادلتين الخطيتين:

$$y = 2x - 8, y = -\frac{1}{4}x + 6$$

عوض عن  $y$  بقيمتها في المعادلة الثانية.

$$2x - 8 = -\frac{1}{4}x + 6$$

$$2x = -\frac{1}{4}x + 14$$

$$\frac{9}{4}x = 14$$

$$x = \frac{56}{9} = 6\frac{2}{9}$$

جد قيمة  $y$ .

$$y = 2\left(6\frac{2}{9}\right) - 8$$

$$= 12\frac{4}{9} - 8$$

$$= 4\frac{4}{9}$$

إحداثيات رؤوس المثلث هي:  $(-4, 7), (0, -8), \left(6\frac{2}{9}, 4\frac{4}{9}\right)$ .

**تحقق:** قارن بين الإحداثيين اللذين وجدتهما، وبين إحداثيي الرأس الثالث في التمثيل البياني، ولاحظ أن الإحداثي  $x$  للرأس الثالث محصور بين العددين  $6, 7$ ، لذا فإن القيمة  $6\frac{2}{9}$  معقولة، وكذلك الإحداثي  $y$  محصور بين العددين  $4, 5$ ، ولذا فإن القيمة  $4\frac{4}{9}$  معقولة أيضاً.

**تحقق من فهمك** ✓



$$5y \leq 2x + 9 \quad (4B)$$

$$y \leq -x + 6$$

$$9y \geq -2x + 5$$

$$y \geq -3x - 6 \quad (4A)$$

$$2y \geq x - 16$$

$$11y + 7x \leq 12$$




المثالان 1 , 2 حل كل نظام مما يأتي بيانياً:

$$\begin{array}{lll} (1) & y \leq 6 & (2) & y \leq -3x + 4 \\ & & & y \geq 2x - 1 \\ (3) & y > -2x + 10 & & y \leq -3x - 3 \end{array}$$

**مثال 3** (4) **مشتريات:** خصصت ليلي مبلغاً لا يتجاوز 350 ريالاً لشراء نوعين من الأقلام، يباع الأول في رزم تضم الواحدة منها 10 أقلام وثمانها 35 ريالاً، ويباع الثاني في رزم تضم الواحدة منها 8 أقلام وثمانها 25 ريالاً. فإذا أرادت ليلي شراء 40 قلمًا على الأقل من كلا النوعين. فاكتب نظام متباينات خطية يمثل هذا الموقف، ومثله بيانياً

**مثال 4** أوجد إحداثيات رؤوس المثلث الناتج عن التمثيل البياني لكل نظام مما يأتي:

$$\begin{array}{ll} (5) & y \geq 2x + 1 \\ & y \leq 8 \\ & 4x + 3y \geq 8 \\ (6) & y \geq -2x - 4 \\ & 6y \leq x + 28 \\ & y \geq 13x - 34 \end{array}$$



## تدرب وحل المسائل

المثالان 1 , 2 حل كل نظام مما يأتي بيانياً:

$$\begin{array}{lll} (7) & x < 3 & (8) & y > 3x - 5 \\ & & & y \geq -4 \\ (9) & y < -3x + 4 & (10) & y \geq 0 \\ & 3y + x > -6 & & y < x \\ (11) & 6x - 2y \geq 12 & (12) & -8x > -2y - 1 \\ & 3x + 4y > 12 & & -4y \geq 2x - 5 \\ (13) & 5y < 2x + 10 & (14) & 3y - 2x \leq -24 \\ & y - 4x > 8 & & y \geq \frac{2}{3}x - 1 \\ (15) & y > -\frac{2}{5}x + 2 & & 5y \leq -2x - 15 \end{array}$$

**مثال 3** (16) **عمل جزئي:** يعمل سعيد عاملين جزئيين ويتقاضى على كل منهما أجرًا؛ فيتقاضى 20 ريالاً عن كل ساعة في العمل الأول، و 24 ريالاً عن كل ساعة في العمل الثاني، فإذا علمت أنه يعمل مدة لا تزيد على 25 ساعة في كلا العاملين أسبوعياً. فاكتب نظاماً من متباينتين يبين عدد الساعات التي يعملها في كل من العاملين؛ ليجمع مبلغاً لا يقل عن 1850 ريالاً في 8 أسابيع، ثم مثله بيانياً.

**مثال 4** أوجد إحداثيات رؤوس المثلث الناتج عن التمثيل البياني لكل نظام مما يأتي:

$$\begin{array}{lll} (17) & x \geq 0 & (18) & y \geq 3x - 7 \\ & y \geq 0 & & y \leq 8 \\ & x + 2y < 4 & & x + y > 1 \\ (19) & x \leq 4 & (20) & -3x + 4y \leq 15 \\ & y > -3x + 12 & & 2y + 5x > -12 \\ & y \leq 9 & & 10y + 60 \geq 27x \\ (21) & 8y - 19x < 74 & (22) & 6y - 24x \geq -168 \\ & 38y + 26x \leq 119 & & 8y + 7x \geq 10 \\ & 54y - 12x \geq -198 & & 20y - 2x \leq 64 \end{array}$$



(23) **اتصالات:** يجري فهد مكالمات هاتفية من هاتفه المحمول مدتها لا تزيد على 800 دقيقة، بشرط أن لا يقل عدد دقائق الاتصال نهارًا عن ضعف عددها ليلاً، ولا يقل عدد دقائق الاتصال ليلاً عن 200 دقيقة. اكتب نظام متباينات يمثل الموقف، ومثله بيانياً.

(24) **أشجار:** تصنف الأشجار في الغابات تبعاً للارتفاع ومحيط الساق إلى أربع مجموعات، ويبين الجدول الآتي ارتفاع ومحيط ساق أشجار كل مجموعة من هذه المجموعات في إحدى الغابات:

المجموعة	الأشجار المسيطرة	الأشجار شبه المسيطرة	الأشجار المتوسطة	الأشجار غير المسيطرة
الارتفاع (ft)	أكثر من 72	56-72	40-55	أقل من 39
محيط الساق (in)	أكثر من 60	48-60	34-48	أقل من 33

(a) اكتب نظام متباينات خطية يمثل مدى كل من: الارتفاع  $h$  ومحيط الساق  $c$  للأشجار شبه المسيطرة ومثله بيانياً.  
(b) ما المجموعة التي تنتمي إليها شجرة زيزفون ارتفاعها 48ft؟ وما المدى الذي يقع فيه محيط ساقها؟



### الربط مع الحياة

تصنف الأشجار في الغابات وفقاً لوصول الضوء إلى أوراقها إلى أربعة أصناف: المسيطرة: أشجار يصل ضوء الشمس إلى أوراقها من أعلى فقط. شبه المسيطرة: أشجار يصل ضوء الشمس إلى أوراقها من أعلى ومن الجوانب. المتوسطة المسيطرة: أشجار ارتفاعها بسيط ويصل ضوء الشمس إلى أوراقها من أعلى فقط. غير المسيطرة: أشجار تنمو أسفل مستوى الأشجار الأخرى، وتكون تحت ظل الأشجار الأخرى.

حل كل نظام مما يأتي بيانياً:

$$|y| \geq x \quad (27)$$

$$y \geq |6 - x| \quad (26)$$

$$y \geq |2x + 4| - 2 \quad (25)$$

$$y < 2x$$

$$|y| \leq 4$$

$$3y + x \leq 15$$

$$|x| > y \quad (30)$$

$$6y + 2x \leq 9 \quad (29)$$

$$y > -3x + 1 \quad (28)$$

$$y \leq 6$$

$$2y + 18 \geq 5x$$

$$4y \leq x - 8$$

$$y \geq -2$$

$$y > -4x - 9$$

$$3x - 5y < 20$$

$$y \geq |x - 2| + 4 \quad (33)$$

$$8x + 4y < 10 \quad (32)$$

$$2x + 3y \geq 6 \quad (31)$$

$$y \leq [x] - 3$$

$$y > |2x - 1|$$

$$y \leq |x - 6|$$

جد إحداثيات رؤوس الشكل الناتج عن التمثيل البياني لكل نظام مما يأتي:

$$2y - x \geq -20 \quad (36)$$

$$y \geq -x - 8 \quad (35)$$

$$y \geq 2x - 12 \quad (34)$$

$$y \geq -3x - 6$$

$$2y \geq 3x - 20$$

$$y \leq -4x + 20$$

$$y \leq -2x + 2$$

$$4y + x \leq 24$$

$$4y - x \leq 8$$

$$y \leq 2x + 14$$

$$y \leq 4x + 22$$

$$y \geq -3x + 2$$

(37) **رياضة:** يريد معلم التربية البدنية أن يختار من 10 إلى 15 لاعباً ليشكل فريق كرة سلة على أن يكون اللاعبون من طلاب الصفين الثاني والثالث، ويكون عدد اللاعبين من الصف الثالث أكثر من لاعبي الصف الثاني. اكتب نظام متباينات يمثل ذلك الموقف، ومثله بيانياً.




(38) **إدارة الوقت:** يستثمر رامي وقت فراغه في تلاوة القرآن الكريم وممارسة الرياضة. فإذا كان مجمل وقت فراغه لا يتجاوز 20 ساعة أسبوعياً، ويقضي من 4 إلى 10 ساعات منها في ممارسة الرياضة، ولا يقل زمن تلاوته للقرآن الكريم عن 10 ساعات ولا يزيد على 14 ساعة. فاكتب نظام متباينات خطية يمثل ذلك الموقف، ومثله بيانياً.



### مسائل مهارات التفكير العليا

(39) **مسألة مفتوحة:** اكتب نظاماً من متباينتين على أن يكون الحل:

- (a) في الربع الثالث فقط.  
(b) غير موجود.  
(c) واقعاً على مستقيم.  
(d) نقطة واحدة فقط.



(40) **تحذّر:** في الشكل المجاور، اكتب نظام المتباينات التي تمثل المنطقة المظللة حللاً له.

(41) **تبرير:** هل الجملة الآتية صحيحة أم غير صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة فأعط مثلاً مضاداً.

"النظام المكون من متباينتين خطيتين إما أن يكون ليس له حل أو أن يكون له عدد لا نهائي من الحلول".

(42) **اكتب:** وضح بخطوات مكتوبة طريقة تحديد منطقة التظليل عند حل نظام متباينات خطية بيانياً.

### الربط مع الحياة

حث الإسلام على استثمار الوقت والحرص عليه، قال صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟". [رواه الترمذي].

### تدريب على اختبار

(44) **إجابة قصيرة:** إذا كانت  $3x = 2y$ ،  $5y = 6z$ ، فما قيمة  $x$  بدلالة  $z$ ؟

x	y
1	5
2	8
3	11
4	14
5	17
6	20

(43) بين الجدول المجاور العلاقة بين  $x$  و  $y$ .  
فأي المعادلات الآتية تمثل هذه العلاقة؟

- A  $y = 3x - 2$   
B  $y = 3x + 2$   
C  $y = 4x + 1$   
D  $y = 4x - 1$

### مراجعة تراكمية

مثّل كل متباينة مما يأتي بيانياً: (الدرس 1-4)

(47)  $5x + 7y \geq -20$

(46)  $4x - 3y < 10$

(45)  $x + y \leq 6$

مثّل كل دالة مما يأتي بيانياً، وحدّد كلاً من مجالها ومداهما: (الدرس 1-3)

(49)  $h(x) = [x] - 5$

(48)  $f(x) = |x - 3|$

إذا كان  $f(x) = 2x + 5$ ،  $g(x) = 3x - 4$ ، فأوجد قيمة كل مما يأتي: (الدرس 1-2)

(51)  $f(-0.25)$

(50)  $g(-2)$

(52)  $g(-0.75)$







الهدف

أستعمل الحاسبة البيانية لحل أنظمة متباينات خطية.

يمكنك استعمال الحاسبة البيانية TI-nspire لحل أنظمة متباينات خطية بيانياً.

مثال

حل نظام من متباينتين خطيتين

استعمل الحاسبة البيانية لحل النظام المكوّن من المتباينتين الآتيتين:

$$y \geq -3x + 4$$

$$y \leq 2x - 1$$

الخطوات:

- افتح الآلة الحاسبة بالضغط على  $\text{ON}$ .
- من الشاشة الظاهرة اختر  $\text{1}$  مستعملاً الأسهم (مستعملاً الأسهم).
- من الشاشة الظاهرة اختر  $\text{2}$  إضافة تطبيق الرسوم البيانية (مستعملاً الأسهم).
- اكتب المتباينة الأولى  $y \geq -3x + 4$ ، وذلك بالضغط على مفتاح  $\text{del}$ ، ثم اختر الإشارة  $\geq$  مستعملاً الأسهم فتظهر  $y \geq$ ، ثم أكمل كتابة المتباينة ثم اضغط  $\text{enter}$ .
- اكتب المتباينة الثانية  $y \leq 2x - 1$  بالضغط على المفتاح  $\text{tab}$  ثم المفتاح  $\text{del}$ ، ثم اختر الإشارة  $\leq$  مستعملاً الأسهم فتظهر  $y \leq$ ، ثم أكمل كتابة المتباينة ثم اضغط  $\text{enter}$ ، فتكون منطقة الحل هي منطقة التظليل المشترك.

لاحظ نمط التظليل فوق المستقيم  $y = -3x + 4$ ، وتحت المستقيم  $y = 2x - 1$ .

إن منطقة الحل هي المنطقة الناتجة عن تقاطع نمطي التظليل، وهي المنطقة التي تحوي جميع النقاط التي تحقق النظام  $y \geq -3x + 4, y \leq 2x - 1$ .

تمارين:

استعمل الحاسبة البيانية لحل كل نظام من متباينتين مما يأتي:

(3)  $y \geq 2 - x$

$y \leq x + 3$

(6)  $y + 5x \geq 12$

$y - 3 \leq 10$

(9)  $\frac{1}{6}y - x \geq -3$

$\frac{1}{5}y + x \leq 7$

(2)  $y \geq -4x$

$y \leq -5$

(5)  $2y \geq 3x - 1$

$3y \leq -x + 7$

(8)  $10y - 7x \geq -19$

$7y - 5x \leq 11$

(1)  $y \geq 3$

$y \leq -x + 1$

(4)  $y \geq 2x + 1$

$y \leq -x - 1$

(7)  $5y + 3x \geq 11$

$3y - x \leq -8$





# البرمجة الخطية والحل الأمثل

## Optimization with Linear Programming

# 1-6

### لماذا؟

يبين الجدول أدناه أكبر وأقل عدد للأثواب المنتجة في اليوم الواحد من المقاسين الكبير والصغير، وتكلفة إنتاج كل ثوب منها في أحد المصانع الوطنية.

عدد الأثواب المنتجة في اليوم الواحد			
المقاس	أقل عدد	أكبر عدد	تكلفة إنتاج الثوب
صغير	600	1500	55 ريالاً
كبير	800	1700	70 ريالاً

إذا كان عدد الأثواب المطلوب إنتاجها من المقاسين في اليوم الواحد لا يقل عن 2000 ثوب، فكم ثوباً من كل مقاس يجب إنتاجه لتكون التكلفة أقل ما يمكن؟

هناك قيود إضافية على إنتاج المصنع ناجمة عن الطلب والشحن وكفاءة المصنع. وللتعبير عن هذه القيود يمكن استعمال أنظمة المتباينات الخطية.

**القيمة العظمى والقيمة الصغرى:** تواجه المصانع في كثير من الأحيان أوضاعاً ضمن قيود مختلفة وتسعى للوصول إلى أقل تكلفة أو إلى أعلى ربح. مثل هذه الأوضاع يمكن التعامل معها عادة باستعمال البرمجة الخطية.

**البرمجة الخطية:** هي طريقة لإيجاد القيمة العظمى أو الصغرى لدالة ما تحت قيود معينة كل منها عبارة عن متباينة خطية، وذلك بعد تمثيل نظام المتباينات بيانياً، وتقع القيمة العظمى أو الصغرى - إن وجدت - للدالة ذات الصلة دائماً عند أحد رؤوس منطقة الحل.

### فيما سبق:

درست حل أنظمة متباينات خطية بيانياً.  
(مهارة سابقة)

### والآن:

- أجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى لدالة ضمن منطقة الحل.
- أستعمل البرمجة الخطية لإيجاد الحل الأمثل لمسائل حياتية.

### المفردات:


- القيود constraints
- البرمجة الخطية linear programming
- محدودة bounded
- غير محدودة unbounded
- الحل الأمثل optimize

أضف إلى


مطويتك

### منطقة الحل

### مفهوم أساسي



إذا كانت منطقة الحل مفتوحة وممتدة، فهي بذلك غير محدودة، ويمكن أن تحتوي على قيمة عظمى أو قيمة صغرى.



إذا كانت منطقة الحل محدودة (مغلقة) أو محصورة بقيود كما في الشكل أعلاه، فإن القيمة العظمى والقيمة الصغرى للدالة تظهر دائماً عند رؤوس منطقة الحل.




رمز الدالة

يستعمل الرمز  $f(x, y)$  للتعبير عن الدالة في المتغيرين  $x, y$ . وتقرأ  $f$  على  $x$  و  $y$ .

مثال 1

منطقة الحل المحدودة

مثل نظام المتباينات الآتي بيانياً، ثم حدّد إحداثيات رؤوس منطقة الحل، وأوجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى للدالة المعطاة في هذه المنطقة:



$$3 \leq y \leq 6$$

$$y \leq 3x + 12$$

$$y \leq -2x + 6$$

$$f(x, y) = 4x - 2y$$

**الخطوة 1:** مثل المتباينات بيانياً، وحدّد إحداثيات الرؤوس.

**الخطوة 2:** جد قيمة الدالة عند كل رأس.

$(x, y)$	$4x - 2y$	$f(x, y)$
$(-3, 3)$	$4(-3) - 2(3)$	$-18$
$(1.5, 3)$	$4(1.5) - 2(3)$	$0$
$(0, 6)$	$4(0) - 2(6)$	$-12$
$(-2, 6)$	$4(-2) - 2(6)$	$-20$

← قيمة عظمى

← قيمة صغرى

القيمة العظمى للدالة تساوي 0 وتكون عند النقطة  $(1.5, 3)$ ، والقيمة الصغرى للدالة تساوي  $-20$  وتكون عند النقطة  $(-2, 6)$ .

تحقق من فهمك

(1B)  $-6 \leq y \leq -2$

$$y \leq -x + 2$$

$$y \leq 2x + 2$$

$$f(x, y) = 6x + 4y$$

(1A)  $-2 \leq x \leq 6$

$$1 \leq y \leq 5$$

$$y \leq x + 3$$


$$f(x, y) = -5x + 2y$$

إذا نتج عن التمثيل البياني لنظام متبايناتٍ منطقةً مفتوحة وممتدة، فإنها تكون غير محدودة.

مثال 2

منطقة الحل غير المحدودة

مثل نظام المتباينات الآتي بيانياً، ثم حدّد إحداثيات رؤوس منطقة الحل، وأوجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى للدالة المعطاة في هذه المنطقة:



$$2y + 3x \geq -12, y \leq 3x + 12, y \geq 3x - 6, f(x, y) = 9x - 6y$$

مثل المتباينات بيانياً، وأوجد قيمة الدالة عند كل رأس؛ لأن القيمة العظمى أو الصغرى - إن وجدت - تكون عند الرؤوس.

$(x, y)$	$9x - 6y$	$f(x, y)$
$(-4, 0)$	$9(-4) - 6(0)$	$-36$
$(0, -6)$	$9(0) - 6(-6)$	$36$

القيمة العظمى للدالة تساوي 36 وتكون عند النقطة  $(0, -6)$ ، ولا توجد قيمة صغرى للدالة؛ لأن هناك نقطة أخرى في منطقة الحل وهي  $(0, 8)$  وتُعطي القيمة  $-48$  للدالة وهي أقل من  $-36$ .

تحقق من فهمك



(2B)  $y \geq x - 9$

$$y \leq -4x + 16$$

$$y \geq -4x - 4$$

$$f(x, y) = 10x + 7y$$

(2A)  $y \leq 8$

$$y \geq -x + 4$$

$$y \leq -x + 10$$

$$f(x, y) = -6x + 8y$$

تنبيه

القيمة العظمى والصغرى

لا تفترض عدم وجود قيم عظمى أو صغرى إذا كانت منطقة الحل غير محدودة، بل اختبر قيمة الدالة عند كل رأس؛ لتحديد إذا كان هناك قيمة عظمى أو صغرى.



**إيجاد الحل الأمثل:** يُسمى البحث عن السعر أو الكمية الأفضل أو الأنسب لتقليل التكلفة أو زيادة الربح **الحل الأمثل**، ويمكنك الحصول على ذلك الحل باستعمال البرمجة الخطية.

أضف إلى مطويتك

### مفهوم أساسي

#### استعمال البرمجة الخطية لإيجاد الحل الأمثل

- الخطوة 1: حدّد المتغيرات.
- الخطوة 2: اكتب نظام متباينات خطية يمثل المسألة.
- الخطوة 3: مثل نظام المتباينات بيانياً.
- الخطوة 4: جد إحداثيات رؤوس منطقة الحل.
- الخطوة 5: اكتب الدالة الخطية التي تريد إيجاد قيمتها العظمى أو الصغرى.
- الخطوة 6: عوض إحداثيات الرؤوس في الدالة.
- الخطوة 7: اختر القيمة العظمى أو الصغرى وفقاً لما هو مطلوب في المسألة.



#### الربط مع الحياة


جاوز عدد مصانع الألبسة الجاهزة بالمملكة 300 مصنع، تغطي بإنتاجها المتميز نحو ثلث احتياجات السوق المحلية.

#### استعمال البرمجة الخطية لإيجاد الحل الأمثل

#### مثال 3 من واقع الحياة

**أعمال:** عد إلى الموقف الوارد في بداية هذا الدرس، واستعمل البرمجة الخطية لإيجاد عدد القطع التي يتطلب إنتاجها من المقاسين، لتكون التكلفة أقل ما يمكن.

**الخطوة 1:** افرض أن  $x$  هي عدد الأثواب المنتجة من المقاس الصغير.  $y$  هو عدد الأثواب المنتجة من المقاس الكبير.



**الخطوة 2:**  $600 \leq x \leq 1500$

$800 \leq y \leq 1700$

$x + y \geq 2000$

**الخطوتان 3 و 4:** مثل نظام المتباينات بيانياً كما في الشكل المجاور، ثم حدّد رؤوس منطقة الحل.

**الخطوة 5:** الدالة التي تريد إيجاد قيمتها الصغرى هي:

$$f(x, y) = 55x + 70y$$

**الخطوة 6:**

$(x, y)$	$55x + 70y$	$f(x, y)$
(600, 1700)	$55(600) + 70(1700)$	152000
(600, 1400)	$55(600) + 70(1400)$	131000
(1500, 1700)	$55(1500) + 70(1700)$	201500
(1500, 800)	$55(1500) + 70(800)$	138500
(1200, 800)	$55(1200) + 70(800)$	122000

← قيمة عظمى

← قيمة صغرى

**الخطوة 7:** يجب إنتاج 1200 ثوب من المقاس الصغير، و 800 ثوب من المقاس الكبير لتكون التكلفة أقل ما يمكن.

تحقق من فهمك

**3) مجوهرات:** تصوغ أسماء من 10 إلى 25 عقداً، ومن 15 إلى 40 سواراً شهرياً. فإذا كانت أجرة صياغة العقد 50 ريالاً، وأجرة صياغة السوار 30 ريالاً، وصاغت في أحد الأشهر 30 قطعة من العقود والأساور على الأقل، فكم قطعة من كلا النوعين عليها صياغتها لتحصل على أكبر أجر؟



مثّل كل نظام مما يأتي بيانيًا، ثم حدّد إحداثيات رؤوس منطقة الحل، وأوجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى للدالة المعطاة في هذه المنطقة:

المثالان 1, 2

$$\begin{array}{lll} (1) & y \leq 5 & \\ & x \leq 4 & \\ & y \geq -x & \\ & f(x, y) = 5x - 2y & \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} (2) & y \leq -3x + 6 & \\ & -y \leq x & \\ & y \leq 3 & \\ & f(x, y) = 8x + 4y & \end{array}$$

$$\begin{array}{l} (3) \\ y \geq -3x + 2 \\ 9x + 3y \leq 24 \\ y \geq -4 \\ f(x, y) = 2x + 14y \end{array}$$

$$\begin{array}{l} (6) \\ y \leq 2x + 6 \\ y \geq 2x - 8 \\ y \geq -2x - 18 \\ f(x, y) = 5x - 4y \end{array}$$

$$\begin{array}{l} (5) \\ -3 \leq y \leq 7 \\ 4y \geq 4x - 8 \\ 6y + 3x \leq 24 \\ f(x, y) = -12x + 9y \end{array}$$

$$\begin{array}{l} (4) \\ -2 \leq y \leq 6 \\ 3y \leq 4x + 26 \\ y \leq -2x + 2 \\ f(x, y) = -3x - 6y \end{array}$$

مثال 3 (7) ثقافة مالية: يبلغ مجموع ساعات العمل اليومي لعمال قسم الإنتاج في مصنع للغسالات 200 ساعة على الأكثر، ولعمال قسم ضبط الجودة 90 ساعة على الأكثر، ويبين الجدول الآتي عدد الساعات التي يتطلبها إنتاج وضبط جودة نوعين من الغسالات.

الزمن اللازم لتصنيع الغسالة		
قسم ضبط الجودة	قسم الإنتاج	
ساعتان	5 ساعات	النوع الأول
ساعتان	4 ساعات	النوع الثاني

- (a) اكتب نظام متباينات يمثل هذا الموقف.  
 (b) مثل نظام المتباينات بيانيًا، وحدّد منطقة الحل.  
 (c) حدّد إحداثيات رؤوس منطقة الحل.  
 (d) إذا كان ربح الغسالة من النوع الأول 80 ريالاً، ومن النوع الثاني 50 ريالاً، فاكتب دالة تمثل الربح الكلي لكلا النوعين.  
 (e) ما عدد الغسالات التي يجب تصنيعها من كل نوع للحصول على أكبر ربح ممكن؟ وما هو هذا الربح؟

### تدرب وحل المسائل

مثّل كل نظام مما يأتي بيانيًا، ثم حدّد إحداثيات رؤوس منطقة الحل، وأوجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى للدالة المعطاة في هذه المنطقة:

المثالان 1, 2

$$\begin{array}{lll} (8) & -8 \leq y \leq -2 & \\ & y \leq x & \\ & y \leq -3x + 10 & \\ & f(x, y) = 5x + 14y & \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} (9) & -3 \leq x \leq 2 & \\ & y \geq -2x - 6 & \\ & 4y \leq 2x + 32 & \\ & f(x, y) = -4x - 9y & \end{array}$$

$$\begin{array}{l} (10) \\ x + 4y \geq 2 \\ 2x + 4y \leq 24 \\ 2 \leq x \leq 6 \\ f(x, y) = 6x + 7y \end{array}$$

$$\begin{array}{l} (13) \\ y \geq |x - 2| \\ y \leq 8 \\ 5x \leq 49 \\ f(x, y) = -5x - 15y \end{array}$$

$$\begin{array}{l} (12) \\ x \geq -8 \\ 3x + 6y \leq 36 \\ 2y + 12 \geq 3x \\ f(x, y) = 10x - 6y \end{array}$$

$$\begin{array}{l} (11) \\ x \geq -6 \\ y + x \leq -1 \\ 2x + 3y \geq -9 \\ f(x, y) = -10x - 12y \end{array}$$



$$\begin{array}{lll} (14) & y \leq x + 4 & (15) & -4 \leq x \leq 8 \\ & y \geq x - 4 & & -8 \leq y \leq 6 \\ & y \leq -x + 10 & & y \geq x - 6 \\ & y \geq -x - 10 & & 4y + 7x \leq 31 \\ f(x, y) = -10x + 9y & & f(x, y) = 12x + 8y & \\ f(x, y) = 5x + 4y & & & \end{array}$$

**مثال 3 (17) صناعة:** ينتج مصنع نوعين من وحدات الإنارة؛ يباع النوع الأول بسعر 25 ريالاً، أما النوع الثاني فيباع بسعر 35 ريالاً. فإذا كانت الطاقة الإنتاجية للمصنع لا تزيد على 450 وحدة إنارة يومياً، وكان على المصنع أن ينتج ما لا يقل عن 100 وحدة إنارة من النوع الأول وما لا يزيد على 200 وحدة إنارة من النوع الثاني، فما عدد وحدات الإنارة اللازم إنتاجها من كل نوع ليكون دخل المصنع اليومي أكبر ما يمكن؟

**(18) طلاء:** إذا كان الوقت المتاح لمعاذ لطلاء 45 جداراً وسقفاً متساوون في المساحة في أحد المباني هو 20 يوماً، ويستطيع معاذ طلاء 2.5 جدار، أو سقفين في اليوم الواحد.

(a) اكتب نظام متباينات خطية يمثل هذا الموقف.



(b) مثل نظام المتباينات بيانياً، وحدد منطقة الحل وإحداثيات رؤوسها.

(c) إذا كان معاذ يتقاضى 26 ريالاً عن طلاء الجدار، و 30 ريالاً عن طلاء السقف، فكتب دالة تمثل المبلغ الكلي الذي سيتقاضاه.

(d) ما عدد الجدران والأسقف التي عليه طلاؤها ليتقاضى أكبر مبلغ؟ وما هو هذا المبلغ؟

**(19) شحن:** يشحن مزارع منتجاته بالتعاون مع شركة شحن مختصة، وذلك في حاويات مبردة تبلغ حمولة الواحدة منها 4200 kg، وحجم الحيز الذي توضع فيه البضائع بداخلها  $480 \text{ ft}^3$ ، وتوضع المنتجات في أثناء الشحن في صناديق بمقاسين؛ صغيرة حجمها  $3 \text{ ft}^3$  وتزن 25 kg، وكبيرة حجمها  $5 \text{ ft}^3$ ، وتزن 50 kg، وأجرة شركة الشحن هي 5 ريالات عن كل صندوق من المقاس الصغير، و 8 ريالات عن كل صندوق من المقاس الكبير.

(a) جد عدد الصناديق المشحونة من كلا النوعين لتكون الأجرة أكبر ما يمكن.

(b) ما أكبر أجرة ممكنة لحاوية الشحن؟

**(20) إعادة التدوير:** يقوم مصنع بإعادة تدوير ما لا يزيد على 1200 طن من البلاستيك شهرياً لصنع حاويات بمقاسين صغير وكبير، وعلى المصنع أن يستعمل ما لا يقل عن 300 طن في صنع الحاويات الصغيرة وما لا يقل عن 450 طناً في صنع الحاويات الكبيرة. إذا كان المصنع يحقق ربحاً قدره 175 ريالاً لكل طن بلاستيك تم استعماله لصنع الحاويات الصغيرة، و 200 ريال لكل طن تم استعماله لصنع الحاويات الكبيرة. فما أكبر ربح يمكن تحقيقه؟ وما عدد الأطنان المستعملة لكل نوع من الحاويات لتحقيق ذلك الربح؟



### الربط مع الحياة

تدوير المواد يحمي الإنسان، ويقلل الاستهلاك، ويرشد الطاقة، ويقي البيئة من المخلفات والانبعاثات الضارة.




## مسائل مهارات التفكير العليا

(21) **مسألة مفتوحة:** اكتب نظام متباينات خطية على أن تكون منطقة الحل محدودة وتقع في الربع الرابع فقط ومساحتها 20 وحدة مربعة.

(22) **تحديد:** جد مساحة المنطقة المحدودة بالمتباينات:  $y \geq |x| - 3, y \leq -|x| + 3, x \geq |y|$ .

(23) حدّد نظام المتباينات المختلف عن الأنظمة الثلاثة الأخرى فيما يأتي، وضح إجابتك.



(24) **تبرير:** حدّد إذا كانت الجملة الآتية صحيحة أحياناً أو صحيحة دائماً أو غير صحيحة أبداً. وضح إجابتك.

"في المنطقة غير المحدودة لا يكون للدالة قيمة عظمى وقيمة صغرى في الوقت نفسه"

## تدريب على اختبار

(26) **هندسة:** أيّ مما يأتي يُعد وصفاً مناسباً للتمثيل البياني

للمعادلتين  $4y = 12x + 16, y = 3x - 5$ ؟

A مستقيمان لهما المقطع  $y$  نفسه.

B مستقيمان متعامدان.

C مستقيمان لهما المقطع  $x$  نفسه.

D مستقيمان متوازيان.

(25) حصل عامل على مبلغ 1950 ريالاً أجرة تبليط مساحة من الأرضيات والجدران في أحد البيوت، فإذا كانت أجرة تبليط المتر المربع من الأرضيات 12 ريالاً، وأجرة تبليط المتر المربع من الجدران 15 ريالاً وكان عدد أمتار بلاط الأرضيات يقل عن 3 أمثال عدد أمتار بلاط الجدران بـ  $16m^2$ ، فأى أنظمة المعادلات الآتية تمثل هذا الموقف؟

A  $x + y = 1950$

B  $12x + 15y = 1950$

$x + 16 = 3y$

C  $2x + 3y = 15$

D  $x - y = 1950$

$12x + 15y = 3$

$x + y = 12$

## مراجعة تراكمية

حل كل نظام مما يأتي بيانياً: (الدرس 1-5)

(29)  $3y \leq 2x - 8$

$y \geq \frac{2}{3}x - 1$

(28)  $4x - 3y < 7$

$2y - x < -6$

(27)  $3x + 2y \geq 6$

$4x - y \geq 2$

حدّد مجموعة الأعداد التي ينتمي إليها كل عدد فيما يأتي: (الدرس 1-1)

(31)  $-\frac{1}{3}$

(30)  $-7$

(32)  $\sqrt{3}$





المفردات

الدالة المتعددة التعريف الخطية (26)	الأعداد الحقيقية (12)
الدالة الدرجية (26)	الأعداد النسبية (12)
دالة أكبر عدد صحيح (26)	الأعداد غير النسبية (12)
دالة القيمة المطلقة (27)	الأعداد الصحيحة (12)
المتباينة الخطية (32)	الأعداد الكلية (12)
منطقة الحل (32)	الأعداد الطبيعية (12)
الحد (32)	الدالة المتباينة (18)
نظام المتباينات الخطية (37)	العلاقة المنفصلة (19)
القيود (44)	العلاقة المتصلة (19)
البرمجة الخطية (44)	اختبار الخط الرأسي (19)
محدودة (44)	المتغير المستقل (21)
غير محدودة (44)	المتغير التابع (21)
الحل الأمثل (46)	رمز الدالة (21)
	الدالة المتعددة التعريف (25)

اختبار المفردات

- حدد إذا كانت كل من العبارتين الآتيتين صحيحة أم خاطئة؟
- $\sqrt{12}$  ينتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية.
  - تحتوي مجموعة الأعداد النسبية على الكسور العشرية المنتهية والدورية.

اختر المصطلح المناسب بين الأقواس لإكمال كل جملة فيما يأتي:

(3) تكون الدالة (منفصلة، متباينة) إذا كان كل عنصر في المجال مرتبطاً بعنصر مختلف في المدى، على أن لا يكون لأكثر من عنصر في المجال الصورة نفسها.

(4) (مجال، مدى) العلاقة هو مجموعة إحداثيات  $x$  للأزواج المرتبة التي تكون العلاقة.

(5) تُسمى الدالة التي تكتب باستعمال تعبيرين أو أكثر دالة (خطية، متعددة التعريف).

أكمل كل جملة فيما يأتي بالمصطلح المناسب:

(6) هي طريقة لإيجاد القيمة الصغرى أو العظمى لدالة تحت شروط معينة يُعبّر عنها بنظام من المتباينات.

(7) إيجاد \_\_\_\_\_ يعني إيجاد السعر الأفضل أو التكلفة الأنسب باستعمال البرمجة الخطية.

(8) تُسمى منطقة الحل المفتوحة \_\_\_\_\_.

ملخص الفصل

مفاهيم أساسية

خصائص الأعداد الحقيقية (الدرس 1-1)

- تُقسم مجموعة الأعداد الحقيقية إلى مجموعتين، هما: مجموعة الأعداد النسبية (Q)، ومجموعة الأعداد غير النسبية (I). أما مجموعة الأعداد النسبية فتحتوي: مجموعة الأعداد الصحيحة (Z)، ومجموعة الأعداد الكلية (W)، ومجموعة الأعداد الطبيعية (N).

العلاقات والدوال (الدرس 1-2)

- الدالة هي علاقة يرتبط فيها كل عنصر في المجال بعنصر واحد فقط في المدى.

دوال خاصة (الدرس 1-3)

- الدالة المتعددة التعريف: هي الدالة التي تكتب باستعمال أكثر من عبارة.

تمثيل المتباينات الخطية ومتباينات القيمة المطلقة

بيانياً (الدرس 1-4)

- يمكنك تمثيل المتباينة باتباع الخطوات الآتية:
  - الخطوة 1: مثل المعادلة الخطية المرتبطة بها، وحدد إذا كان حد المتباينة متقطعاً أو متصلًا.
  - الخطوة 2: اختر نقطة لا تقع على حد المتباينة واختبرها إن كانت تحقق المتباينة أم لا.
  - الخطوة 3: إذا كانت النقطة تحقق المتباينة، فظلّل المنطقة التي تحتوي على النقطة. وإلا فظلّل المنطقة الأخرى.

حل أنظمة المتباينات الخطية بيانياً (الدرس 1-5)

- يمكن إيجاد حل نظام متباينات خطية عن طريق تمثيل المتباينات بيانياً وإيجاد منطقة الحل، وهي المنطقة المشتركة بين حلول متباينات النظام، وإذا لم يكن هناك منطقة مشتركة فإن مجموعة الحل هي  $\emptyset$ .

البرمجة الخطية والحل الأمثل (الدرس 1-6)

- إيجاد القيمة الصغرى أو العظمى لدالة في منطقة على المستوى الإحداثي يحددها نظام متباينات يمثل قيوداً على الدالة.
- إيجاد الحل الأمثل يعني إيجاد السعر أو الكمية التي تجعل الربح أكبر ما يمكن، أو التكلفة أقل ما يمكن.

المطويات منظم أفكار



تأكد من أن المفاهيم الأساسية مدونة في مطويتك.



مثال 1

حدّد مجموعات الأعداد التي ينتمي إليها العدد  $\sqrt{50}$   
 $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$  مجموعة الأعداد غير النسبية (I)، ومجموعة  
 الأعداد الحقيقية (R)


مثال 2

بسّط العبارة:  $-4(a + 3b) + 5b$

خاصية التوزيع  $-4(a + 3b) + 5b = -4(a) + -4(3b) + 5b$

اضرب  $= -4a - 12b + 5b$

بسّط  $= -4a - 7b$



حدّد مجموعات الأعداد التي ينتمي إليها كل عدد ممّا يأتي :

(9)  $1.\bar{3}$  (10)  $\sqrt{4}$  (11)  $-\frac{3}{4}$

بسّط كل عبارة مما يأتي :

(12)  $4x - 3y + 7x + 5y$

(13)  $2(a + 3) - 4a + 8b$

(14)  $4(2m + 5n) - 3(m - 7n)$

(15) مال: اشترى سعد 3 شطائر بسعر 3.5 ريالاً للشطيرة الواحدة، و 3 علب عصير بسعر 2.5 ريالاً للعلبة الواحدة.

(a) استعمل خاصية التوزيع لتكتب عبارتين تمثل كل منهما المبلغ الذي دفعه سعد.

(b) أوجد المبلغ الذي دفعه سعد باستعمال خاصية التوزيع.

مثال 3

حدد مجال العلاقة

$\{(2, 6), (3, -1), (-2, 4), (-1, 0), (-4, 3)\}$  ومداها. ثم حدد

إن كانت تمثّل دالة أم لا. وهل هي متباينة أم لا؟

المجال:  $\{-4, -2, -1, 2, 3\}$

المدى:  $\{-1, 0, 3, 4, 6\}$

كل عنصر في المجال مرتبط بعنصر واحد فقط في المدى، مما يعني أن العلاقة تمثل دالة. العناصر المختلفة في المجال لها صور مختلفة في المدى، إذاً الدالة متباينة.

مثال 4

إذا كانت  $f(x) = 4x - 3$ ، فأوجد  $f(-2)$ .

عوض عن  $x$  بـ  $-2$   $f(-2) = 4(-2) - 3$

اضرب  $= -8 - 3$

بسّط  $= -11$

حدد مجال كلّ علاقة مما يأتي ومداها، وبيّن ما إذا كانت دالة أم لا، وإذا كانت كذلك فهل هي متباينة أم لا؟

(16)  $\{(1, 2), (3, 4), (5, 6), (7, 8)\}$

(17)  $\{(-3, 0), (0, 2), (2, 4), (4, 5), (5, 2)\}$

(18)  $\{(-4, 1), (3, 3), (1, 1), (-2, 5), (3, -4)\}$

(19)  $\{(7, -4), (5, -2), (3, 0), (1, 2), (-1, 4)\}$

إذا كانت  $f(x) = -3x + 2$ ، أوجد قيمة كل مما يأتي:

(20)  $f(4)$  (21)  $f(-3)$

(22)  $f(0)$  (23)  $f(y)$

(24)  $f(-a)$  (25)  $f(2w)$


(26) مناسبات: تتقاضى مؤسسة لتجهيز المناسبات 100 ريالاً عن توصيل اللوازم لمكان المناسبة، و 4 ريالاً أجره يومية عن كل كرسي. ويمكن تمثيل ما تتقاضاه هذه المؤسسة عند استئجار  $x$  كرسيًا بالمعادلة:  $y = 100 + 4x$ . أوجد مجال هذه المعادلة ومداها، ثم حدد ما إذا كانت المعادلة دالة أم لا، وهل هي متصلة أم منفصلة؟



1-3 دوال خاصة (الصفحات: 25-30)

مثال 5

اكتب الدالة المتعددة التعريف الممثلة بيانياً في الشكل أدناه:



دالة الجزء الأيسر من التمثيل البياني هي  $f(x) = 3$ . الدائرة غير المظللة عند النقطة  $(-2, 3)$ ، تعني أن الدالة الخطية معرّفة عندما  $x < -2$ .

دالة الجزء الأوسط من التمثيل البياني هي  $f(x) = x - 1$ . وتعني كل من الدائرة المظللة عند النقطة  $(-2, -3)$  والدائرة غير المظللة عند النقطة  $(2, 1)$ ، أن الدالة معرّفة عندما  $-2 \leq x < 2$ .

دالة الجزء الأيمن من التمثيل البياني هي  $f(x) = 2x$ . والدائرة المظللة عند النقطة  $(2, 4)$ ، تعني أن الدالة معرّفة عندما  $x \geq 2$ .


$$f(x) = \begin{cases} 3, & x < -2 \\ x - 1, & -2 \leq x < 2 \\ 2x, & x \geq 2 \end{cases}$$

مثل كل دالة فيما يأتي بيانياً، ثم حدد مجالها ومداهما:

$$f(x) = \begin{cases} -2x, & x \leq -1 \\ x + 1, & -1 < x < 3 \\ x, & x \geq 3 \end{cases} \quad (27)$$

$$f(x) = \begin{cases} -3, & x < -1 \\ 4x - 3, & -1 \leq x \leq 3 \\ x, & x > 3 \end{cases} \quad (28)$$

(29) اكتب الدالة المتعددة التعريف الممثلة بيانياً في الشكل أدناه:



مثل كل دالة فيما يأتي بيانياً، ثم حدد كلاً من مجالها ومداهما:

$$f(x) = [x] + 2 \quad (30)$$

$$f(x) = [x + 3] \quad (31)$$






مثال 6

مثل المتباينة  $x - 2y > 6$  بيانياً.

بما أن المتباينة تحتوي على إشارة  $>$ ، فإن حد المتباينة يكون متقطعاً، مثل بيانياً المعادلة المرتبطة  $x - 2y = 6$ .

اختبر النقطة  $(0, 0)$  التي لا تقع على حد المتباينة



$$x - 2y > 6$$

$$0 - 2(0) > 6$$

$$0 > 6$$

ظلّ المنطقة التي لا تحوي  $(0, 0)$

مثل كل متباينة فيما يأتي بيانياً:

$$(32) \quad x - 3y < 6$$

$$(33) \quad y \geq 2x + 1$$

$$(34) \quad 2x + 4y \leq 12$$

$$(35) \quad y > -3x - 5$$

$$(36) \quad y > |2x|$$

$$(37) \quad y \geq |2x - 2|$$

$$(38) \quad y + 3 < |x + 1|$$

$$(39) \quad 2y \leq |x - 3|$$

(40) **شراء:** وفر بندر 46 ريالاً لشراء مجموعة من الدفاتر، والأقراص المدمجة، فإذا كان سعر الدفتر الواحد 4 ريالات، وسعر القرص المدمج 3 ريالات، اكتب متباينة تمثل عدد الدفاتر والأقراص المدمجة التي يمكن شراؤها، ثم مثلها بيانياً.


مثال 7

حل نظام المتباينات الآتي بيانياً:

$$y \geq \frac{3}{2}x - 3$$

$$y < 4 - 2x$$

منطقة الحل هي المنطقة التي كل نقطة من نقاطها تحقق كلتا المتباينتين، وهي المنطقة المظللة في الشكل أدناه.



حل كل نظام مما يأتي بيانياً:

$$(41) \quad y < 2x - 3$$

$$(42) \quad |y| > 2$$

$$x > 3$$

$$y \geq 4$$

$$(43) \quad y \geq x + 3$$

$$(44) \quad y > x + 1$$

$$x < -2$$

$$2y \leq x - 5$$


(45) **مجوهرات:** أمضى صانع مجوهرات ما لا يزيد على 3 ساعات في صياغة الخواتم. فإذا كان الزمن الذي يتطلبه تجهيز المعدات 15 دقيقة، والزمن الذي يتطلبه صياغة الخاتم الواحد 25 دقيقة، فاكتب نظام متباينات يصف الموقف، ومثله بيانياً.



مثال 8

**زراعة:** يزرع فيصل ما لا يزيد على 300 شتلة من نوعين من الأشجار في مزرعته التي مساحتها  $5184 \text{ m}^2$ ، حيث تحتاج الشجرة الواحدة من النوع (A) إلى مساحة  $6 \text{ m}^2$ ، ومن النوع (B) إلى  $24 \text{ m}^2$ ، وذلك لتوفير مسافة كافية بين الأشجار. إذا كان سعر الشتلة الواحدة من النوع (A) 8 ريالات، وسعر الشتلة الواحدة من النوع (B) 12 ريالاً. فما عدد الشتلات من كل نوع الذي يجعل التكلفة أكبر ما يمكن؟

افرض أن  $x$  هي عدد الشتلات من النوع (A)، و  $y$  هي عدد الشتلات من النوع (B).




$$\begin{aligned} x &\geq 0, y \geq 0 \\ 6x + 24y &\leq 5184 \\ x + y &\leq 300 \end{aligned}$$

مثل المتباينات بيانياً، ولاحظ أن النقاط  $(0, 0)$ ,  $(300, 0)$ ,  $(0, 216)$ ,  $(112, 188)$  تمثل رؤوس منطقة الحل.

دالة التكلفة هي:  $f(x, y) = 8x + 12y$

القيمة 3152 ريالاً هي القيمة العظمى للتكلفة وتحصل عند النقطة  $(112, 188)$ . ولذلك إذا زرع فيصل 112 شتلة من النوع (A)، و 188 شتلة من النوع (B) فإن التكلفة تكون أكبر ما يمكن.



**46) تنسيق أزهار:** يعمل جميل منسقاً للأزهار، ويقوم بتنسيق نوعين من باقات الأزهار. يحتاج النوع الأول منها إلى 18 دقيقة، والنوع الثاني إلى 10 دقائق. ولا يزيد عدد الباقات التي ينتجها أسبوعياً من النوع الثاني عن ضعف عدد باقات النوع الأول. فإذا كان جميل يعمل مدة لا تزيد على 40 ساعة أسبوعياً وكان ربحه في تنسيق الباقة من النوع الأول 10 ريالات، ومن النوع الثاني 25 ريالاً. فحدد عدد الباقات التي يجب عليه تنسيقها من كل نوع أسبوعياً ليحصل على أكبر ربح.

**47) صناعة:** ينتج مصنع نوعين من الأحذية على مرحلتين، ويحتاج الحذاء من النوع الأول إلى ساعتين في المرحلة الأولى وساعة واحدة في المرحلة الثانية، ويحقق ربحاً قدره 20 ريالاً. أما الحذاء من النوع الثاني فيحتاج إلى ساعة واحدة في المرحلة الأولى و 3 ساعات في المرحلة الثانية ويحقق ربحاً قدره 15 ريالاً. فإذا كان مجموع ساعات العمل اليومي لموظفي المرحلة الأولى لا يزيد على 40 ساعة ولا يزيد على 60 ساعة لموظفي المرحلة الثانية، فما أكبر ربح يمكن أن تحققه الشركة يومياً؟ وما عدد الأحذية من كل نوع الذي يحقق هذا الربح؟



حل كل نظام مما يأتي بيانياً :

$$2x + 3y > 12 \quad (13) \quad x + y \leq 4 \quad (12)$$

$$3x - y < 21 \quad y \geq x$$

$$2y - 5x \leq 6 \quad (15) \quad x - y > 0 \quad (14)$$

$$4x + y < -4 \quad 4 + y \leq 2x$$

(16) **اختيار من متعدد:** استأجر خالد سيارة ليوم واحد من إحدى الشركات، فدفع 100 ريال أجرة يومية وريالاً واحداً عن كل كيلومتر تقطعه السيارة بعد قطعها مسافة 200 كيلومتر، أما سعيد فاستأجر سيارة من شركة أخرى، ليوم واحد أيضاً فدفع 50 ريالاً أجرة يومية وريالين عن كل كيلومتر تقطعه السيارة بعد قطعها مسافة 200 كيلومتر. فما عدد الكيلومترات التي تجعل قيمة الاستئجار من الشركتين متساوية؟

304 C 292 A

275 D 250 B

(17) **نجارة:** تصنع ورشة نجارة طاولات ومقاعد ثم تقوم بطاقتها. ويبين الجدول الآتي الزمن الذي تتطلبه صناعة وطلاء كل من الطاولة والمقعد:

المنتج	زمن الصناعة بالساعات	زمن الطلاء بالساعات
مقعد	3	0.5
طاولة	2	1

إذا كان مجموع ساعات عمل فنيي صناعة المنتجات 108 ساعات يومياً، ومجموع ساعات عمل فنيي دهان المنتجات 20 ساعة يومياً، وكان ربح الورشة من الطاولة الواحدة 35 ريالاً، ومن المقعد الواحد 25 ريالاً فكم طاولة ومقعداً يجب صنعهما يومياً ليكون الربح أكبر ما يمكن؟

(a) بفرض أن عدد الطاولات  $t$ ، وعدد الكراسي  $c$ ، اكتب نظام متباينات يمثل الموقف.

(b) مثل منطقة الحل بيانياً.

(c) جد عدد الطاولات وعدد المقاعد التي يجب صنعها ليكون الربح أكبر ما يمكن. وما أكبر ربح؟

مثل نظام المتباينات الآتي بيانياً، وحدد إحداثيات رؤوس منطقة الحل، ثم أوجد القيمة العظمى والصغرى للدالة المعطاة في منطقة الحل:

$$y \leq 5, 4x + y \leq 5, -2x + y \leq 5 \quad (18)$$

$$f(x, y) = 4x - 3y$$


(1) بسط العبارة:  $-4(3a + b) - 2(a - 5b)$ .

(2) **اختيار من متعدد:** إذا كان  $3m + 5 = 23$ ، فما قيمة  $2m - 3$ ؟

9 C 105 A

6 D  $\frac{47}{3}$  B

(3) **بستنة:** يريد عبد الله تصميم 3 أحواض للورود في حديقة منزله، فأحاط كلاً منها بسياج.



فإذا كانت الأحواض الثلاثة متطابقة ولها الشكل المجاور، فكم قدمًا من السياج يحتاج إليه لإحاطة الأحواض الثلاثة؟

(4) إذا كان  $x = \frac{2}{3}$ ،  $y = -2$  فأوجد قيمة  $\frac{3(x+y)}{4xy^2}$

(5) حدد مجال العلاقة المبينة في الجدول الآتي ومداهما، ثم حدد إذا كانت تمثل دالة أم لا، وهل هي متباينة أم لا؟

x	y
-2	3
4	-1
3	2
6	3

إذا كانت  $f(x) = -2x + 3$  فأوجد قيمة كل مما يأتي:

$f(-4)$  (6)  $f(3y)$  (7)

(8) **اختيار من متعدد:** إذا كانت تكلفة إنتاج  $x$  فطيرة جبن في أحد المخابز يُعبر عنها بالدالة  $C(x) = 6 + 0.75x$ ، فأوجد تكلفة إنتاج 20 فطيرة.

13.5 ريالاً A 21 ريالاً C

28.61 ريالاً B 38.4 ريالاً D

(9) مثل الدالة  $f(x)$  بيانياً.

$$f(x) = \begin{cases} -x, & x < -2 \\ x + 2, & -2 \leq x \leq 2 \\ 5, & x > 2 \end{cases}$$

مثل كل متباينة فيما يأتي بيانياً:

$2x + 6y < -12$  (11)

$y \geq 4x - 1$  (10)



## الإعداد للاختبارات المعيارية



### الأسئلة ذات الإجابات القصيرة

تتطلب منك الأسئلة ذات الإجابات القصيرة أن تقدم لها حلاً، متضمناً الطريقة والتبريرات والتفسيرات التي استعملتها. وفي العادة يتم تصحيح هذه الأسئلة وتُحدّد درجاتها باستعمال سلالمة التقدير. وهذا مثال على تصحيح هذا النوع من الأسئلة.

سلامة التقدير		
الدرجة	المعايير	
2	الإجابة صحيحة مدعمة بتفسيرات كاملة توضح كل خطوة.	
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>الإجابة صحيحة، لكن التفسيرات ليست كاملة.</li> <li>الإجابة غير صحيحة، لكن التفسيرات صحيحة.</li> </ul>	
0	لم يُقدم أي إجابة، أو أن الإجابة ليس لها معنى.	

### استراتيجيات حل الأسئلة ذات الإجابة القصيرة

#### خطوة 1

اقرأ المسألة جيداً؛ كي تفهم الشيء الذي تحاول حله.

- حدد الحقائق ذات العلاقة.
- ابحث عن الكلمات المفتاحية والمصطلحات الرياضية.

#### خطوة 2

ضع خطة وحل المسألة.

- فسّر تبريرك أو اعرض الطريقة التي ستتبعها لحل المسألة.
- اكتب الحل كاملاً مبيّناً الخطوات جميعها.
- تحقق من إجابتك إذا سمح الوقت بذلك.

### مثال

اقرأ المسألة الآتية جيداً، وحدد المطلوب. ثم استعمل المعلومات الواردة في حل السؤال، واكتب خطوات الحل.

قدّمت شركتا اتصالات عروضاً للجُمهور على النحو التالي: قيمة الاشتراك الشهري للشركة A هي 14.5 ريالاً مضافاً إليه 0.05 ريال عن كل دقيقة اتصال، وقيمة الاشتراك الشهري للشركة B هو 20.00 ريالاً مضافاً إليه 0.04 ريال عن كل دقيقة اتصال. أوجد عدد الدقائق التي يمكن أن يستخدمها المشترك، بحيث يدفع المبلغ نفسه شهرياً لكلا الشركتين.





اقرأ السؤال بعناية؛ لديك معلومات عن شركتين مختلفتين للاتصالات، والعروض للاشتراكات الشهرية المقدمة من كلٍّ منها. حيث إن قيمة الفاتورة تعتمد على قيمة ثابتة للاشتراك الشهري، بالإضافة إلى مبلغ متغير يعتمد على عدد دقائق الاتصال، والمطلوب منك تحديد عدد الدقائق التي يمكن استخدامها من قبل المشترك لكلٍّ من الشركتين بحيث يدفع المبلغ نفسه، ويمكنك تكوين نظام معادلتين آتيتين وحله.

إجابة تستحق الدرجة الكاملة (2).

كوّن نظامًا من معادلتين، وحلّه.


قيمة الفاتورة الشهرية = قيمة الاشتراك الشهري + تكلفة الدقيقة × عدد الدقائق.

افترض أن  $y$  = قيمة الفاتورة الشهرية، و  $x$  = عدد الدقائق المستعملة شهريًا.

$$y = 14.5 + 0.05x \quad (\text{الشركة } A)$$

$$y = 20 + 0.04x \quad (\text{الشركة } B)$$

حل النظام بيانيًا.



حل النظام هو (550, 42)، أي أن المشترك سيدفع 42 ريالاً إذا اتصل 550 دقيقة شهريًا، سواءً أكان مشتركاً في الشركة A أو B.

خطوات الحل والحسابات والتبريرات واضحة، وتوصل الطالب إلى الإجابة الصحيحة، إذن تستحق هذه الإجابة درجتين.

## تمارين ومسائل

اقرأ كل سؤال فيما يأتي، وحدد المطلوب، ثم استعمل المعلومات الواردة في السؤال، واكتب خطوات الحل:


(2) يرغب خالد في شراء بعض الأدوات المدرسية بحيث لا يدفع أكثر من 50 ريالاً، فإذا كان ثمن المسطرة الواحدة 4.75 ريالاً، وثمان القلم الواحد 6.5 ريالاً، وأراد شراء قطعتين من كل نوع على الأقل، اكتب نظام المتباينات، ومثل منطقة الحل على المستوى الإحداثي. ثم أعط ثلاثة حلول مختلفة.

(1) اقترض عليٌّ ومحمود مبلغ 11000 ريال لشراء آلة زراعية لبدء مشروعهم التجاري لقص الحشائش في الحدائق، فإذا كانوا يتقاضون مبلغ 245 ريالاً أجرة من كل زبون لقص حشائش الحديقة الواحدة، ويدفعون 20.5 ريالاً بدل صيانة وثماناً للمحروقات، فبعد كم حديقة سيبدؤون في تحقيق الربح.




أسئلة الاختيار من متعدد


(5) ميل المستقيم الممثل بيانياً على المستوى الإحداثي الآتي هو:



- 2 A  
-1/2 C  
1/2 B  
2 D



(6) على الشكل أدناه منطقة حل النظام:



$$y \leq \frac{1}{2}x - 2$$

$$y \leq -\frac{2}{3}x - 1$$

- A المنطقة I  
B المنطقة II  
C المنطقة III  
D المنطقة IV

(7) النقطة التي لا تمثل رأساً لمنطقة حل النظام:

$$x \geq 0, y \geq 0, y \leq -2x + 6$$

- (0, 0) A  
(0, 6) C  
(0, 3) B  
(3, 0) D

اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

(1) إذا كانت  $f(x) = \frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{3}x$ ، فما قيمة  $f(-3)$ ؟

- 7 A  
-6 C  
-1 B  
4 D

(2) يمكن حساب حجم المخروط الدائري القائم الذي ارتفاعه  $h$  وطول نصف قطر قاعدته  $r$  بضرب ثلث  $\pi$  في الارتفاع في مربع نصف قطر القاعدة. فأبي المعادلات الآتية تمثل حجم المخروط المجاور؟



$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h \quad A$$

$$V = \frac{1}{3}\pi r h^2 \quad D$$

(3) أي مجموعات الأعداد الآتية لا ينتمي إليها العدد -25؟

- A الأعداد الصحيحة  
B الأعداد النسبية  
C الأعداد الحقيقية  
D الأعداد الكلية

(4) مجال العلاقة الموضحة في الجدول الآتي هو:

x	y
-3	4
1	-1
2	0
6	-3

- {0, 1, 2, 4, 6} A  
{-3, -1, 0, 4} B  
{-3, 1, 2, 6} C  
{-3, -1} D






### أسئلة ذات إجابات قصيرة

أجب عن كل مما يأتي:

(8) بسّط العبارة أدناه:

$$-4(3a - b) + 3(-2a + 5b)$$

(9) اكتب معادلة الدالة المتعددة التعريف الممثلة بيانياً في الشكل أدناه:



(10) جد قيمة الدالة المتعددة التعريف في التمرين (9) عند  $x = -3$ .

### أسئلة ذات إجابات مطولة

أجب عن كل مما يأتي موضّحاً خطوات الحل:

(11) مثل المتباينة  $y \geq |x| - 2$  بيانياً

(12) قدّر مدير مخبز الربح في كل قطعة كعك يبيعه بـ 0.45 ريال، ولكل فطيرة 0.5 ريال.

(a) يأمل مدير المخبز أن يحصل على ربح لا يقل عن 150 ريالاً من بيع الكعك والفطائر يومياً. افترض أن  $x$  عدد قطع الكعك المباعة، و  $y$  عدد الفطائر المباعة، اكتب متباينة تمثل هذا الموقف.

(b) مثل المتباينة بيانياً.

(c) إذا باع المخبز 180 قطعة كعك و 160 فطيرة في يوم ما، فهل سيحصل على الربح المطلوب؟ فسر إجابتك.

(13) تُعد فاطمة نوعين من أطباق الحلوى؛ ويحتاج النوع الأول إلى 5 أكواب من الدقيق، وكوبين من السكر، أما النوع الثاني فيحتاج إلى 5 أكواب من الدقيق، وكوب واحد من السكر. فإذا كان لديها 40 كوباً من الدقيق، و 15 كوباً من السكر، وتكلفة إعداد طبق من النوع الأول 12 ريالاً، وطبق من النوع الثاني 8 ريالات.

(a) اكتب نظام متباينات خطية يمثل عدد الأطباق التي يمكن لفاطمة إعدادها باستعمال الكميات المتوافرة.

(b) مثل نظام المتباينات الخطية الذي حصلت عليه في (a) بيانياً، واكتب إحداثيات نقاط رؤوس منطقة الحل.

(c) اكتب دالة تمثل التكلفة.

(d) ما عدد الأطباق من كل نوع الذي يجعل التكلفة أكبر ما يمكن؟ وما التكلفة في هذه الحالة؟

هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	إذا لم تستطع حل سؤال ...
1-6	1-6	1-4	1-3	1-3	1-1	1-6	1-5	مهارة سابقة	1-2	1-1	1-2	1-2	فعد إلى ...



# المصفوفات Matrices

## الفصل 2

### فيما سبق:

درست حل نظام من المعادلات .

### والآن:

- أنظم البيانات في مصفوفة.
- أجري العمليات على المصفوفات.
- أحسب المحددات.
- أجد النظير الضربي لمصفوفة من الرتبة  $2 \times 2$ .
- أستعمل المصفوفات لحل نظام من المعادلات.

### لماذا؟

**تنظيم البيانات:** غالباً ما تستعمل المصفوفات لتنظيم البيانات، فمثلاً إذا نُظِم الطلاب المشاركون في الألعاب الرياضية المختلفة من مدرستين ثانويتين في مصفوفات مختلفة، فإن أعداد جميع الطلاب المشاركين في هذه الألعاب يمكن الحصول عليها بجمع المصفوفات.



### المطويات

منظم أفكار


المصفوفات: اعمل هذه المطوية لتساعدك على تنظيم ملاحظاتك حول المصفوفات، مبتدئاً بورقة A4.

4 اكتب على كل جيب عنواناً لدرس من دروس الفصل، و اكتب عنوان الفصل.

3 أعد الطي، ثم ثبت الجيوب مستعملاً الدباسة.

2 اطو الورقة الناتجة إلى أرباع، ثم قص كما في الشكل.

1 اثن حافة الورقة بعرض 2cm بموازية الضلعين القصيرين.







## التهيئة للفصل 2

تشخيص الاستعداد:

أجب عن الاختبار الآتي، وارجع إلى "المراجعة السريعة" : لمساعدتك على ذلك.

### مراجعة سريعة

#### مثال 1

أوجد كلاً من النظير الجمعي والنظير الضربي للعدد  $-5$

النظير الجمعي للعدد  $-5$  هو العدد  $x$ ، بحيث إن  $-5+x=0$ ؛ لذا فإن  $x=5$ .

النظير الضربي للعدد  $-5$  هو العدد  $y$ ، حيث إن  $-5y=1$ ؛ لذا فإن  $y=-\frac{1}{5}$ .

#### مثال 2

بسّط العبارة:  $\frac{3}{4}(8x-4)+3x$

$$\begin{aligned} & \frac{3}{4}(8x-4)+3x \\ & \text{خاصية التوزيع} = \frac{3}{4}(8x) - \frac{3}{4}(4) + 3x \\ & \text{بسّط} = 6x - 3 + 3x \\ & \text{اجمع الحدود المتشابهة} = 9x - 3 \end{aligned}$$

#### مثال 3

حل نظام المعادلتين الآتي جبرياً:

$$\begin{aligned} 3y &= x - 9 \\ 4x + 5y &= 2 \end{aligned}$$

بما أن معامل  $x$  في المعادلة الأولى هو 1، فاستعمل طريقة التعويض. أولاً: حل المعادلة بالنسبة للمتغير  $x$ .

$$3y = x - 9 \rightarrow x = 3y + 9$$

$$4(3y + 9) + 5y = 2 \quad \text{عوّض } 3y + 9 \text{ بدلاً من } x$$

$$12y + 36 + 5y = 2 \quad \text{خاصية التوزيع}$$

$$17y = -34 \quad \text{اجمع الحدود المتشابهة}$$

$$y = -2 \quad \text{بقسمة الطرفين على 17}$$

ولإيجاد قيمة  $x$ ، استعمل المساواة  $-2 = y$  في المعادلة الأولى.

$$3(-2) = x - 9 \quad \text{عوّض عن } y \text{ بـ } -2$$

$$-6 = x - 9 \quad \text{بالضرب}$$

$$3 = x \quad \text{اجمع الطرفين}$$

فيكون الحل  $(3, -2)$ .

### اختبار سريع

أوجد كلاً من النظير الجمعي والنظير الضربي لكل عدد مما يأتي: (يُستعمل مع الدروس 2-2 إلى 2-5)

(1) 4 (2)  $-15$

(3)  $0.2$  (4)  $-1.35$

(5)  $-\frac{3}{4}$  (6)  $2\frac{1}{3}$

بسّط كل عبارة مما يأتي: (يُستعمل مع الدروس 2-1 إلى 2-5)

(7)  $6(x+2y)$

(8)  $4(x+5)-3$

(9)  $-4(3x)-(7x-6)$

(10)  $5(2x-5)-\frac{1}{3}(4x+1)$

(11)  $6(2x-1)-3(y-x)+0.5(4x-6)$

حل نظام المعادلتين في كل مما يأتي جبرياً: (يُستعمل مع الدرس 2-5)

(12)  $2x - y = -1$  (13)  $2x - 5y = -18$

$y = x + 3$  (14)  $4y + 6x = -6$

(15)  $4x + 2y = 4$  (16)  $5y - x = 35$

$x = y - 8$

(16) **جوائز:** توزع مدرسة جوائز (حقائب وأقلام) كل عام على المتفوقين، بلغ إجمالي ثمنها هذا العام 534 ريالاً، وكان سعر الحقيبة 30 ريالاً، وسعر القلم 9 ريالاً، أما في العام السابق فبلغ إجمالي ثمن الجوائز 448 ريالاً، وكان سعر الحقيبة 25 ريالاً، وسعر القلم 8 ريالاً. اكتب نظاماً من معادلتين، ثم حله لتجد عدد الحقائب والأقلام المشتركة في كل عام، علماً بأن الحقائب والأقلام لها العدد نفسه في العامين.





# مقدمة في المصفوفات

## Introduction to Matrices


# 2-1

### لماذا؟

**هاتف محمول:** حصل صالح على عدة عروض لشراء هاتف محمول حسب النوع، وسعة الذاكرة، والسعر. وحتى يكون قادرًا على المقارنة بين العروض بسهولة، نظم البيانات في مصفوفة كما يلي:

النوع	سعة الذاكرة	السعر	
العرض الأول	$a$	256	2600
العرض الثاني	$b$	256	2500
العرض الثالث	$c$	128	2420
العرض الرابع	$d$	64	2390

**تنظيم البيانات:** المصفوفة هي ترتيب على هيئة مستطيل لمتغيرات أو أعداد في صفوف أفقية وأعمدة رأسية، محصورة بين قوسين. وتُنظم الأعداد أو البيانات في المصفوفة بحيث يكون الموقع في المصفوفة ذا معنى. وتُسمى كل قيمة في المصفوفة **عنصرًا**. ويرمز إلى المصفوفة عادة باستعمال حرف كبير تحته خط مثل  $A$  و  $B$ .



يمكنك تحديد نوع المصفوفة بترتيبها؛ فالمصفوفة المكونة من  $m$  صفًا و  $n$  عمودًا يقال عنها مصفوفة من الرتبة  $m \times n$  أو من النوع  $m \times n$  (تقرأ " $m$  في  $n$ "). فالمصفوفة  $A$  في الأعلى هي مصفوفة من النوع  $3 \times 4$  أو من الرتبة  $3 \times 4$ ؛ لأنها تحتوي على 3 صفوف، و 4 أعمدة. ويدل الرمز  $a_{12}$  على عنصر في المصفوفة  $A$ ، على حين يدل الرمز  $b_{12}$  على عنصر في المصفوفة  $B$ .

### فيما سبق:

درست حل مسائل باستعمال تنظيم البيانات في جداول. (مهارة سابقة)

### والآن:

- أنظم بيانات في مصفوفة.
- أستعمل العمليات على عناصر صفوف أو أعمدة مصفوفة لتحليل البيانات.

### المفردات:

المصفوفة

matrix

العنصر

element

الرتبة

order

مصفوفة الصف

row matrix

مصفوفة العمود

column matrix

المصفوفة المربعة

square matrix

المصفوفة الصفرية

zero matrix


المصفوفات المتساوية

equal matrices

### مثال 1 رتبة المصفوفة وعناصرها


استعمل المصفوفة  $A = \begin{bmatrix} -18 & 6 & 38 \\ 9 & -9 & 22 \end{bmatrix}$  للإجابة عن كلِّ مما يأتي:

(b) ما قيمة العنصر  $a_{21}$ ؟



بما أن العنصر  $a_{21}$  موجود في الصف 2، والعمود 1، فإن قيمته هي 9.

(a) حدد رتبة المصفوفة  $A$ .



بما أن  $A$  فيها صفان و 3 أعمدة، فإن رتبته  $2 \times 3$ .

### تحقق من فهمك

$$B = \begin{bmatrix} 10 & -8 \\ -2 & 19 \\ 6 & -1 \end{bmatrix}$$

(1A) ما رتبة  $B$ ؟

(1B) ما قيمة  $b_{32}$ ؟

### قراءة الرياضيات

يدل الرمز  $a_{ij}$  على العنصر الواقع في الصف  $i$  والعمود  $j$  من المصفوفة  $A$ .





بعض المصفوفات لها تسميات خاصة.



تكون المصفوفتان متساويتين إذا كانتا من الرتبة نفسها ، وتساوت عناصرهما المتناظرة.

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 & 0 \\ 0 & 7 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 0 \\ 0 & 7 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 6 & -5 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 6 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ -3 & 6 & 5 \end{bmatrix}$$

المصفوفتان متساويتان.

ليست جميع العناصر المتناظرة متساوية.

المصفوفتان لهما رتبتان مختلفتان.

### إرشادات للدراسة

#### العناصر المتناظرة

يدل التناظر على العناصر التي تقع بالضبط في الموقع نفسه من كل مصفوفة.

تستعمل المصفوفات لتنظيم البيانات وتحليلها.

### تنظيم البيانات في مصفوفة

### مثال 2 من واقع الحياة

**كرة قدم:** رصد مدرب أحد فرق كرة القدم إنجازات ثلاثة لاعبين في مباريات الموسم الحالي فكانت على النحو الآتي:

ياسر: 20 مباراة، 31 تسديدة، 20 تمريرة، 30 قطع تمريرات، 4 أهداف.	ماجد: 18 مباراة، 43 تسديدة، 170 تمريرة، 40 قطع تمريرات، 11 هدفاً.	معاذ: 12 مباراة، 24 تسديدة، 113 تمريرة، 15 قطع تمريرات، 4 أهداف.
---	---	--

(a) نظم البيانات في مصفوفة  $A$  ، على أن تُرتب أسماء اللاعبين تنازلياً حسب عدد التسديدات.

(b) حدد رتبة المصفوفة. وما قيمة  $a_{23}$ ؟

	الأهداف	قطع التمريرات	التمريرات	التسديدات	المباريات
ماجد	11	40	170	43	18
ياسر	4	30	20	31	20
معاذ	4	15	113	24	12

(b) هناك 3 صفوف، و 5 أعمدة؛ لذا فإن رتبة المصفوفة  $5 \times 3$  وقيمة العنصر  $a_{23}$  الموجودة في الصف 2 ، والعمود 3، هي 20.

### تحقق من فهمك

(2) بيتزا: بين الجدول المجاور الأسعار بالريال لأربعة أنواع من البيتزا بثلاثة أحجام في أحد المطاعم.

(A) نظم هذه البيانات في مصفوفة  $A$  ، على أن تكون الأسعار مرتبة تصاعدياً.

(B) حدد رتبة المصفوفة.

(C) ما قيمة العنصر  $a_{21}$ ؟

أسعار البيتزا (بالريال)

	كبيرة	وسط	صغيرة
ثمار البحر	35	24	13
الحضار	34	23	12
الدهج	36	25	14
وزارة التعليم	37	27	15



**تحليل البيانات:** عند تنظيم البيانات في مصفوفة، يسهل تحليلها وتفسيرها. وتعطي مجاميع عناصر الصفوف أو الأعمدة أحياناً معلومات ذات معنى. وفي أحيان أخرى لا تعطي أي معلومات ذات معنى.

### مثال 3 تحليل البيانات باستعمال المصفوفات

**كرة قدم:** إذا أراد مدرب فريق كرة القدم، (في مثال 2) استعمال المصفوفة للحصول على تحليلات إضافية لإحصائيات لاعبيه الثلاثة:

الأهداف	قطع التمريرات	التمريرات	التسديدات	المباريات
11	40	170	43	18
4	30	20	31	20
4	15	113	24	12

(a) اجمع عناصر كل من العمودين 2 و 3، وفسر النتائج.

مجموع عناصر عمود 2 يساوي 98، وهو يمثل العدد الكلي لتسديدات اللاعبين خلال جميع المباريات. مجموع عناصر عمود 3 يساوي 303، وهو يمثل العدد الكلي لتمريرات اللاعبين خلال جميع المباريات.

(b) أراد المدرب تحديد معدل تسديد اللاعب في المباراة الواحدة، فقرر أن يجمع عناصر العمود 2 ويقسم المجموع على 3، فما الناتج؟  
الناتج هو 33 تقريباً.

(c) هل كانت طريقة المدرب في حساب معدل تسديد اللاعب في المباراة الواحدة صحيحة؟ فسّر إجابتك. لا؛ لأن مجموع التسديدات في العمود 2 ليس لثلاث مباريات، ويتعين على المدرب بدلاً من ذلك قسمة مجموع عناصر العمود 2 على مجموع عناصر العمود 1 حيث سيكون المعدل الدقيق  $1.96$  ( $98 \div 50 = 1.96$ ).

(d) هل جمع عناصر الصفوف يزود المدرب ببيانات ذات معنى؟ فسّر إجابتك. لا؛ لأن عناصر الصف عبارة عن خمسة أنواع مختلفة من البيانات.

تحقق من فهمك

عدد المحافظات من الفئتين أ، ب في 4 مناطق مختلفة في المملكة		
المنطقة	محافظة فنة أ	محافظة فنة ب
الرياض	12	8
مكة المكرمة	9	7
المدينة المنورة	4	4
القصيم	5	7

المصدر: المملكة العربية السعودية، حقائق وأرقام، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، 1433 هـ

(3) **محافظات:** يبين الجدول المجاور عدد المحافظات من الفئتين أ، ب في 4 مناطق إدارية مختلفة في المملكة.

(A) نظم البيانات في مصفوفة.

(B) اجمع عناصر كل عمود، وفسر النتائج.

(C) اجمع عناصر كل صف، وفسر النتائج.

(D) هل إيجاد معدل عناصر كل صف يعطي بيانات ذات معنى؟

تأكد

حدّد رتبة كل مصفوفة فيما يأتي:

مثال 1

$$(1) \begin{bmatrix} 1 & 4 & -4 & 0 \\ -2 & 3 & 6 & -8 \end{bmatrix}$$

$$(2) \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \\ -7 \end{bmatrix}$$

$$(3) \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 9 \\ 17 & 21 \end{bmatrix}$$



إذا كانت  $A = \begin{bmatrix} 1 & -6 & x & -4 \\ -2 & 3 & -1 & 9 \\ 5 & -8 & 2 & 12 \end{bmatrix}$ ، فما قيمة كل عنصر فيما يأتي:

- (4)  $a_{32}$  (5)  $a_{11}$  (6)  $a_{33}$  (7)  $a_{24}$

المثالان 2, 3 (8) **زراعة:** يبين الجدول المجاور عدد صناديق الخضراوات المنتجة في مزرعتين مختلفتين في أحد المواسم:

المزرعة	طماطم	بادنجان	كوسة	خيار
1	500	488	570	540
2	820	800	1015	850

- (a) نظم البيانات في مصفوفة.  
 (b) ما النوع الأقل إنتاجًا؟  
 (c) اجمع عناصر كل صف، وهل لهذه المجاميع معنى؟ فسّر إجابتك.  
 (d) اجمع عناصر كل عمود، وفسّر إجابتك.

## تدرب وحل المسائل

مثال 1 حدد رتبة كل مصفوفة فيما يأتي:

(9)  $\begin{bmatrix} -9 & 6 \end{bmatrix}$  (10)  $\begin{bmatrix} 15 & y \\ 8 & -9 \end{bmatrix}$  (11)  $\begin{bmatrix} 6 & 11 & -4 & -2 \\ -8 & 5 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

(12)  $\begin{bmatrix} 4 & -3 & -1 \\ x & 3y & 0 \\ 8 & 12 & 11 \end{bmatrix}$  (13)  $\begin{bmatrix} 2 \\ x \\ -3 \end{bmatrix}$  (14)  $[115]$

إذا كانت  $A = \begin{bmatrix} 6 & y \\ -9 & 31 \\ 11 & 5 \end{bmatrix}$ ،  $B = \begin{bmatrix} 10 & -8 & 2x \\ -2 & 19 & 4 \end{bmatrix}$ ، فما قيمة كل عنصر فيما يأتي:

- (15)  $a_{21}$  (16)  $b_{22}$  (17)  $b_{13}$  (18)  $a_{12}$

مثال 2 (19) يبين الجدول أدناه النقاط التي حصل عليها ثلاثة طلاب في مسابقة علمية تقدم على 3 جولات، نظم هذه البيانات في مصفوفة:

الاسم	الجولة 1	الجولة 2	الجولة 3	المجموع
سعود	221	201	185	607
علي	168	233	159	560
مروان	187	189	211	587

مثال 3 (20) **تخزين:** ثلاثة مخازن لتوريد التمور؛ الأول فيه 2000kg خلاص و 1200kg برحي و 500kg سكري، والثاني فيه 3000kg خلاص و 1175kg برحي و 2250kg سكري، والثالث فيه 2750kg خلاص و 1500kg برحي و 1700kg سكري.

(a) نظم البيانات في مصفوفة، على أن تكون محتويات المخازن أعمدة المصفوفة.

(b) أوجد مجموع عناصر كل عمود، وماذا يمثل هذا المجموع؟

(c) أوجد مجموع عناصر كل صف، وماذا يمثل هذا المجموع؟





إذا كانت  $A = \begin{bmatrix} 23 & 11 \\ x & -5 \\ -12 & 15 \end{bmatrix}$ ، فحدد كل عنصر مما يأتي:

(24)  $a_{21}$

(23)  $b_{12}$

(22)  $b_{21}$

(21)  $a_{32}$

أسعار حديد التسليح (بالريال)		
المقاس	الرياض	جدة
8mm	2410	2455
14mm	2210	2255
16mm	2200	2245

(25) **حديد التسليح:** بين الجدول المجاور أسعار حديد التسليح حسب تقرير وزارة التجارة والاستثمار في مدينتي الرياض وجدة لأحد الأيام.

(a) اكتب مصفوفة تمثل البيانات المعطاة.

(b) ما رتبة المصفوفة الناتجة في الفرع  $a$ ؟

إذا كانت  $A = \begin{bmatrix} x^2 + 4 & y + 6 \\ x - y & 2 - y \end{bmatrix}$ ،  $B = \begin{bmatrix} 0 & x & -2y \\ 5x & 3y & -4x \\ -y & 0 & 0 \end{bmatrix}$  فحدد كل عنصر مما يأتي:

(29)  $b_{23}$

(28)  $b_{31}$

(27)  $a_{22}$

(26)  $a_{11}$

الكوكب	البعد عن الشمس (مليون ميل)	البعد عن الأرض (مليون ميل)
عطارد	36.00	57
الزهرة	67.24	26
المريخ	141.71	35
المشتري	483.88	370
زحل	887.14	744
أورانوس	1783.98	1607
نبتون	2796.46	2680

المصدر: fact Monster

(30) **فلك:** استعمل الجدول المجاور الذي يبين بُعد بعض الكواكب عن الأرض والشمس.

(a) نظم المسافات في مصفوفة  $A$ .

(b) ما رتبة المصفوفة الناتجة؟

(c) ما قيمة العنصر  $a_{42}$ ؟



### الربط مع الحياة

بعد إعادة تعريف كلمة "كوكب" عام 2006 من قبل الاتحاد الفلكي الدولي، تبين أن بلوتو لم يعد يصنف كوكبًا؛ وذلك بسبب حجمه الصغير.

(31) **تمثيلات متعددة:** ستكتشف في هذا

السؤال تأثير قلب الصفوف والأعمدة في المصفوفة.

يبين الجدول المجاور عدد كل من التمريرات الحاسمة وعدد الأهداف لأربعة لاعبين في مباراة لكرة اليد.

(a) **جدولياً:** نظم البيانات في مصفوفة على أن يمثل عدد الأهداف وعدد التمريرات عموداً.

(b) **جبرياً:** أوجد مجاميع عناصر كل عمود.

(c) **جدولياً:** بدّل البيانات في المصفوفة على أن تصبح عناصر الأعمدة هي عناصر الصفوف.

(d) **جبرياً:** أوجد مجاميع عناصر كل صف.

(e) **تحليلياً:** هل هناك أي تأثير في البيانات عند تبديل عناصر الصفوف والأعمدة؟

الاسم	عدد التمريرات الحاسمة	عدد الأهداف
محمود	8	3
معاذ	6	5
صالح	1	8
عبدالله	4	2

## مسائل مهارات التفكير العليا

**تبرير:** حدد إذا كانت الجملة الآتية صحيحة أم خاطئة. وفّر إجابتك:

(32) المصفوفة  $C$  مربعة ولها أربعة أعمدة، وتحوي العنصر  $c_{53}$ .





(33) **اكتشف الخطأ:** حددت كل من ياسمين وسارة العنصر  $b_{32}$  في المصفوفة  $B = \begin{bmatrix} -6 & 7 \\ 0 & 5 \\ 8 & 2 \end{bmatrix}$ ، فهل توصلت إحداهما للحل الصحيح؟ فسّر إجابتك.

**سارة**  
العنصر  $b_{32}$  غير موجود في المصفوفة  $B$ ، لأن  $B$  مصفوفة من النوع  $2 \times 3$ .

**ياسمين**  
قيمة العنصر  $b_{32}$  هي 5.

(34) **تحّد:** جد قيمة كل من المتغيرات  $x, y, z$  التي تحقق المعادلة:

$$\begin{bmatrix} 2x - y & 3x + 4z \\ 7x - 8z & 5y + 12z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9z - 5x + 1 & 5y - 2x \\ 3y - 4z & 12x + 2y \end{bmatrix}$$

(35) **مسألة مفتوحة:** أنشئ مصفوفة باستعمال بيانات من واقع الحياة تكون مجاميع عناصر أعمدها ذات معنى، ومجاميع عناصر صفوفها ليست ذات معنى.

(36) **اكتب:** اشرح كيف يمكن أن تساعدك المصفوفات عندما تقرر اختيار الجامعة التي ترغب في الالتحاق بها.

### تدريب على اختبار

	مؤيد	ضد
المرشح الأول	1553	771
المرشح الثاني	689	1633
المرشح الثالث	2088	229

(37) **مسح:** نُظمت نتائج استطلاع للرأي في المصفوفة المجاورة:

بالاعتماد على هذه النتائج، أي استنتاج مما يأتي ليس صحيحًا؟

- A هناك 771 صوتًا ضد المرشح الأول.
- B عدد الأصوات المعارضة للمرشح الأول أكبر من تلك المؤيدة للمرشح الثاني.
- C فرصة المرشح الثاني للفوز ضئيلة.
- D عدد الأصوات المؤيدة للمرشح الأول أكبر من عدد الأصوات المؤيدة للمرشح الثالث.

### مراجعة تراكمية

(38) **مجلس الإدارة:** ترشح مسفر لمنصب رئيس مجلس الإدارة في إحدى الشركات الكبرى، وكان المُقترح يكتب ثلاثة أسماء بالترتيب على ورقة الاقتراع، فيحصل المتنافس على 3 نقاط لكل مركز أول، ونقطتين لكل مركز ثان، ونقطة واحدة لكل مركز ثالث. وقد ورد اسم مسفر في 490 ورقة اقتراع للمراكز الثلاثة، وكان مجموع نقاطه 878 نقطة. فإذا علمت أن عدد الأصوات التي حصل عليها من المركز الثاني أكثر بأربع أصوات من ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها من المركز الثالث، فكم عدد الأصوات التي حصل عليها من كل مركز؟ (مهارة سابقة)

النوع	كعكة الفواكه	كعكة الشوكولاتة
التكلفة	13 ريالاً	19 ريالاً
سعر البيع	39 ريالاً	44 ريالاً

(39) **ثقافة مالية:** يبين الجدول المجاور تكلفة إنتاج كل من الشوكولاتة وكعكة الفواكه وسعر بيعها لدى مخبز. إذا علمت أن المخبز يبيع كعكة الشوكولاتة وكعكة الفواكه معاً في صناديق تحوي من 6 إلى 12 كعكة من كلا النوعين، بحيث يحوي كل صندوق ثلاث كعكات على الأقل من كل نوع. فما عدد كعكات كل صندوق من كلا النوعين ليكون الربح أكبر ما يمكن؟ (الدرس 1-5)

احسب قيمة كل عبارة مما يأتي إذا كان  $w = 3, x = -2, y = 4, z = 0.5$ : (مهارة سابقة)

وزارة التعليم

Ministry of Education  
2021 - 1443

(42)  $4[3(2z + y) - 2(w + x)]$

(41)  $5w + 2(x - z) + 2y$

(40)  $4x - 6y + 2z$





الهدف

أستعمل الجداول الإلكترونية لتنظيم البيانات وعرضها.

مثال

مبيعات محل تمور خلال 4 أسابيع متتالية بالكيلوجرامات				
نوع التمر	1	2	3	4
خلاص	17	22	11	23
مكتومي	31	34	22	29
سكري	55	61	44	71
سلج	41	36	60	77
عجوة	23	29	19	44
خضري	8	18	19	31
منيفي	22	18	30	32
صقعي	26	16	31	39

جمع محل لبيع التمور بيانات عن مبيعاته في أربعة أسابيع متتالية، ونظمها في الجدول المجاور. أدخل البيانات في برنامج الجداول الإلكترونية .

استعمل العمود A للنوع، والعمود B لمبيعات الأسبوع الأول، والعمود C لمبيعات الأسبوع الثاني، والعمود D لمبيعات الأسبوع الثالث، والعمود E لمبيعات الأسبوع الرابع.

	A	B	C	D	E
1	خلاص	17	22	11	23
2	مكتومي	31	34	22	29
3	سكري	55	61	44	71
4	سلج	41	36	60	77
5	عجوة	23	29	19	44
6	خضري	8	18	19	31
7	منيفي	22	18	30	32
8	صقعي	26	16	31	39

يحتوي كل صف مبيعات النوع نفسه من التمور، ويمثل الصف 2 مبيعات التمر المكتومي.

تحتوي كل خلية في الجدول جزءاً واحداً من البيانات. حيث تحتوي الخلية D7 على القيمة 30، والتي تمثل عدد الكيلوجرامات المباعة في الأسبوع الثالث من تمور منيفي.

تمارين:

- أدخل البيانات الواردة في فقرة "لماذا؟" بداية الدرس في برنامج الجداول الإلكترونية.
- قارن بين تنظيم البيانات في الجداول الإلكترونية وتنظيمها في المصفوفة.
- يمكنك إيجاد مجاميع مدخلات الصفوف والأعمدة في الجداول الإلكترونية باستعمال الأمر (SUM).
  - يمكنك إيجاد مجموع مدخلات العمود B باستعمال الصيغة =SUM(B1:B8). أدخل صيغاً مشابهة في الخلايا B9, C9, D9, E9 لتجد مجاميع مدخلات الأعمدة الأخرى. ماذا تمثل مجاميع مدخلات هذه الأعمدة؟
  - أدخل صيغاً مشابهة في الخلايا F1 حتى F8 لإيجاد مجاميع مدخلات الصفوف 1 إلى 8. ماذا تمثل هذه المجاميع في هذه الحالة؟
  - أوجد مجموع مدخلات الصف 9، ومجموع مدخلات العمود F. ماذا تلاحظ؟ فسّر إجابتك. 1443 - 2021





## العمليات على المصفوفات Operations with Matrices

# 2-2

### لماذا؟

لدى مؤسسة تجارية للمعدات الثقيلة فروع في كل من: الرياض، والشرقية، وجدة، يتبع كلاً منها ثلاثة معارض. وتبين المصفوفات الآتية معدل النفقات والمبيعات الأسبوعية في معارض المناطق الثلاث:

	الرياض		الشرقية		جدة	
	المبيعات	النفقات	المبيعات	النفقات	المبيعات	النفقات
(1) المعرض	145000	1900	122000	1700	109500	1050
(2) المعرض	225000	2400	145500	1800	135000	1800
(3) المعرض	290000	2700	160000	1800	150500	1800

**جمع المصفوفات وطرحها:** يمكن جمع مصفوفتين أو طرحهما إذا فقط إذا كان لهما الرتبة نفسها، حيث تجمع العناصر المتناظرة في حالة الجمع، وتطرح في حالة الطرح.

### فيما سبق:

درست تنظيم البيانات في مصفوفات. (الدرس 2-1)

### والآن:

- أجمع المصفوفات وأطرحها.
- أضرب مصفوفة في عدد ثابت.

### المفردات:

- جمع مصفوفتين  
adding matrices
- طرح مصفوفتين  
subtracting matrices
- ضرب المصفوفة في عدد ثابت  
scalar multiplication

أضف إلى

مطوبتك

### جمع المصفوفات وطرحها

### مفهوم أساسي

التعبير اللفظي: إذا كانت  $A, B$  مصفوفتين من الرتبة  $m \times n$  فإن  $A + B$  هي مصفوفة أيضاً من الرتبة  $m \times n$  ويكون كل عنصر فيها هو مجموع العنصرين المتناظرين في  $A$  و  $B$ ، وكذلك  $A - B$  هي مصفوفة من الرتبة  $m \times n$  أيضاً، وتحصل عليها بطرح العناصر المتناظرة.

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \underline{B} = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} \quad \text{الرموز:} \quad \text{لتكن:}$$

$$\underline{A} + \underline{B} = \begin{bmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{bmatrix}, \underline{A} - \underline{B} = \begin{bmatrix} a-e & b-f \\ c-g & d-h \end{bmatrix} \quad \text{فإن:}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -9 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3+2 & -5+0 \\ 1+(-9) & 7+10 \end{bmatrix} \quad \text{مثال:}$$

### إرشادات للدراسة

إذا كان  $\underline{A} + \underline{B} = \underline{C}$  فإن  $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ .

### مثال 1 جمع المصفوفات وطرحها

إذا كانت  $\underline{A} = \begin{bmatrix} 16 & 2 \\ -9 & 8 \end{bmatrix}, \underline{B} = \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ -3 & -7 \end{bmatrix}, \underline{C} = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix}$ ، فأوجد كلاً مما يأتي إن أمكن:

(a)  $\underline{A} + \underline{B}$

$$\underline{A} + \underline{B} = \begin{bmatrix} 16 & 2 \\ -9 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ -3 & -7 \end{bmatrix} \quad \text{عوض}$$

$$= \begin{bmatrix} 16+(-4) & 2+(-1) \\ -9+(-3) & 8+(-7) \end{bmatrix} \quad \text{اجمع العناصر المتناظرة}$$

$$= \begin{bmatrix} 12 & 1 \\ -12 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{بسّط}$$

(b)  $\underline{B} - \underline{C}$

$$\underline{B} - \underline{C} = \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ -3 & -7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix} \quad \text{عوض}$$

بما أن المصفوفتين  $\underline{B}, \underline{C}$  لهما رتبتي مختلفتين، فلا يمكن إجراء عملية الطرح  $\underline{B} - \underline{C}$ .

تحقق من فهمك

$$\begin{bmatrix} -9 & 8 & 3 \\ -2 & 4 & -7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 & -3 & 6 \\ -9 & -5 & 18 \end{bmatrix} \quad \text{(1B)}$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -9 & -5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -4 & 12 \\ 8 & -7 \end{bmatrix} \quad \text{(1A)}$$



**الضرب في عدد ثابت:** يمكنك ضرب أي مصفوفة في عدد ثابت، وهذا يعني ضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في ذلك العدد الثابت. وتسمى هذه العملية ضرب المصفوفة في عدد ثابت.

أضف إلى مطوبتك

**مفهوم أساسي**

**الضرب في عدد ثابت**

التعبير اللفظي: حاصل ضرب مصفوفة  $A$  من الرتبة  $m \times n$  في عدد ثابت  $k$  هي مصفوفة  $kA$  من الرتبة  $m \times n$  وكل عنصر فيها يساوي العنصر المناظر له في المصفوفة  $A$  مضروباً في العدد الثابت  $k$

الرموز: إذا كانت  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  و  $k$  عدد ثابت فإن:

$$k \cdot A = k \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{bmatrix}$$

مثال:

$$-3 \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 7 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3(4) & -3(1) \\ -3(7) & -3(-2) \end{bmatrix}$$

إرشادات للدراسة

ضرب المصفوفة في عدد ثابت  
إذا كان  $kA = B$   
فإن:  $ka_{ij} = b_{ij}$

مثال 2 ضرب مصفوفة في عدد ثابت



اضرب كل عنصر في المصفوفة في العدد 5

إذا كانت  $R = \begin{bmatrix} -12 & 8 & 6 \\ -16 & 4 & 19 \end{bmatrix}$ ، فجد  $5R$ .

$$\begin{aligned} 5R &= 5 \begin{bmatrix} -12 & 8 & 6 \\ -16 & 4 & 19 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5(-12) & 5(8) & 5(6) \\ 5(-16) & 5(4) & 5(19) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -60 & 40 & 30 \\ -80 & 20 & 95 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

تحقق من فهمك

(2) إذا كانت  $T = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 3 & -2 \\ -1 & -4 & -2 & 9 \end{bmatrix}$ ، فأوجد  $-4T$

تنطبق كثير من خصائص العمليات التي تُجرى على الأعداد الحقيقية على المصفوفات. وفيما يأتي ملخص لهذه الخصائص:

أضف إلى مطوبتك

**مفهوم أساسي**

**خصائص جمع المصفوفات**

الخصائص الآتية صحيحة لأي ثلاث مصفوفات  $A, B, C$  لها الرتبة نفسها ولأي عدد ثابت  $k$ :

$A + B = B + A$	الخاصية الإبدالية لجمع المصفوفات
$(A + B) + C = A + (B + C)$	الخاصية التجميعية لجمع المصفوفات
$k(A + B) = kA + kB$	خاصية التوزيع للضرب في عدد





يمكنك إجراء عمليات متعددة الخطوات على المصفوفات. وترتيب تلك العمليات شبيه بترتيب العمليات على الأعداد الحقيقية.

### مثال 3 العمليات على المصفوفات

إذا كانت  $A = \begin{bmatrix} -9 & 12 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}$ ،  $B = \begin{bmatrix} -4 & -8 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ ، فأوجد  $-4B - 3A$ .

$$\text{عوض} \quad -4B - 3A = -4 \begin{bmatrix} -4 & -8 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} -9 & 12 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}$$

أوجد ناتج ضرب المصفوفات في الثوابت

$$= \begin{bmatrix} -4(-4) & -4(-8) \\ -4(2) & -4(-3) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3(-9) & 3(12) \\ 3(2) & 3(-6) \end{bmatrix}$$

بسّط

$$= \begin{bmatrix} 16 & 32 \\ -8 & 12 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -27 & 36 \\ 6 & -18 \end{bmatrix}$$

اطرح العناصر المتناظرة

$$= \begin{bmatrix} 16 - (-27) & 32 - 36 \\ -8 - 6 & 12 - (-18) \end{bmatrix}$$

بسّط

$$= \begin{bmatrix} 43 & -4 \\ -14 & 30 \end{bmatrix}$$

تحقق من فهمك

(3) إذا كانت  $A = \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 6 & -8 \\ 2 & 9 \end{bmatrix}$ ،  $B = \begin{bmatrix} 12 & 5 \\ 5 & -4 \\ 4 & -7 \end{bmatrix}$ ، فأوجد  $-6B + 7A$ .



### الربط مع الحياة

**المخطط المالي**  
يستعمل المخطط المالي المصفوفات لتنظيم البيانات التي يستعملها، ووصفها.

يمكنك استعمال المصفوفات في الكثير من الأعمال التجارية.

### مثال 4 استعمال العمليات على المصفوفات

**أعمال:** ارجع إلى فقرة "لماذا" في بداية الدرس، وعبر عن معدل المبيعات والنفقات لجميع المعارض في خمسة أسابيع.

حتى يتم حساب المبيعات في خمسة أسابيع، يجب ضرب كل مصفوفة في العدد 5 وجمع المصفوفات الناتجة معاً.

$$\begin{aligned} & \text{ضرب كل مصفوفة في 5 ثم الجمع} \quad 5 \begin{bmatrix} 1900 & 145000 \\ 2400 & 225000 \\ 2700 & 290000 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 1700 & 122000 \\ 1800 & 145500 \\ 1800 & 160000 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 1050 & 109500 \\ 1800 & 135000 \\ 1800 & 150500 \end{bmatrix} \\ & \text{تطبيق قاعدة الضرب في ثابت} \quad = \begin{bmatrix} 9500 & 725000 \\ 12000 & 1125000 \\ 13500 & 1450000 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8500 & 610000 \\ 9000 & 727500 \\ 9000 & 800000 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5250 & 547500 \\ 9000 & 675000 \\ 9000 & 752500 \end{bmatrix} \\ & \text{اجمع المصفوفات} \quad = \begin{bmatrix} 23250 & 1882500 \\ 30000 & 2527500 \\ 31500 & 3002500 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

تدل المصفوفة النهائية على معدل المبيعات والنفقات في خمسة أسابيع.

تحقق من فهمك

### إرشادات للدراسة

**العناصر المتناظرة**  
عند تمثيل البيانات بمصفوفات متعددة، تأكد أن العناصر المتناظرة تمثل البيانات المتناظرة.

(4) **أعمال:** استعمال البيانات أعلاه لحساب معدل المبيعات والنفقات الشهري لجميع المعارض على فرض أن الشهر 30 يوماً.



أوجد الناتج في كل مما يأتي إذا كان ذلك ممكناً:

مثال 1

$$(1) \begin{bmatrix} 11 & -7 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -8 & 2 & 6 \end{bmatrix} \quad (2) \begin{bmatrix} 12 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 9 & -8 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(3) \begin{bmatrix} 7 & -12 \\ 15 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 4 & -9 \end{bmatrix} \quad (4) \begin{bmatrix} 5 & 13 & -6 \\ 3 & -17 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & -18 & 8 \\ 2 & -11 & 0 \end{bmatrix}$$

مثال 2 أوجد الناتج في كل مما يأتي:

$$(5) 3 \begin{bmatrix} 6 & 4 & 0 \\ -2 & 14 & -8 \\ -4 & -6 & 7 \end{bmatrix} \quad (6) -6 \begin{bmatrix} 15 & -9 & 2 & 3 \\ 6 & -11 & 14 & -2 \\ 4 & -8 & -10 & 27 \end{bmatrix}$$

$$\text{مثال 3 إذا كانت } \underline{A} = \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ 3 & -5 \end{bmatrix} \quad \underline{B} = \begin{bmatrix} 8 & -1 \\ -2 & 7 \end{bmatrix} \quad \underline{C} = \begin{bmatrix} -4 & -6 \\ 12 & -7 \end{bmatrix}$$

فأوجد ناتج كل مما يلي:

$$(7) \underline{4B} - \underline{2A} \quad (8) -\underline{8C} + \underline{3A}$$

مثال 4 (9) درجات حرارة: تبين المصفوفة  $\underline{L}$  المعدل الشهري لدرجات الحرارة الصغرى (بالفهرنهايت) في مدينة ما. وتبين المصفوفة  $\underline{H}$  المعدل الشهري لدرجات الحرارة العظمى (بالفهرنهايت) في تلك المدينة.

$$\underline{H} = \begin{bmatrix} 39.9 & 45.2 & 55.3 \\ 65.1 & 74.0 & 82.3 \\ 85.9 & 84.6 & 78.1 \\ 66.9 & 54.5 & 44.3 \end{bmatrix} \quad \underline{L} = \begin{bmatrix} 24.1 & 27.7 & 35.9 \\ 44.1 & 53.6 & 62.2 \\ 66.4 & 64.9 & 57.9 \\ 46.4 & 37.3 & 28.4 \end{bmatrix}$$

أوجد المصفوفة التي تمثل الفرق بين المعدل الشهري لدرجات الحرارة العظمى والمعدل الشهري لدرجات الحرارة الصغرى في تلك المدينة؟

## تدرب وحل المسائل

مثال 1 أوجد الناتج في كل مما يأتي إذا كان ذلك ممكناً.

$$(10) \begin{bmatrix} 12 & -5 \\ -8 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 & 11 \\ -7 & 2 \end{bmatrix} \quad (11) \begin{bmatrix} 9 & 5 \\ -2 & 16 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 & -3 & 7 \\ 12 & 2 & -4 \end{bmatrix}$$

الأمثلة 2, 3, 4

(12) مشروبات: يبين الجدول المجاور قائمة أسعار المشروبات في مطعم، إذا رفع المطعم أسعار جميع المشروبات بنسبة 50%.

المشروب	صغير	وسط	كبير
غازي	3	4	5
شاي	2	3	4
قهوة	2	3	4
عصير	4	5	6

(a) اكتب المصفوفة  $\underline{C}$  التي تمثل الأسعار الحالية.

(b) ما العدد الذي يمكن أن نضرب المصفوفة  $\underline{C}$  فيه لإيجاد المصفوفة  $\underline{N}$  التي تمثل الأسعار الجديدة؟

(c) جد المصفوفة  $\underline{N}$ .

(d) جد المصفوفة  $\underline{N} - \underline{C}$ . ماذا تمثل هذه المصفوفة في هذه الحالة؟





أوجد الناتج في كل مما يأتي إن أمكن، وإذا تعذر ذلك فاكتب "لا يمكن" مع ذكر السبب:

$$\begin{bmatrix} 4 & -3 & 3 \\ -8 & 12 & 1 \\ 0 & -1 & 5 \\ 7 & -9 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -3 & -8 & 12 \\ -11 & -5 & 3 \\ -1 & 22 & -9 \\ -6 & 31 & 9 \end{bmatrix} \quad (14) \qquad \begin{bmatrix} 19 \\ -2 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -5 \\ 8 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 11 \\ -6 & 12 & -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 8 & -9 & -3 \\ 5 & 14 & 0 \end{bmatrix} \quad (16) \qquad \begin{bmatrix} 62 \\ -37 \\ -4 \end{bmatrix} + [34 \quad 76 \quad -13] \quad (15)$$

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 8 & -3 \end{bmatrix} \quad (18) \qquad \begin{bmatrix} 5 \\ -9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 \\ -7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 9 \\ 16 \end{bmatrix} \quad (17)$$

(19) **كتب:** تحتوي المكتبة A على 10000 كتاب علمي، و5000 كتاب تاريخي و5000 كتاب أدبي. وتحتوي المكتبة B على 15000 كتاب علمي، و10000 كتاب تاريخي و2500 كتاب أدبي. وتحتوي المكتبة C على 4000 كتاب علمي، و700 كتاب تاريخي، و800 كتاب أدبي.

- (a) رتب أعداد الكتب في كل مكتبة في مصفوفات، وارمز إليها بالرموز  $A, B, C$ .
- (b) أوجد العدد الكلي للكتب من كل نوع في المكتبات الثلاث، وعبر عن ذلك بمصفوفة.
- (c) كم يزيد عدد الكتب من كل نوع في المكتبة A على التي في المكتبة C؟
- (d) أوجد المصفوفة  $A + B$ . هل لهذه المصفوفة معنى في هذه الحالة؟ فسّر إجابتك.

أوجد الناتج في كل مما يأتي إن أمكن، وإذا تعذر ذلك فاكتب "لا يمكن" مع ذكر السبب:

$$-4 \begin{bmatrix} -7 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} -8 \\ 3x \\ -9 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} 4 \\ x-6 \\ 12 \end{bmatrix} \quad (21) \qquad -3 \begin{bmatrix} 18 & -6 & -8 \\ -5 & -3 & 12 \\ 0 & 3x & -y \end{bmatrix} \quad (20)$$

$$-6 \left( \begin{bmatrix} 6 & 3y \\ 4x+1 & -2 \\ -9 & xy \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -5 & -6 \\ 8 & -7 \\ x+2 & 2x \end{bmatrix} \right) \quad (23) \qquad -5 \left( \begin{bmatrix} 4 & -8 \\ 8 & -9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & -6 \end{bmatrix} \right) \quad (22)$$

أجر العمليات على المصفوفات الآتية إن أمكن، وإذا تعذر ذلك فاكتب "لا يمكن" مع ذكر السبب:

$$-\frac{3}{4} \begin{bmatrix} 12 & -16 \\ 15 & 8 \end{bmatrix} + \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 21 & 18 \\ -4 & -6 \end{bmatrix} \quad (25) \qquad -2 \begin{bmatrix} -9.2 & -8.4 \\ 5.6 & -4.3 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 4.1 & -2.9 \\ 7.2 & -8.2 \end{bmatrix} \quad (24)$$

### مسائل مهارات التفكير العليا

(26) **برهان:** برهن على أن عملية جمع المصفوفات من النوع  $2 \times 2$  تبديلية.

(27) **برهان:** برهن على أن عملية جمع المصفوفات من النوع  $2 \times 2$  تجميعية.

(28) **تحذ:** إذا كانت:

$$A = \begin{bmatrix} -3 & -4 \\ 8 & 6 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}, 3A - 4B + 6C = \begin{bmatrix} 13 & 22 \\ 10 & 4 \end{bmatrix}$$

فأوجد عناصر المصفوفة C.



### الربط مع الحياة

وصل عدد مقتنيات مكتبات جامعة الملك سعود 874971 عنواناً تقع في 2065863 مجلداً ومادة من مختلف أوعية المعلومات، وبلغت المساحة الإجمالية للمكتبات 62634m<sup>2</sup>. مجهزة بكل تقنيات المكتبات الحديثة وتدير خدماتها ألياً.



- (29) **تبرير:** حدّد إذا كانت كل جملة مما يأتي صحيحة أحيانًا، أو صحيحة دائمًا، أو غير صحيحة أبدًا للمصفوفتين  $A, B$ ، ثم فسّر إجابتك.
- (a) إذا كانت  $A + B$  معرفة، فإن  $A - B$  معرفة.
- (b) إذا كان  $k$  عددًا حقيقيًا، فإن  $kA$  و  $kB$  معرفتان.
- (c) إذا كانت  $A - B$  غير معرفة، فإن  $B - A$  غير معرفة.
- (d) إذا كانت  $A$  و  $B$  لهما عدد العناصر نفسه، فإن  $A + B$  معرفة.
- (e) إذا كانت  $kA$  و  $kB$  معرفتين، فإن  $kA + kB$  معرفة.

(30) **مسألة مفتوحة:** أعط مثالًا على مصفوفتين  $A$  و  $B$ ، على أن تكون  $4B - 3A = \begin{bmatrix} -6 & 5 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ .

(31) **اكتب:** اشرح كيف تجد  $4D - 3C$  لأي مصفوفتين  $D, C$  لهما الرتبة نفسها.

### تدريب على اختبار

(33) **رتبة المصفوفة:** إذا كانت  $A, B$  مصفوفتين من الرتبة

$5 \times 3$ ، فإن رتبة المصفوفة  $A - B$  هي:

$3 \times 2$  **C**  $3 \times 5$  **A**  
 $3 \times 3$  **D**  $5 \times 3$  **B**



(32) حل النظام الآتي:

$$0.06p + 4q = 0.88$$

$$p - q = -2.25$$

**A**  $(-0.912, -1.338)$  **C**  $(-2, 0.25)$

**B**  $(0.912, -3.162)$  **D**  $(-2, -4.25)$

### مراجعة تراكمية

إذا كانت  $A = \begin{bmatrix} -3 & 6 \\ -5 & x \\ 8 & 4y \end{bmatrix}$ ،  $B = \begin{bmatrix} 16 & 4 & x \\ -2 & 9 & y \end{bmatrix}$ ،  $C = \begin{bmatrix} 9 & -5 & 3 & 2 \\ 0 & -6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$ ، فحدّد كل عنصر مما يأتي: (الدرس 1-2)

$b_{23}$  (36)

$c_{13}$  (35)

$a_{32}$  (34)

حل بيانيًا النظام أدناه: (الدرس 1-5)

$$4x + 2y > 8 \quad (37)$$

$$4y - 3x \leq 12$$

(38) **سكان:** في إحصائية عام 1435هـ لأكبر 20 مدينة سعودية من حيث عدد السكان، بلغ عدد سكان مدينة الدمام 903597 نسمة، بما يزيد 333800 على عدد سكان مدينة تبوك. اكتب معادلة لإيجاد عدد سكان مدينة تبوك، ثم حلّها. (مهارة سابقة)

بسّط كل عبارة مما يأتي: (الدرس 1-1)

$$4(2x - 3y) + 2(5x - 6y) \quad (39)$$

$$-3(2a - 5b) - 4(4b + a) \quad (40)$$

$$-7(x - y) + 5(y - x) \quad (41)$$







# 2-3

## ضرب المصفوفات Multiplying Matrices

### لماذا؟

يبين الجدول المجاور أنواع الأقلام وعددها التي باعتها مكتبة في 4 أشهر متتالية.

نوع القلم	الشهر وعدد الأقلام			
	المحرم	صفر	ربيع 1	ربيع 2
رصاص	153	217	197	249
حبر سائل	12	6	7	8
حبر جاف	82	146	102	158

إذا علمت أن سعر بيع قلم الرصاص ريال واحد، وقلم الحبر السائل 3 ريالات، وقلم الحبر الجاف ريالان، فإنه يمكنك تلخيص الجدول بمصفوفة عدد الأقلام  $B$ ، كما يمكنك التعبير عن مصفوفة سعر بيع كل نوع من الأقلام بالمصفوفة  $P$ .

مصفوفة الأسعار  $P$

$$\begin{bmatrix} \text{قلم الرصاص} & \text{حبر السائل} & \text{حبر الجاف} \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

مصفوفة عدد الأقلام  $B$

$$\begin{bmatrix} 153 & 217 & 197 & 249 \\ 12 & 6 & 7 & 8 \\ 82 & 146 & 102 & 158 \end{bmatrix}$$

وباستعمال ضرب المصفوفات، تجد سعر بيع الأقلام في كل شهر.

**ضرب المصفوفات:** يمكنك ضرب مصفوفتين إذا فقط إذا كان عدد أعمدة المصفوفة الأولى يساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية. وعند ضرب المصفوفة  $A$  ذات الرتبة  $m \times r$  في المصفوفة  $B$  ذات الرتبة  $r \times t$ ، فإن الناتج هو المصفوفة  $AB$  ذات الرتبة  $m \times t$ .

$$\begin{matrix} \underline{A} & \cdot & \underline{B} & = & \underline{AB} \\ \begin{matrix} m \times r \\ \uparrow \\ \text{متساويان} \\ \uparrow \\ r \times t \\ \uparrow \\ \text{رتبة } AB \end{matrix} & & & & m \times t \end{matrix}$$

### مثال 1 رتبة مصفوفة ناتج الضرب

هل يمكن إيجاد  $\underline{A} \cdot \underline{B}$  في كل مما يأتي، وإن كانت كذلك، فأوجد رتبة المصفوفة الناتجة:

(a)  $\underline{A}_{3 \times 4} \cdot \underline{B}_{4 \times 2}$

بما أن عدد أعمدة المصفوفة  $\underline{A}$  يساوي عدد صفوف المصفوفة  $\underline{B}$ ، فإن مصفوفة حاصل الضرب  $\underline{A} \cdot \underline{B}$  معرفة، ورتبتها  $3 \times 2$ .

$$\begin{matrix} \underline{A} & \cdot & \underline{B} & = & \underline{AB} \\ \begin{matrix} 3 \times 4 \\ \uparrow \\ 4 \times 2 \\ \uparrow \\ 3 \times 2 \end{matrix} & & & & \end{matrix}$$

(b)  $\underline{A}_{5 \times 3} \cdot \underline{B}_{5 \times 4}$

بما أن عدد أعمدة المصفوفة  $\underline{A}$  لا يساوي عدد صفوف المصفوفة  $\underline{B}$ ، فإن مصفوفة حاصل الضرب  $\underline{A} \cdot \underline{B}$  غير معرفة.

$$\begin{matrix} \underline{A} & \cdot & \underline{B} \\ \begin{matrix} 5 \times 3 \\ \uparrow \\ 5 \times 4 \end{matrix} & & \end{matrix}$$

تحقق من فهمك

(1A)  $\underline{A}_{4 \times 6} \cdot \underline{B}_{6 \times 2}$

(1B)  $\underline{A}_{3 \times 2} \cdot \underline{B}_{3 \times 2}$

### إرشادات للدراسة

#### رمز المصفوفة

أحياناً تكتب  $\underline{A}_{m \times n}$  لتعبر عن مصفوفة  $\underline{A}$  رتبته  $m \times n$ .





يمكنك إيجاد ناتج ضرب مصفوفتين بضرب عناصر صفوف الأولى في عناصر أعمدة الثانية بالترتيب ثم جمع النواتج.

**مفهوم أساسي** ضرب المصفوفات

أضف إلى مطوبتك

التعبير اللفظي: العنصر في الصف  $m$  والعمود  $r$  من المصفوفة  $AB$  هو مجموع نواتج ضرب العناصر في الصف  $m$  من المصفوفة  $A$ ، بعناصر العمود  $r$  من المصفوفة  $B$  بالترتيب.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae+bg & af+bh \\ ce+dg & cf+dh \end{bmatrix}$$

الرموز:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 5 + 3 \times 7 & 2 \times 6 + 3 \times 8 \\ 1 \times 5 + 4 \times 7 & 1 \times 6 + 4 \times 8 \end{bmatrix}$$

مثال:

**تنبيه!**

المحافظة على التركيز من السهل أن تفقد التركيز عند ضرب المصفوفات، وربما تساعدك تغطية الصفوف أو الأعمدة التي لا تقوم بضربها عند إيجاد عناصر مصفوفة الضرب.

**مثال 2 ضرب المصفوفات المربعة**

أوجد  $\underline{X} \underline{Y}$  إذا كانت  $\underline{X} = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -10 & -2 \end{bmatrix}$ ،  $\underline{Y} = \begin{bmatrix} -5 & -4 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$

$$\underline{X} \underline{Y} = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -10 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -5 & -4 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$$

**الخطوة 1:** اضرب عناصر الصف الأول في المصفوفة  $\underline{X}$  في عناصر العمود الأول في المصفوفة  $\underline{Y}$  بالترتيب، ثم اجمع نواتج الضرب، وضع النتيجة في الصف الأول، العمود الأول من المصفوفة  $\underline{X} \underline{Y}$ .

$$\begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -10 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -5 & -4 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6(-5) + (-3)(3) & 6(-4) + (-3)(3) \\ -10(-5) + (-2)(3) & -10(-4) + (-2)(3) \end{bmatrix}$$

**الخطوة 2:** اتبع الخطوات نفسها مع عناصر الصف الأول والعمود الثاني، واكتب النتيجة في الصف الأول والعمود الثاني.

$$\begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -10 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -5 & -4 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6(-5) + (-3)(3) & 6(-4) + (-3)(3) \\ -10(-5) + (-2)(3) & -10(-4) + (-2)(3) \end{bmatrix}$$

**الخطوة 3:** اتبع الخطوات نفسها مع عناصر الصف الثاني والعمود الأول، واكتب النتيجة في الصف الثاني، العمود الأول.

$$\begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -10 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -5 & -4 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6(-5) + (-3)(3) & 6(-4) + (-3)(3) \\ -10(-5) + (-2)(3) & -10(-4) + (-2)(3) \end{bmatrix}$$

**الخطوة 4:** اتبع الخطوات السابقة نفسها مع عناصر الصف الثاني والعمود الثاني.

$$\begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -10 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -5 & -4 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6(-5) + (-3)(3) & 6(-4) + (-3)(3) \\ -10(-5) + (-2)(3) & -10(-4) + (-2)(3) \end{bmatrix}$$

**الخطوة 5:** بسّط المصفوفة الناتجة.

$$\begin{bmatrix} 6(-5) + (-3)(3) & 6(-4) + (-3)(3) \\ -10(-5) + (-2)(3) & -10(-4) + (-2)(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -39 & -33 \\ 44 & 34 \end{bmatrix}$$

تحقق من فهمك

(2) إذا كانت  $\underline{U} = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$ ،  $\underline{V} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 6 & -5 \end{bmatrix}$ ، فأوجد  $\underline{U} \underline{V}$ .

يمكنك استعمال ضرب المصفوفات في عدة مواقف حياتية.



### مثال 3 من واقع الحياة ضرب المصفوفات

الفريق	المركز الأول	المركز الثاني	المركز الثالث
A	4	7	3
B	8	9	1
C	10	5	3
D	3	3	6

**سباحة:** في مسابقة للسباحة بين أربع فرق سجلت 7 نقاط لمن يحل في المركز الأول، و 4 نقاط لمن يحل في المركز الثاني، ونقطتان لمن يحل في المركز الثالث. استعمل الجدول المجاور الذي يبين نتائج مسابقة السباحة لكل فريق لتحديد الفريق الفائز في المسابقة.

**افهم:** المعطيات:

- جدول يبين عدد مرات حصول 4 فرق على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة للسباحة.
- عدد النقاط التي تحتسب للفريق في كل مركز.

**المطلوب:**

- تحديد الفريق الفائز.

**خطط:** يمكن إيجاد النقاط النهائية التي أحرزها كل فريق بضرب مصفوفة النتائج للفريق في مصفوفة عدد النقاط التي تحتسب لكل من المراكز (الأول والثاني والثالث).

**حل:** اكتب كلاً من النتائج والنقاط التي تم الحصول عليها في مصفوفتين، ورتب المصفوفتين على أن يكون عدد الصفوف في مصفوفة النقاط يساوي عدد الأعمدة في مصفوفة النتائج.

$$\begin{matrix} & \text{النقاط} & & \\ & \text{النتائج} & & \\ \begin{matrix} \text{A} \\ \text{B} \\ \text{C} \\ \text{D} \end{matrix} & \underline{R} = \begin{bmatrix} 4 & 7 & 3 \\ 8 & 9 & 1 \\ 10 & 5 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix} & \cdot & \underline{P} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

اضرب المصفوفتين  $RP$ .

$$\underline{RP} = \begin{bmatrix} 4 & 7 & 3 \\ 8 & 9 & 1 \\ 10 & 5 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4(7) + 7(4) + 3(2) \\ 8(7) + 9(4) + 1(2) \\ 10(7) + 5(4) + 3(2) \\ 3(7) + 3(4) + 6(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 62 \\ 94 \\ 96 \\ 45 \end{bmatrix}$$

تبين مصفوفة حاصل الضرب عدد النقاط التي أحرزها كل من الفرق  $A, B, C, D$  على الترتيب؛ لذا فالفريق  $C$  هو الفائز في المسابقة؛ لأنه حصل على أكبر مجموع من النقاط وهو 96 نقطة.

**تحقق:** المصفوفة  $R$  من الرتبة  $4 \times 3$ ، والمصفوفة  $P$  من الرتبة  $3 \times 1$ ؛ لذا فإن حاصل الضرب سيكون مصفوفة من الرتبة  $4 \times 1$ .

**تحقق من فهمك** ✓

**(3) مبيعات:** ارجع إلى فقرة "لماذا؟" بداية الدرس، واستعمل ضرب المصفوفات لتحديد سعر بيع الأقلام في كل شهر.



### الربط مع الحياة

تدل البحوث الصحية والرياضية أن ممارسة السباحة نصف ساعة يومياً تخفض ضغط الدم وتقوي القلب وتقلل معدل الكولسترول في الدم، وتزيد كفاءة الدورة الدموية، وتحرق 500 : 250 سعرة حرارية؛ لذا تعدّ من أفضل الرياضات لتخفيض الوزن.

### مثال 4 اختبار الخاصية الإبدالية

إذا كانت  $\underline{G} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 4 & -2 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $\underline{H} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -8 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$  ، فأوجد ناتج كل مما يأتي:

$\underline{GH}$  (a)

$$\underline{GH} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 4 & -2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -8 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 6 - 5 & 3 - 24 - 35 \\ 8 + 4 + 0 & 12 + 16 + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 & -56 \\ 12 & 28 \end{bmatrix}$$



**HG (b)**

$$\underline{HG} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -8 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 4 & -2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+12 & 6-6 & -10+0 \\ -2-32 & -6+16 & 10+0 \\ 1+28 & 3-14 & -5+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 0 & -10 \\ -34 & 10 & 10 \\ 29 & -11 & -5 \end{bmatrix}$$

لاحظ أن  $\underline{GH} \neq \underline{HG}$ .

**تحقق من فهمك**

(4) إذا كانت  $\underline{A} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$ ،  $\underline{B} = \begin{bmatrix} -3 & 6 \\ -4 & 5 \end{bmatrix}$ ، فهل  $\underline{AB} = \underline{BA}$ ؟

اتضح في المثال 4 أن الخاصية الإبدالية لا تتحقق في ضرب المصفوفات. لذا فإن الترتيب يُعدّ في غاية الأهمية عند ضرب المصفوفات.

إرشادات للدراسة

البرهان والأمثلة  
المضادة

لإثبات صحة خاصية في جميع الحالات، يجب إثبات صحتها في الحالة العامة. ولبيان أن خاصية ما ليست صحيحة يكفي إعطاء مثال مضاد لها.

### مثال 5 اختبار خاصية التوزيع

إذا كانت  $\underline{J} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -5 & -2 \end{bmatrix}$ ،  $\underline{K} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ ،  $\underline{L} = \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ ، فجد ناتج كل مما يأتي:

**(a)  $\underline{J}(\underline{K} + \underline{L})$**

عوض  $\underline{J}(\underline{K} + \underline{L}) = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -5 & -2 \end{bmatrix} \cdot \left( \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \right)$

اجمع المصفوفتين  $= \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -5 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

اضرب المصفوفتين  $= \begin{bmatrix} -2+8 & 2+12 \\ -5-4 & -5-6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 14 \\ 1 & -11 \end{bmatrix}$

**(b)  $\underline{JK} + \underline{JL}$**

$$\underline{JK} + \underline{JL} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -5 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -5 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2(3) + 4(-1) & 2(2) + 4(3) \\ -5(3) + (-2)(-1) & -5(2) + (-2)(3) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2(-4) + 4(3) & 2(-1) + 4(0) \\ -5(-4) + (-2)(3) & -5(-1) + (-2)(0) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 16 \\ -13 & -16 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 14 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 14 \\ 1 & -11 \end{bmatrix}$$

لاحظ أن  $\underline{J}(\underline{K} + \underline{L}) = \underline{JK} + \underline{JL}$ .

**تحقق من فهمك**

(5) إذا كانت  $\underline{R} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ ،  $\underline{S} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$ ،  $\underline{T} = \begin{bmatrix} -3 & 7 \\ -4 & 8 \end{bmatrix}$ ، فحدّد ما إذا كانت المعادلة

$$(\underline{S} + \underline{T})\underline{R} = \underline{SR} + \underline{TR}$$

صحيحة للمصفوفات المعطاة أم لا.

في المثال السابق كانت خاصية توزيع الضرب على الجمع صحيحة، ويمكنك إثبات أن هذه الخاصية صحيحة دائماً إذا كانت عمليتا الضرب والجمع معرفتين.



تُعد الخصائص الآتية صحيحة لأي ثلاث مصفوفات  $A, B, C$ ، ولأي عدد  $k$ ، على أن تكون عمليتا ضرب أو جمع أيٍّ منها معرفتين:

$$(AB)C = A(BC)$$

$$k(AB) = (kA)B = A(kB)$$

$$C(A + B) = CA + CB$$

$$(A + B)C = AC + BC$$

الخاصية التجميعية لضرب المصفوفات

الخاصية التجميعية لضرب المصفوفات في عدد

خاصية التوزيع من اليسار للمصفوفات

خاصية التوزيع من اليمين للمصفوفات

تأكد

مثال 1 حدد إذا كانت عملية الضرب معرفة في كلٍّ مما يأتي أم لا، وإن كانت معرفة فأوجد رتبة المصفوفة الناتجة:

$$E_{8 \times 6} \cdot F_{6 \times 10} \quad (3)$$

$$C_{5 \times 4} \cdot D_{5 \times 4} \quad (2)$$

$$A_{2 \times 4} \cdot B_{4 \times 3} \quad (1)$$

مثال 2 أوجد الناتج في كلٍّ مما يأتي إذا كان ذلك ممكناً:

$$\begin{bmatrix} 10 & -2 \\ -7 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 5 & -2 \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 7 & -5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -6 & 3 \\ -2 & -4 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{bmatrix} -9 \\ 6 \end{bmatrix} \cdot [-1 \quad -10 \quad 1] \quad (7)$$

$$[9 \quad -2] \cdot \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 6 & -7 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 \\ -7 \end{bmatrix} \quad (9)$$

$$\begin{bmatrix} -8 & 7 & 4 \\ -5 & -3 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 10 & 6 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 3 & -1 \\ -3 & 1 & 8 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -7 & 1 \\ 2 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$\begin{bmatrix} -4 & 3 & 2 \\ -1 & -5 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 & 6 \\ 8 & 4 & -1 \\ 5 & 3 & -2 \end{bmatrix} \quad (10)$$

عدد المشتركين في دورات اللياقة البدنية

الاشتراك	المستوى الأول	المستوى الثاني
الأسبوعي	35	28
الشهري	32	17
السنوي	18	12

مثال 3 (12) **لياقة بدنية:** يبين الجدول المجاور عدد المشتركين

في دورات اللياقة البدنية في المستويين الأول والثاني لدى أحد مراكز اللياقة البدنية في مدينة الرياض .

إذا كانت رسوم الاشتراك الأسبوعي 110 ريالاً، ورسوم الاشتراك الشهري 165 ريالاً، ورسوم الاشتراك السنوي 439 ريالاً.

(a) اكتب مصفوفة تمثل عدد الأشخاص المسجلين في المستويات كلها، ومصفوفة تمثل رسوم الاشتراك فيها.

(b) ما المبلغ الكلي الذي يحصل عليه المركز من اشتراكات المستويين الأول والثاني.

المثالان 4 , 5 إذا كانت  $X = \begin{bmatrix} -10 & -3 \\ 2 & -8 \end{bmatrix}$ ,  $Y = \begin{bmatrix} -5 & 6 \\ -1 & 9 \end{bmatrix}$ ,  $Z = \begin{bmatrix} -5 & -1 \\ -8 & -4 \end{bmatrix}$  فحدّد ما إذا كانت العبارة الآتية صحيحة للمصفوفات المعطاة أم لا:

$$X(YZ) = (XY)Z \quad (14)$$

$$XY = YX \quad (13)$$



حدد إذا كانت عملية الضرب معرفة في كل مما يأتي أم لا، وإن كانت معرفة فأوجد رتبة المصفوفة الناتجة:

$$M_{3 \times 1} \cdot N_{2 \times 3} \quad (17)$$

$$A_{5 \times 5} \cdot B_{5 \times 5} \quad (16)$$

$$P_{2 \times 3} \cdot Q_{3 \times 4} \quad (15)$$

$$S_{5 \times 2} \cdot T_{2 \times 4} \quad (20)$$

$$J_{2 \times 1} \cdot K_{2 \times 1} \quad (19)$$

$$X_{2 \times 6} \cdot Y_{6 \times 3} \quad (18)$$

أوجد الناتج في كل مما يأتي إذا كان ذلك ممكناً:

$$\begin{bmatrix} 6 \\ -3 \end{bmatrix} \cdot [2 \quad -7] \quad (22)$$

$$[1 \quad 6] \cdot \begin{bmatrix} -10 \\ 6 \end{bmatrix} \quad (21)$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 7 & -2 \end{bmatrix} \quad (24)$$

$$\begin{bmatrix} -3 & -7 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 9 & -3 \end{bmatrix} \quad (23)$$

$$\begin{bmatrix} -6 & 4 & -9 \\ 2 & 8 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \quad (26)$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 6 \\ -4 & -10 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 & -7 \\ -2 & -9 \end{bmatrix} \quad (25)$$

$$\begin{bmatrix} -4 \\ 8 \end{bmatrix} \cdot [-3 \quad -1] \quad (28)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 9 & -3 \\ 4 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -6 & 7 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \quad (27)$$

عدد الغرف			
المبنى	غرفة بسري واحد	غرفة بسريين	غرفة بثلاث أسرة
1	3	2	2
2	2	3	1
3	4	3	0

(29) **أجنحة فندقية:** لدى مؤسسة للأجنحة الفندقية 3 مباني للإيجار، ويبين الجدول المجاور عدد الغرف في كل مبنى. فإذا كانت الأجرة اليومية للغرفة التي تحوي سرياً واحداً 220 ريالاً، وللغرفة التي تحوي سريين 250 ريالاً، وللغرفة التي تحوي ثلاثة أسرة 360 ريالاً.

مثال 3

(a) اكتب مصفوفة تمثل عدد الغرف، ثم اكتب مصفوفة أسعار الغرف.

(b) اكتب مصفوفة تمثل الدخل اليومي للمؤسسة، على فرض أن جميع الغرف تم تأجيرها.

(c) ما مقدار الدخل اليومي الكلي، على فرض أن جميع الغرف تم تأجيرها.

إذا كانت  $k = 2$ ،  $R = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ -6 & 4 \end{bmatrix}$ ،  $Q = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -2 & -5 \end{bmatrix}$ ،  $P = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ ، فحدد ما إذا كانت المعادلات

المثالان 4, 5

الآتية صحيحة للمصفوفات المعطاة أم لا:

$$\underline{PQR} = \underline{RQP} \quad (31)$$

$$k(\underline{PQ}) = \underline{P}(kQ) \quad (30)$$

$$\underline{R}(\underline{P} + \underline{Q}) = \underline{PR} + \underline{QR} \quad (33)$$

$$\underline{PR} + \underline{QR} = (\underline{P} + \underline{Q})\underline{R} \quad (32)$$

الزهور	سعر البيع	سعر الشراء
جوري	3.00 ريالات	0.50 ريال
نرجس	6 ريالات	1.5 ريال
زنبق	7 ريالات	2 ريال

(34) **تنسيق زهور:** اشترى محل تنسيق زهور 200 زهرة جوري، و 150 زهرة نرجس، و 100 زهرة زنبق، وسعر شراء الزهرة من كل نوع مبين في الجدول المجاور، وكذلك سعر بيع الزهرة بعد تغليفها وتنسيقها في باقة.

(a) استعمل ضرب المصفوفات؛ لإيجاد المبلغ الكلي لشراء الزهور.

(b) استعمل ضرب المصفوفات لإيجاد المبلغ الكلي الذي حصل عليه صاحب المحل من بيع الزهور.

(c) أوجد مقدار ربح المحل من بيع الزهور.



#### الربط مع الحياة

الزنبق يضم حوالي 110 أنواع أهمها الزنبق الأبيض. وتنمو الأزهار من بصيالات محرشفة، وتأخذ شكل الأبواق ولها ست بتلات.



استعمل المصفوفات  $Z = \begin{bmatrix} -3 \\ x + y \end{bmatrix}$ ،  $Y = \begin{bmatrix} -5 & -1.5 \\ x + 2 & y \\ 13 & 1.2 \end{bmatrix}$ ،  $X = \begin{bmatrix} 2 & -6 \\ 3y & -4.5 \end{bmatrix}$ ، لإيجاد ناتج

الضرب في كل مما يأتي إذا كان ذلك ممكناً:

- (35)  $\underline{XY}$  (36)  $\underline{YX}$  (37)  $\underline{ZY}$  (38)  $\underline{YZ}$   
 (39)  $\underline{(YX)Z}$  (40)  $\underline{(XZ)X}$  (41)  $\underline{X(ZZ)}$  (42)  $\underline{(XX)Z}$

### مسائل مهارات التفكير العليا

(43) **تبرير:** إذا كانت رتبة المصفوفة  $AB$  هي  $5 \times 8$ ، ورتبة المصفوفة  $A$  هي  $5 \times 6$ ، فما رتبة المصفوفة  $B$ ؟

(44) **برهان:** بين أن الخصائص الآتية صحيحة للمصفوفات من النوع  $2 \times 2$ .

- (a) خاصية التوزيع للضرب في عدد. (b) خاصية التوزيع للضرب على الجمع.  
 (c) الخاصية التجميعية للضرب. (d) الخاصية التجميعية للضرب في عدد.

(45) **مسألة مفتوحة:** اكتب مصفوفتين  $A$  و  $B$  على أن تكون  $AB = BA$ .

(46) **تحذ:** جد قيم  $a, b, c, d$  التي تجعل العبارة  $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 11 \\ 20 & 29 \end{bmatrix}$  صحيحة.

(47) **اكتب:** ارجع إلى فقرة "لماذا؟" بداية الدرس، واستعمل البيانات المعطاة لشرح كيفية استعمال المصفوفات في إحصاءات المبيعات للمكتبة.

### تدريب على اختبار

(49) **رتبة المصفوفة:** ما رتبة المصفوفة الناتجة عن عملية الضرب الآتية؟

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \\ j & k & l \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

- A  $1 \times 4$   
 B  $3 \times 3$   
 C  $4 \times 1$   
 D  $4 \times 3$

(48) في مشغل ثلاث آلات حياكة، فإذا كان إنتاج كل آلة في 3 أشهر كما في الجدول أدناه، وسعر بيع القطعة الواحدة من إنتاج كل آلة معطى أيضاً، فما المبلغ الذي سيحصل عليه المشغل من مبيعات الأشهر الثلاثة؟

	الشهر 1	الشهر 2	الشهر 3	سعر بيع القطعة
الآلة 1	26	19	36	28
الآلة 2	48	27	16	19
الآلة 3	36	11	18	31

- A 6012 ريال  
 B 5400 ريال  
 C 1221 ريال  
 D 2320 ريال

### مراجعة تراكمية

أوجد الناتج في كل مما يأتي إذا كان ذلك ممكناً: (الدرس 2-2)

(50)  $4 \begin{bmatrix} 8 & -1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$  (51)  $5 \left( 2 \begin{bmatrix} -2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \right)$  (52)  $-4 \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ -5 & 5 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} -6 & -1 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$









## المحددات وقاعدة كرامر Determinants and Cramer's Rule

### لماذا؟

لتحديد الإقليم الذي يعيش فيه أحد النمور، قام عالم حيوانات بتتبعه بواسطة جهاز GPS، وبعد عدة أيام، تأكد العالم أن الإقليم مثلث الشكل. وأنه من الممكن بعد تحديد إحداثيات رؤوس المنطقة استعمال المصفوفات والمحددات لحساب مساحتها.



### فيما سبق:

درست حل أنظمة من المعادلات جبرياً.  
(مهارة سابقة)

### والآن:

- أحسب المحددات.
- أحل أنظمة معادلات خطية باستعمال قاعدة كرامر.

### المفردات:

المحددة  
determinant

محددة الدرجة الثانية  
second-order determinant

محددة الدرجة الثالثة  
third-order determinant

قاعدة الأقطار  
diagonal rule

مصفوفة المعاملات  
coefficient matrix

قاعدة كرامر  
Cramer's Rule

**المحددات:** كل مصفوفة مربعة لها **محددة**، وتسمى محددة المصفوفة من النوع  $2 \times 2$  **محددة الدرجة الثانية**.  
**القطر الرئيسي لمصفوفة مربعة هو:** جميع عناصر المصفوفة التي تمتد من الزاوية اليسرى العلوية للزاوية اليمنى السفلى. أو جميع العناصر  $a_{ij}$  بحيث  $i=j$ .

أضف إلى مطوبتك

### مفهوم أساسي

### محددة الدرجة الثانية

التعبير اللفظي: يرمز لمحددة المصفوفة  $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  بالرمز  $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$  وقيمتها تساوي حاصل ضرب عنصري القطر الرئيس مطروحاً منه حاصل ضرب عنصري القطر الآخر.

بالرموز:  $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - cb$

مثال:  $\begin{vmatrix} 4 & 5 \\ -3 & 6 \end{vmatrix} = 4(6) - (-3)(5) = 39$

### مثال 1 محددة الدرجة الثانية

أوجد قيمة كل محددة فيما يأتي:

$$(a) \begin{vmatrix} 5 & -4 \\ 8 & 9 \end{vmatrix}$$

تعريف محددة الدرجة الثانية

$$\begin{vmatrix} 5 & -4 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = 5(9) - 8(-4)$$

بسّط

$$= 45 + 32$$

$$= 77$$

$$(b) \begin{vmatrix} 0 & 6 \\ 4 & -11 \end{vmatrix}$$

تعريف محددة الدرجة الثانية

$$\begin{vmatrix} 0 & 6 \\ 4 & -11 \end{vmatrix} = 0(-11) - 4(6)$$

بسّط

$$= 0 - 24$$

$$= -24$$

تحقق من فهمك

$$(1A) \begin{vmatrix} -6 & -7 \\ 10 & 8 \end{vmatrix}$$

$$(1B) \begin{vmatrix} 7 & 5 \\ 9 & -4 \end{vmatrix}$$





تُسمى محددات المصفوفات من الرتبة  $3 \times 3$  محددات الدرجة الثالثة. ويمكنك حساب هذه المحددات باستعمال قاعدة الأقطار أو باستعمال محدد المصفوفة  $2 \times 2$ .

### إرشادات للدراسة

#### قاعدة الأقطار

يمكن استعمال قاعدة الأقطار فقط للمصفوفات من الرتبة  $3 \times 3$ .

أضف إلى

مطوبتك

### مفهوم أساسي

#### حساب محدد المصفوفة $3 \times 3$

الطريقة الأولى: باستعمال قاعدة الأقطار

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \\ g & h \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c & f \\ f & i \\ i & h \end{vmatrix}$$

**خطوة 1:** أعد كتابة العمود الأول والثاني عن يمين المحددة.

**خطوة 2:** أوجد حاصل ضرب عناصر القطر الرئيس

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \\ g & h \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c & f \\ f & i \\ i & h \end{vmatrix}$$

وثلاثيات العناصر على الموازيات المبينة ثم اجمع.

**خطوة 3:** أوجد حاصل ضرب عناصر القطر الآخر وثلاثيات

العناصر على الموازيات المبينة ثم اجمع.

**خطوة 4:** لإيجاد قيمة المحددة نطرح ناتج الخطوة 3 من ناتج الخطوة 2.

الطريقة الثانية: باستعمال محدد المصفوفة  $2 \times 2$ .

$$a \cdot \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$

### مثال 2

#### حساب محدد المصفوفة $3 \times 3$

أوجد قيمة  $\begin{vmatrix} 4 & -8 & 3 \\ -3 & 2 & 6 \\ -4 & 5 & 9 \end{vmatrix}$  باستعمال قاعدة الأقطار، ثم باستعمال محدد المصفوفة  $2 \times 2$ .

**أولاً:** باستعمال قاعدة الأقطار:

**الخطوة 1:** أعد كتابة العمود الأول والثاني عن يمين المحددة.

$$\begin{vmatrix} 4 & -8 & 3 \\ -3 & 2 & 6 \\ -4 & 5 & 9 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 4 & -8 \\ -3 & 2 \\ -4 & 5 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 9 \\ 9 & 5 \end{vmatrix}$$

**الخطوة 2:** جد حاصل ضرب عناصر الأقطار وموازياتها.

$$\begin{vmatrix} 4 & -8 & 3 \\ -3 & 2 & 6 \\ -4 & 5 & 9 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 4 & -8 \\ -3 & 2 \\ -4 & 5 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 9 \\ 9 & 5 \end{vmatrix}$$

$$4(2)(9) = 72$$

$$-4(2)(3) = -24$$

$$-8(6)(-4) = 192$$

$$5(6)(4) = 120$$

$$3(-3)(5) = -45$$

$$9(-3)(-8) = 216$$

**الخطوة 3:** اجمع نواتج الضرب في كل مجموعة.

$$72 + 192 + (-45) = 219$$

$$-24 + 120 + 216 = 312$$

**الخطوة 4:** اطرح المجموع الثاني من المجموع الأول.

$$219 - 312 = -93$$

فتكون قيمة المحددة هي  $-93$





ثانياً : باستعمال محدّدة المصفوفة  $2 \times 2$  :

$$\begin{vmatrix} 4 & -8 & 3 \\ -3 & 2 & 6 \\ -4 & 5 & 9 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 9 \end{vmatrix} - (-8) \begin{vmatrix} -3 & 6 \\ -4 & 9 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= 4 \times (-12) + 8 \times (-3) + 3 \times (-7) = -93$$

تحقق من فهمك ✓

$$\begin{vmatrix} -8 & -4 & 4 \\ 0 & -5 & -8 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} \quad (2B) \qquad \begin{vmatrix} -5 & 9 & 4 \\ -2 & -1 & 5 \\ -4 & 6 & 2 \end{vmatrix} \quad (2A)$$

تستعمل المحدّات أيضًا لإيجاد مساحة المثلث. فإذا كانت إحداثيات رؤوس المثلث معلومة، فيمكنك استعمال الصيغة أدناه لإيجاد مساحة المثلث.

**مفهوم أساسي** مساحة المثلث

أضف إلى

التعبير اللفظي: مساحة المثلث الذي إحداثيات رؤوسه  $(a, b), (c, d), (e, f)$  هي القيمة المطلقة للمقدار  $A$ ، حيث:

$$A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a & b & 1 \\ c & d & 1 \\ e & f & 1 \end{vmatrix}$$

مثال: مساحة المثلث في الشكل المجاور هي:


$$A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -4 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

**إرشادات للدراسة**

**صيغة المساحة**

لاحظ أنه يجب أن تستعمل القيمة المطلقة للمقدار  $A$  حتى تضمن أن المساحة غير سالبة.

**مثال 3 من واقع الحياة** حساب مساحة المثلث باستعمال المحدّات



**عالم الحيوان:** عُد إلى فقرة "لماذا؟" بداية الدرس. إذا كانت إحداثيات رؤوس الإقليم الذي يعيش فيه النمر موضحة في الشكل المجاور بالكيلومترات، فاستعمل المحدّات لإيجاد مساحة الإقليم.

$$A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a & b & 1 \\ c & d & 1 \\ e & f & 1 \end{vmatrix}$$

$$(a, b) = (0, 0)$$

$$(c, d) = (4, 12)$$

$$(e, f) = (-2, 8)$$

$$= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 4 & 12 & 1 \\ -2 & 8 & 1 \end{vmatrix}$$

قاعدة الأقطار

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 12 & 1 & 4 & 12 \\ -2 & 8 & 1 & -2 & 8 \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 12 & 1 & 4 & 12 \\ -2 & 8 & 1 & -2 & 8 \end{vmatrix}$$

$$0 + 0 + 32 = 32$$

$$-24 + 0 + 0 = -24$$

اجمع نواتج ظهور عناصر الأقطار

قيمة  $A$

$$A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 4 & 12 & 1 \\ -2 & 8 & 1 \end{vmatrix}$$



**الربط مع الحياة**

يعيش النمر في أقاليم قد تصل مساحتها إلى  $100 \text{ km}^2$ ، ويحرس النمر إقليمه الذي يعيش فيه ويعرفه بتتبع أثره وأماكن روته.



$$= \left(\frac{1}{2}\right) [32 - (-24)] = 28$$

بسّط

فتكون مساحة الإقليم الذي يعيش فيه النمر هي  $28 \text{ km}^2$ .

تحقق من فهمك

**3 خرائط:** يقف خالد وسعد ورضوان عند ثلاث نقاط مختلفة على خريطة المدينة التي يسكنونها، فإذا كانت إحداثيات هذه النقاط هي:  $(9, 11)$ ,  $(4, 6)$ ,  $(15, 3)$ ، بحيث تمثل كل وحدة على الخريطة  $0.5 \text{ km}$ . فما مساحة المنطقة المثلثة التي يقفون عند رؤوسها؟

إرشادات للدراسة

مساحة المثلث

لا تختلف قيمة مساحة المثلث باختلاف ترتيب الرؤوس في المحددة، أو بتبديل الصفوف فيها.

تسمى المصفوفة التي عناصرها معاملات المتغيرات في نظام معادلات بعدة متغيرات بعد ترتيب النظام **مصفوفة المعاملات**.

**قاعدة كرامر:** يمكنك استعمال المحددات لحل أنظمة معادلات، فإذا كانت قيمة المحددة لمصفوفة المعاملات لا تساوي صفرًا، فإن للنظام حلًا وحيدًا. وإذا كانت قيمة المحددة صفرًا، فإما أن يكون للنظام عدد لانهائي من الحلول أو لا حل له، وهناك طريقة لحل أنظمة المعادلات الخطية تُسمى **قاعدة كرامر**.

إرشادات للدراسة

المحددات

تستعمل المحددات لتحديد ما إذا كان لنظام من المعادلات الخطية حل وحيد أم لا.

أضف إلى

مطوبتك

مفهوم أساسي

قاعدة كرامر

إذا كانت  $C$  مصفوفة المعاملات للنظام  $\begin{cases} ax + by = m \\ fx + gy = n \end{cases}$ ، حيث  $C = \begin{bmatrix} a & b \\ f & g \end{bmatrix}$

فإن حل هذا النظام هو  $x = \frac{\begin{vmatrix} m & b \\ n & g \end{vmatrix}}{|C|}$  و  $y = \frac{\begin{vmatrix} a & m \\ f & n \end{vmatrix}}{|C|}$ ، وذلك إذا كانت  $|C| \neq 0$ .

مثال 4

حل نظام من معادلتين

حل النظام الآتي باستعمال قاعدة كرامر:  $\begin{cases} 5x - 6y = 15 \\ 3x + 4y = -29 \end{cases}$

احسب محددة مصفوفة المعاملات

$$|C| = \begin{vmatrix} 5 & -6 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 5(4) - (3)(-6) = 38$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} m & b \\ n & g \end{vmatrix}}{|C|}$$

قاعدة كرامر

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a & m \\ f & n \end{vmatrix}}{|C|}$$

$$= \frac{\begin{vmatrix} 15 & -6 \\ -29 & 4 \end{vmatrix}}{38}$$

عوض

$$= \frac{\begin{vmatrix} 5 & 15 \\ 3 & -29 \end{vmatrix}}{38}$$

$$= \frac{15(4) - (-29)(-6)}{38}$$

احسب المحددات

$$= \frac{5(-29) - 3(15)}{38}$$

$$= \frac{60 - 174}{38}$$

اضرب

$$= \frac{-145 - 45}{38}$$

$$= -\frac{114}{38}$$

اجمع وا طرح

$$= -\frac{190}{38}$$

$$= -3$$

بسّط

$$= -5$$



إرشادات للدراسة

قاعدة كرامر

عندما تكون قيمة محددة مصفوفة المعاملات  $C$  صفرًا، فإنه لا يكون للنظام حل وحيد.



حل النظام هو:  $(-3, -5)$

**تحقق:**  $x = -3, y = -5$   $5(-3) - 6(-5) \stackrel{?}{=} 15$

بسند  $-15 + 30 \stackrel{?}{=} 15$

✓  $15 = 15$

$x = -3, y = -5$   $3(-3) + 4(-5) \stackrel{?}{=} -29$

بسند  $-9 - 20 \stackrel{?}{=} -29$

✓  $-29 = -29$

تحقق من فهمك ✓

$8x - 5y = 70$  (4B)

$9x + 7y = 3$

$7x + 3y = 37$  (4A)

$-5x - 7y = -41$

يمكنك استعمال قاعدة كرامر لحل نظام من ثلاث معادلات أيضًا.

**مفهوم أساسي** استعمال قاعدة كرامر لحل نظام من ثلاث معادلات

أضف إلى مطوبتك

إذا كانت  $C$  مصفوفة المعاملات للنظام  $ax + by + cz = m$  ،  $fx + gy + hz = n$  ، حيث  $C = \begin{bmatrix} a & b & c \\ f & g & h \\ j & k & l \end{bmatrix}$   $jx + ky + lz = p$

فإن حل هذا النظام هو  $x = \frac{\begin{vmatrix} m & b & c \\ n & g & h \\ p & k & l \end{vmatrix}}{|C|}$  ،  $y = \frac{\begin{vmatrix} a & m & c \\ f & n & h \\ j & p & l \end{vmatrix}}{|C|}$  ،  $z = \frac{\begin{vmatrix} a & b & m \\ f & g & n \\ j & k & p \end{vmatrix}}{|C|}$  وذلك إذا كانت  $|C| \neq 0$ .

**مثال 5** حل نظام من ثلاث معادلات

حل النظام الآتي باستعمال قاعدة كرامر:  $4x + 5y - 6z = -14$

$3x - 2y + 7z = 47$

$7x - 6y - 8z = 15$

احسب محدّدة مصفوفة المعاملات

$|C| = \begin{vmatrix} 4 & 5 & -6 \\ 3 & -2 & 7 \\ 7 & -6 & -8 \end{vmatrix} = 621$

$x = \frac{\begin{vmatrix} m & b & c \\ n & g & h \\ p & k & l \end{vmatrix}}{|C|}$

$y = \frac{\begin{vmatrix} a & m & c \\ f & n & h \\ j & p & l \end{vmatrix}}{|C|}$

$z = \frac{\begin{vmatrix} a & b & m \\ f & g & n \\ j & k & p \end{vmatrix}}{|C|}$

$= \frac{\begin{vmatrix} -14 & 5 & -6 \\ 47 & -2 & 7 \\ 15 & -6 & -8 \end{vmatrix}}{621}$

$= \frac{\begin{vmatrix} 4 & -14 & -6 \\ 3 & 47 & 7 \\ 7 & 15 & -8 \end{vmatrix}}{621}$

$= \frac{\begin{vmatrix} 4 & 5 & -14 \\ 3 & -2 & 47 \\ 7 & -6 & 15 \end{vmatrix}}{621}$

$= -\frac{1242}{621} = -2$

$= \frac{2484}{621} = 4$



وعليه يكون حل النظام هو  $(5, -2, 4)$

$$\begin{aligned} 3(5) - 2(-2) + 7(4) &\stackrel{?}{=} 47 \\ 15 + 4 + 28 &\stackrel{?}{=} 47 \\ \checkmark \quad 47 &= 47 \end{aligned}$$

**تحقق :**  $4(5) + 5(-2) - 6(4) \stackrel{?}{=} -14$   
 $20 - 10 - 24 \stackrel{?}{=} -14$   
 $\checkmark \quad -14 = -14$

$7(5) - 6(-2) - 8(4) \stackrel{?}{=} 15$   
 $35 + 12 - 32 \stackrel{?}{=} 15$   
 $\checkmark \quad 15 = 15$

تحقق من فهمك

$$\begin{aligned} 6x + 5y + 2z &= -1 \quad (5B) \\ -x + 3y + 7z &= 12 \\ 5x - 7y - 3z &= -52 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3x + 5y + 2z &= -7 \quad (5A) \\ -4x + 3y - 5z &= -19 \\ 5x + 4y - 7z &= -15 \end{aligned}$$

إرشادات للدراسة

التحقق من الحل  
 للتحقق من الحل،  
 عوض القيم في  
 المعادلات الأصلية.

تأكد

أوجد قيمة كل محدّدة مما يأتي:

$$\begin{vmatrix} -6 & -6 \\ 8 & 10 \end{vmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{vmatrix} 16 & -10 \\ -8 & 5 \end{vmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 5 \\ -4 & 6 & -2 \\ 4 & -1 & -6 \end{vmatrix} \quad (6)$$

$$\begin{vmatrix} -5 & -3 & 4 \\ -2 & -4 & -3 \\ 8 & -2 & 4 \end{vmatrix} \quad (8)$$

$$\begin{vmatrix} -4 & 3 & 0 \\ 1 & 5 & -2 \\ -1 & -8 & -3 \end{vmatrix} \quad (10)$$

$$\begin{vmatrix} 8 & 6 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{vmatrix} -4 & 12 \\ 9 & 5 \end{vmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 & 2 \\ -4 & 2 & -5 \\ -3 & 1 & 4 \end{vmatrix} \quad (5)$$

$$\begin{vmatrix} 8 & 4 & 0 \\ -2 & -6 & -1 \\ 5 & -3 & 6 \end{vmatrix} \quad (7)$$

$$\begin{vmatrix} 8 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 6 & 5 \end{vmatrix} \quad (9)$$

المثالان 1, 2



الربط مع الحياة

مثلث برمودا منطقة جغرافية في المحيط الأطلسي على شكل مثلث متساوي الأضلاع (كل ضلع نحو 1500 km)، ومساحته حوالي 1000000 km<sup>2</sup>. وهي منطقة شهيرة بسبب مزاعم عن مخاطر وحوادث وقعت فيها ولم يُحلّ اللغز حتى الآن.

مثال 3

(11) **جغرافيا:** استعمل الخريطة الإحداثية المجاورة،

التي تظهر منطقة مثلث برمودا، للإجابة عما يأتي:

(a) احسب مساحة منطقة مثلث برمودا على الخريطة.

(b) إذا كان طول كل وحدة على الخريطة تمثل 175 ميلاً في الواقع،

فأوجد مساحة منطقة مثلث برمودا الحقيقية.

استعمل قاعدة كرامر لحل كل نظام معادلات مما يأتي:

مثال 4

$$10c - 7d = -59 \quad (13)$$

$$6c + 5d = -63$$

$$4x - 5y = 39 \quad (12)$$

$$3x + 8y = -6$$





مثال 5 استعمال قاعدة كرامر لحل كل نظام معادلات مما يأتي:

$$\begin{aligned} 6x - 5y + 2z &= -49 & (15) & & 4x - 2y + 7z &= 26 & (14) \\ -5x - 3y - 8z &= -22 & & & 5x + 3y - 5z &= -50 \\ -3x + 8y - 5z &= 55 & & & -7x - 8y - 3z &= 49 \end{aligned}$$

## تدرب وحل المسائل

المثالان 1, 2 أوجد قيمة كل محدّدة مما يأتي:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} -5 & 8 \\ -6 & -7 \end{vmatrix} & (18) & \begin{vmatrix} -8 & -9 \\ 11 & 12 \end{vmatrix} & (17) & \begin{vmatrix} -7 & 12 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} & (16) \\ \begin{vmatrix} -5 & -1 & -2 \\ 1 & 8 & 4 \\ 0 & -6 & 9 \end{vmatrix} & (21) & \begin{vmatrix} 2 & 0 & -6 \\ -3 & -4 & -5 \\ -2 & 5 & 8 \end{vmatrix} & (20) & \begin{vmatrix} 3 & 5 & -2 \\ -1 & -4 & 6 \\ -6 & -2 & 5 \end{vmatrix} & (19) \end{aligned}$$

مثال 3 (22) علم الآثار: وجد عالم آثار عظام حوت عند الإحداثيات (0, 3), (4, 7), (5, 9) على الخريطة. فإذا كانت الإحداثيات بالأمتار. فجد مساحة المثلث الذي رؤوسه تلك النقاط.

استعمل قاعدة كرامر لحل كل نظام معادلات مما يأتي:

$$\begin{aligned} 10a - 3b &= -34 & (24) & & 6x - 5y &= 73 & (23) \\ 3a + 8b &= -28 & & & -7x + 3y &= -71 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8x - 4y + 7z &= 34 & (26) & & 5x - 4y + 6z &= 58 & (25) \\ 5x + 6y + 3z &= -21 & & & -4x + 6y + 3z &= -13 \\ 3x + 7y - 8z &= -85 & & & 6x + 3y + 7z &= 53 \end{aligned}$$

(27) رحلة مدرسية: نظمت مدرسة ثانوية رحلة إلى المدينة المنورة التي تبعد 615 km عن المدرسة. فإذا كان معدل سرعة الحافلة على الطريق السريع 105 km/h، ومعدل سرعتها داخل المدن 45 km/h، وكان زمن سير الحافلة 7 ساعات. فاستعمل قاعدة كرامر لإيجاد عدد ساعات سيرها على الطريق السريع، وعدد ساعات سيرها داخل المدن.

استعمل قاعدة كرامر لحل كل نظام معادلات مما يأتي:

$$\begin{aligned} 7x + 8y + 9z &= -149 & (29) & & 3a - 5b - 9c &= 17 & (28) \\ -6x + 7y - 5z &= 54 & & & 4a - 3c &= 31 \\ 4x + 5y - 2z &= -44 & & & -5a - 4b - 2c &= -42 \end{aligned}$$

(30) صناعة: ينتج مصنع 3 أحجام من علب الطلاء الفارغة، حجم صغير بتكلفة 1.15 ريال للعبلة، وحجم متوسط بتكلفة 1.75 ريال للعبلة، وحجم كبير بتكلفة 2.25 ريال للعبلة، وفي أحد الأيام أنتج من علب الحجم الصغير ضعف ما أنتجه من علب الحجم المتوسط، وكان مجموع ما أنتجه في ذلك اليوم 1385 عبلة من جميع الأحجام، بتكلفة إجمالية قدرها 2238.75 ريالاً.

(a) استعمل قاعدة كرامر لإيجاد عدد العلب التي أنتجها المصنع من كل حجم في ذلك اليوم.

(b) إذا زادت تكلفة إنتاج علب الحجم الصغير فقط في اليوم التالي لتصبح 1.25 ريالاً بعد زيادة طفيفة في الحجم، فأوجد تكلفة الإنتاج في اليوم التالي إذا كان إنتاج المصنع مقارنة باليوم السابق أقل بـ 140 عبلة من الحجم الصغير، وأكثر بـ 125 عبلة من الحجم المتوسط، وأكثر بـ 35 عبلة من الحجم الكبير.

وزارة التعليم  
Ministry of Education  
2021 - 1443



### الربط مع الحياة

عثر الباحثون أثناء التنقيب في أحد الكهوف على بقايا بشرية، وقدروا أنها ترجع إلى ما قبل 200000 سنة.



(31) **بستنة:** أراد حمد إنشاء حديقة مثلثية الشكل في فناء منزله، فرسم لها مخططاً على المستوى الإحداثي، فكانت إحداثيات رؤوس الحديقة على المستوى  $(-1, 7), (2, 6), (4, -3)$ . جد المساحة الحقيقية للحديقة إذا كانت كل وحدة على المستوى الإحداثي تمثل متراً على الأرض.

### مسائل مهارات التفكير العليا

(32) **تحذ:** أوجد قيمة محدّدة مصفوفة من النوع  $3 \times 3$ ، على أن تكون عناصرها على النحو الآتي:

$$a_{mn} = \begin{cases} 0 & \text{إذا كان } m+n \text{ زوجياً} \\ m+n & \text{إذا كان } m+n \text{ فردياً} \end{cases}$$

(33) **مسألة مفتوحة:** أعط مثلاً لمصفوفة من الرتبة  $2 \times 2$  تحقق الشرط المذكور في كل مما يأتي:


(a) المحدّدة تساوي صفراً.

(b) المحدّدة تساوي 25

(c) جميع العناصر أعداد سالبة والمحدّدة تساوي -32

(34) **اكتب:** صف التمثيلات البيانية الممكنة لنظام من معادلتين خطيتين بمتغيرين إذا كانت محدّدة مصفوفة المعاملات تساوي صفراً.

### تدريب على اختبار



(36) أوجد مساحة المثلث المبين في الشكل المجاور.

- A 10 وحدات مربعة  
B 14 وحدة مربعة  
C 12 وحدة مربعة  
D 16 وحدة مربعة

(35) **إجابة قصيرة:** أعط مثلاً لمصفوفة من الرتبة  $2 \times 2$ ، بحيث تكون جميع عناصرها أعداداً سالبة ومحدّتها تساوي 20.

### مراجعة تراكمية

حدّد إذا كانت مصفوفة الضرب معرّفة في كل مما يأتي أم لا، وإذا كانت كذلك، فأوجد رتبة المصفوفة الناتجة: (الدرس 3-2)

(39)  $\underline{E}_{2 \times 7} \cdot \underline{F}_{7 \times 1}$

(38)  $\underline{C}_{5 \times 4} \cdot \underline{D}_{5 \times 3}$

(37)  $\underline{A}_{4 \times 2} \cdot \underline{B}_{2 \times 6}$

حل كل نظام مما يأتي: (مهارة سابقة)

(41)  $4y + 6x = 10$

$2x - 7y = 22$

(40)  $2x - 5y = -26$

$5x + 3y = -34$







## النظير الضربي للمصفوفة وأنظمة المعادلات الخطية Inverse Matrices and Systems of Linear Equations



### لماذا؟

يبين الشكل المجاور أسعار وجبة الغداء في مطعم. ولتحديد سعر كل من الشطيرة، وعلبة المقبلات، وعلبة العصير، يمكنك إيجاد قيم المتغيرات  $w, s, d$  التي تحقق المساواة:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ s \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 19 \\ 38 \end{bmatrix}$$

حيث  $w$  تمثل سعر الشطيرة، و  $s$  تمثل سعر علبة المقبلات، و  $d$  تمثل سعر علبة العصير.

### فيما سبق:

درست حل نظام معادلات خطية جبرياً. (مهارة سابقة)

### والآن:

- أجد النظير الضربي لمصفوفة من النوع  $2 \times 2$ .
- أكتب معادلات مصفوفية لنظام من معادلتين وأحلها.

### المفردات:

- مصفوفة الوحدة identity matrix
- النظير الضربي للمصفوفة inverse matrix
- المعادلة المصفوفية matrix equation
- مصفوفة الثوابت constant matrix
- مصفوفة المتغيرات variable matrix

**مصفوفة الوحدة ونظير المصفوفة الضربي:** تذكر أن عددين من الأعداد الحقيقية يكون كل منهما نظيراً ضربياً للآخر إذا كان حاصل ضربهما هو العنصر المحايد لعملية الضرب. وكذلك الحال في المصفوفات، فإن مصفوفة الوحدة هي مصفوفة مربعة جميع عناصر قطرها الرئيس تساوي واحداً، والباقي أصفار.

مصفوفة وحدة من النوع  $3 \times 3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

مصفوفة وحدة من النوع  $2 \times 2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

أضف إلى رطوبتك

### المصفوفة المحايدة لعملية الضرب

### مفهوم أساسي

التعبير اللفظي: المصفوفة المحايدة لعملية الضرب ورمزها  $I$  هي مصفوفة الوحدة، والتي إذا ضربت في أي مصفوفة أخرى من الرتبة نفسها كان الناتج هو المصفوفة الأخرى.

لأي مصفوفة مربعة  $A$  لها رتبة مصفوفة الوحدة  $I$  نفسها،  
فإن  $A \cdot I = I \cdot A = A$ .

الرموز: إذا كانت  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ، و  $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  فإن

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \quad \text{مثال:}$$



إذا كانت المصفوفتان  $A, B$  مربعيتين ولهما الرتبة نفسها، وكان  $AB = BA = I$  فإن المصفوفة  $B$  تسمى

نظيراً ضربياً للمصفوفة  $A$ ، وكذلك تسمى المصفوفة  $A$  نظيراً ضربياً للمصفوفة  $B$ . وإذا كان للمصفوفتين  $A, B$  نظير

ضربي فإنه يرمز إليه بالرمز  $A^{-1}$ ، حيث  $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$



التحقق من النظير الضربي

بما أن عملية ضرب المصفوفات ليست عملية إبدالية، فمن الضروري التأكد من الضرب في الاتجاهين.

مثال 1

التحقق من النظير الضربي

حدّد ما إذا كانت كلٌّ من المصفوفتين تمثل نظيرًا ضربيًا للأخرى أم لا فيما يأتي:

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix} \quad (a)$$

كلٌّ من المصفوفتين  $A, B$  تمثل نظيرًا ضربيًا للأخرى إذا وفقط إذا كان  $A \cdot B = B \cdot A = I$ .

اكتب المعادلة

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix}$$

اضرب المصفوفتين

$$= \begin{bmatrix} -1+1 & 2-2 \\ -\frac{1}{2}+\frac{1}{2} & 1-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

بما أن  $A \cdot B \neq I$ ، فإن أيًا منهما لا تمثل نظيرًا ضربيًا للأخرى.

$$F = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}, G = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{5}{8} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{8} \end{bmatrix} \quad (b)$$

كلٌّ من المصفوفتين  $F, G$  تمثل نظيرًا ضربيًا للأخرى إذا وفقط إذا كان  $F \cdot G = G \cdot F = I$ .

اكتب المعادلة

$$F \cdot G = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -2 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{5}{8} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{8} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{9}{4} - \frac{5}{4} & \frac{15}{8} - \frac{15}{8} \\ -\frac{6}{4} + \frac{6}{4} & -\frac{10}{8} + \frac{18}{8} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

اكتب المعادلة

$$G \cdot F = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{5}{8} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{8} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{9}{4} - \frac{10}{8} & -\frac{15}{4} + \frac{30}{8} \\ \frac{3}{4} - \frac{6}{8} & -\frac{5}{4} + \frac{18}{8} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

بما أن  $F \cdot G = G \cdot F = I$ ، فإن كلًّا من المصفوفتين  $F, G$  نظير ضربي للأخرى.

تحقق من فهمك

$$X = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \quad (1)$$

يمكنك استعمال المحدّات؛ لإيجاد النظير الضربي لمصفوفة ما.

لاحظ تبديل موضعي عنصري القطر الرئيس، وتغيير إشارتي عنصري القطر الآخر عند حساب  $A^{-1}$ .

أضف إلى

مطوّبتك



النظير الضربي للمصفوفة من النوع  $2 \times 2$

النظير الضربي للمصفوفة  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  هو  $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$  وذلك إذا كانت  $|A| \neq 0$ .

مفهوم أساسي

لاحظ أنه إذا كانت قيمة محدّدة مصفوفة ما تساوي صفرًا، فليس للمصفوفة نظير ضربي.



## مثال 2 إيجاد النظير الضربي للمصفوفة

أوجد النظير الضربي لكل مصفوفة فيما يأتي، إن وجد:

$$P = \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \quad (a)$$

$$|P| = \begin{vmatrix} 7 & -5 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -7 - (-10) = 3$$

احسب المحددة

بما أن قيمة المحددة لا تساوي صفرًا، فإن  $P^{-1}$  موجودة.

تعريف النظير الضربي للمصفوفة من الرتبة  $2 \times 2$

$$P^{-1} = \frac{1}{|P|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$|P| = 3 \quad = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\text{بسط} \quad = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix}$$

**تأكد:** أوجد ناتج ضرب المصفوفتين. وإذا كان كل من ناتج الضرب يساوي I، فإن كلتا المصفوفتين نظير ضربي للأخرى.

$$\checkmark \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{7}{3} + \frac{10}{3} & \frac{35}{3} - \frac{35}{3} \\ -\frac{2}{3} + \frac{2}{3} & \frac{10}{3} - \frac{7}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} -8 & -6 \\ 12 & 9 \end{bmatrix} \quad (b)$$

$$|Q| = \begin{vmatrix} -8 & -6 \\ 12 & 9 \end{vmatrix} = -72 - (-72) = 0$$

احسب المحددة

بما أن قيمة المحددة تساوي صفرًا، فإن  $Q^{-1}$  ليس موجودًا.

تحقق من فهمك

$$T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} \quad (2B)$$

$$D = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} \quad (2A)$$

## إرشادات للدراسة

### المعادلات المصفوفية

يمكنك استعمال هذه الطريقة لحل نظام معادلات فقط إذا كان لمصفوفة المعاملات  $A$  نظير ضربي، أما إذا لم يكن لها نظير ضربي، فيمكن أن يكون للنظام عدد لانهاية من الحلول، أو لا يوجد له حل.

**المعادلات المصفوفية:** يمكنك استعمال المصفوفات لتمثيل نظام من المعادلات وحله. فمثلاً، يمكنك كتابة معادلة مصفوفية لحل نظام معادلتين خطيتين:

$$\begin{cases} ax + by = m \\ fx + gy = n \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} ax + by \\ fx + gy \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix}$$

ويمكنك التعبير عما سبق بالمعادلة المصفوفية الآتية:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ f & g \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix}$$

مصفوفة المعاملات

مصفوفة المتغيرات

المتغيرات في النظام فقط

مصفوفة الثوابت

في النظام فقط

وزارة التعليم

Ministry of Education

2021 - 1443



$$\begin{array}{lcl}
 \text{ثم حُلَّ المعادلة المصفوفية بالطريقة نفسها التي تُحَلُّ بها أي معادلة أخرى من الشكل } ax = b & & ax = b \\
 \underline{A} \underline{X} = \underline{B} & \text{المعادلة} & \\
 \underline{A}^{-1} \underline{A} \underline{X} = \underline{A}^{-1} \underline{B} & \text{اضرب كل طرف في النظير الضربي} & \left(\frac{1}{a}\right)ax = \left(\frac{1}{a}\right)b \\
 & \text{لمصفوفة المعاملات إن وجد} & \\
 \underline{I} \underline{X} = \underline{A}^{-1} \underline{B} & \underline{A}^{-1} \underline{A} = \underline{I}, \left(\frac{1}{a}\right)a = 1 & 1x = \frac{b}{a} \\
 \underline{X} = \underline{A}^{-1} \underline{B} & \underline{I} \underline{X} = \underline{X}, 1x = x & x = \frac{b}{a}
 \end{array}$$

لاحظ أن حُلَّ المعادلة المصفوفية من الشكل  $\underline{A} \underline{X} = \underline{B}$  هو حاصل ضرب النظير الضربي لمصفوفة المعاملات في مصفوفة الثوابت.

### حل نظام من معادلتين باستعمال المعادلة المصفوفية

### مثال 3 من واقع الحياة

**سفر:** زوّد سلمان سيارته بالوقود مرتين في أثناء سفره إلى الرياض قادمًا من جدة، إذا كان سعر البنزين في المحطة الأولى 1.50 ريال لكل لتر، وفي المحطة الثانية كان السعر 1.45 ريال لكل لتر، وكان مجموع ما زوّد به سيارته من البنزين 100 لتر، بسعر إجمالي 149 ريال، فكم لتر بنزين زوّد به سيارته من كل محطة؟

يُكتب نظام المعادلتين الذي يمثل هذه الحالة على النحو الآتي:

$$x + y = 100$$

$$1.50x + 1.45y = 149$$

**الخطوة 1:** اكتب المعادلة المصفوفية بافتراض أن  $x$  عدد لترات البنزين من المحطة الأولى، و  $y$  عدد لترات البنزين من المحطة الثانية:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1.50 & 1.45 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 149 \end{bmatrix}$$

**الخطوة 2:** أوجد النظير الضربي لمصفوفة المعاملات.

$$\underline{A}^{-1} = \frac{1}{1.50 - 1.45} \begin{bmatrix} 1.45 & -1 \\ -1.50 & 1 \end{bmatrix} = -\frac{1}{0.05} \begin{bmatrix} 1.45 & -1 \\ -1.50 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -29 & 20 \\ 30 & -20 \end{bmatrix}$$

**الخطوة 3:** حُلَّ المعادلة المصفوفية باستعمال  $\underline{X} = \underline{A}^{-1} \underline{B}$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -29 & 20 \\ 30 & -20 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 100 \\ 149 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 80 \\ 20 \end{bmatrix}$$

إذن الحل هو  $(80, 20)$ ، وهذا يعني أن سلمان زوّد سيارته بـ 80 لترًا من المحطة الأولى و 20 لترًا من الثانية.



### الربط مع الحياة

هناك 90% من محطات الوقود العاملة في المملكة يُديرها أفراد يمتلكون هذه المحطات، بينما 10% فقط من هذه المحطات تُديرها شركات متخصصة في مجال تشغيل وإدارة محطات الوقود.





مثال 1 حدّد ما إذا كانت كلٌّ من المصفوفتين تمثل نظيرًا ضربيًا للأخرى أم لا فيما يأتي:

$$\underline{F} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \underline{G} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (2) \quad \underline{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \underline{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

مثال 2 أوجد النظير الضربي لكل مصفوفة فيما يأتي إن وجد:

$$\begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \quad (4) \quad \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

مثال 3 (5) نقود: مع أحمد 25 قطعة نقدية من فئة أرباع وأنصاف الريالات، بحيث تبلغ قيمة ما معه 8.5 ريالاً. فما عدد الأرباع والأنصاف التي معه؟

استعمل معادلة مصفوفية لحل كل نظام فيما يأتي:

$$\begin{array}{l} -2x + y = -4 \quad (8) \\ 3x + y = 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} 4x - 2y = 22 \quad (7) \\ 6x + 9y = -3 \end{array} \quad \begin{array}{l} -2x + y = 9 \quad (6) \\ x + y = 3 \end{array}$$

## تدرب وحل المسائل

مثال 1 حدّد ما إذا كانت كلٌّ من المصفوفتين تمثل نظيرًا ضربيًا للأخرى أم لا فيما يأتي:

$$\underline{R} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \underline{S} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \quad (11) \quad \underline{M} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \underline{N} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (10) \quad \underline{K} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, \underline{L} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \quad (9)$$

مثال 2 أوجد النظير الضربي لكل مصفوفة فيما يأتي إن وجد:

$$\begin{bmatrix} -5 & -4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \quad (15) \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -6 & -1 \end{bmatrix} \quad (14) \quad \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad (13) \quad \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (12)$$

مثال 3 (16) مشتريات: دفع سعد 225 ريالاً لشراء 5 أقلام حبر جافة و 6 أقلام حبر سائلة، بينما دفع ماجد 120 ريالاً لشراء 3 أقلام جافة من النوع نفسه و 3 أقلام سائلة من النوع نفسه. فإذا كان سعر القلم الجاف  $x$ . وسعر القلم السائل  $y$ ، فاستعمل معادلة مصفوفية؛ لإيجاد سعر القلم الجاف.

(17) سكان: يبين الشكل الآتي نسبة الهجرة السنوية بين إحدى المدن وضواحيها.



اكتب مصفوفة تبين نسبة المهاجرين والباقيين في كلٍّ من المدينة والضواحي.

استعمل معادلة مصفوفية لحل كل نظام إن أمكن فيما يأتي:

$$\begin{array}{l} x + y = 4 \quad (20) \\ -4x + y = 9 \end{array} \quad \begin{array}{l} -x + y = 3 \quad (19) \\ -2x + y = 6 \end{array} \quad \begin{array}{l} -x + y = 4 \quad (18) \\ -x + y = -4 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 4x + 2y = 6 \quad (23) \\ 6x - 3y = 9 \end{array} \quad \begin{array}{l} y - x = 5 \quad (22) \\ 2y - 2x = 8 \end{array} \quad \begin{array}{l} 3x + y = 3 \quad (21) \\ 5x + 3y = 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2y - 4x = 3 \quad (26) \\ 4x - 3y = -6 \end{array} \quad \begin{array}{l} 4y - x = -2 \quad (25) \\ 3y - x = 6 \end{array} \quad \begin{array}{l} 1.6y - 0.2x = 1 \quad (24) \\ 0.4y - 0.1x = 0.5 \end{array}$$

## الربط مع الحياة

تسعى حكومتنا الرشيدة إلى إقامة العديد من المشاريع في الضواحي بهدف وضع بنية تحتية فاعلة، مما يشجع على الهجرة العكسية أو هجرة السكان من المدن إلى الضواحي.



## مسائل مهارات التفكير العليا

(27) **اكتشف الخطأ:** أنشأت كل من هاجر وفاطمة معادلة مصفوفية لنظام المعادلتين  $5x + 7y = 19, 3y + 4x = 10$ . فهل حل أحدهما أو كليهما صحيح؟ فسّر إجابتك.

فاطمة

$$\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 \\ 10 \end{bmatrix}$$

هاجر

$$\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 \\ 10 \end{bmatrix}$$

(28) **تحّد:** صِف المعادلة المصفوفية لنظام معادلتين خطيتين بمتغيرين ذات العدد اللانهائي من الحلول.

(29) **تبرير:** حدّد إذا كانت الجملة الآتية صحيحة دائماً، أو صحيحة أحياناً، أو غير صحيحة أبداً، وفسّر إجابتك. "المصفوفة المربعة لها نظير ضربي".

(30) **مسألة مفتوحة:** اكتب معادلة مصفوفية ليس لها حل.

(31) **اكتب:** اشرح كيف يمكن استعمال معادلات مصفوفية لحل أنظمة معادلات، ومتى يكون استعماله أكثر فاعلية.

## تدريب على اختبار

(32) **إجابة قصيرة:** تبيع مكتبة 3 أحجام من الدفاتر: حجم صغير بسعر 2 ريال، وحجم متوسط بسعر 3 ريالات، وحجم كبير بسعر 4 ريالات، فإذا باعت المكتبة 52 دفترًا في أحد الأشهر، وكان عدد الدفاتر المباعة من الحجم المتوسط يزيد على عدد الدفاتر المباعة من الحجم الصغير بـ 7 دفاتر، وكان إجمالي المبيعات 150 ريالاً. فما عدد الدفاتر المباعة من الحجم المتوسط؟

11 A      17 B      24 C      36 D

## مراجعة تراكمية

جد قيمة كل محدّدة فيما يأتي: (الدرس 2-4)



$$\begin{vmatrix} 8 & 6 & -1 \\ -4 & 5 & 1 \\ -3 & -2 & 9 \end{vmatrix} \quad (35)$$

$$\begin{vmatrix} 9 & -7 \\ -5 & -3 \end{vmatrix} \quad (34)$$

$$\begin{vmatrix} 8 & -3 \\ 6 & -9 \end{vmatrix} \quad (33)$$

(36) **حليب:** تنتج مزرعة أبقار 200 جالون على الأكثر من الحليب الطازج والحليب المبستر يوميًا. فإذا كان كل زبون من زبائن المزرعة يحتاج إلى 15 جالونًا على الأقل من الحليب المبستر، و 21 جالونًا على الأقل من الحليب الطازج يوميًا، وكان ربح المزرعة في الجالون الواحد من الحليب المبستر 8.2 ريالات، ومن الحليب الطازج 7.5 ريالات. فكم عدد الجالونات التي يجب إنتاجها من كلا النوعين ليكون الربح أكبر ما يمكن؟ (الدرس 1-6)

حدّد نوع الدالة الممثلة بيانيًا في كلّ مما يأتي: (الدرس 1-3)







الهدف

أستعمل الحاسبة البيانية TI-nspire والمصفوفة الموسعة لحل نظام معادلات خطية.

مثال

يُمكنك حلُّ نظام معادلات خطية باستعمال الحاسبة البيانية TI-nspire، إذ تحتوي المصفوفة الموسعة على مصفوفة المعاملات مع عمود إضافي إلى اليمين يحوي الثوابت، وباختزال المصفوفة الموسعة يصبح من السهل تحديد حل نظامٍ من المعادلات.

اكتب مصفوفةً موسعةً لنظام المعادلات الآتي، ثم حل هذا النظام باستعمال الحاسبة البيانية:



$$2x + y + z = 1$$

$$3x + 2y + 3z = 12$$

$$4x + y + 2z = -1$$

الخطوات:

- افتح الآلة الحاسبة بالضغط على **on**.
- من الشاشة الظاهرة اختر **A** العتبات الحاسبة ومنها اختر **1: إضافة تطهير الحاسبة**.
- اختر **1: إنشاء** ومنها **1: المصفوفة** فتظهر شاشة نحدد من خلالها عدد الصفوف وعدد الأعمدة.
- أدخل عدد الصفوف ثم اضغط **tab** وأدخل عدد الأعمدة ثم اضغط **enter**.
- أدخل معاملات المتغيرات والثوابت مستعملاً **tab** للتنقل، ثم اضغط **enter**.
- اضغط **doc** واختر منها **1: ملف** ثم **5: حفظ باسم...** ثم سمّ الملف واضغط **حفظ**.
- اضغط **menu**، ثم اختر **7: المصفوفات و المتجهات** ومنها اختر **5: Reduced Row-Echelon Form**.
- استعمل السهم لأعلى **^** لتظلل المصفوفة الموسعة التي كتبتها ثم اضغط **enter** ثم **enter** مرة أخرى فيظهر الحل.



ادرس الشكل المختزل للمصفوفة، ولاحظ أن الأعمدة الثلاثة الأولى تشكل مصفوفة محايدة من الرتبة  $3 \times 3$ ، وتستنتج من الصف الأول أن  $x = -4$ ، ومن الصف الثاني أن  $y = 3$ ، ومن الصف الثالث أن  $z = 6$ ، وعليه يكون الحل  $(-4, 3, 6)$ .

تمارين:

اكتب مصفوفةً موسعةً لكل نظام معادلات فيما يأتي، ثم حله باستعمال الحاسبة البيانية:

$$6x - 4y + 2z = -4 \quad (3)$$

$$4x + 6y = 0 \quad (2)$$

$$3x + 2y = -4 \quad (1)$$

$$2x - 2y + 6z = 10$$

$$8x - 2y = 7$$

$$4x + 7y = 13$$

$$3x + 2y + 2z = -2$$



المفردات

المصفوفة (62)	محددة الدرجة الثانية (83)
العنصر (62)	محددة الدرجة الثالثة (84)
الرتبة (62)	قاعدة الأقطار (84)
مصفوفة الصف (63)	مصفوفة المعاملات (86)
مصفوفة العمود (63)	قاعدة كرامر (86)
المصفوفة المربعة (63)	مصفوفة الوحدة (91)
المصفوفة الصفرية (63)	النظير الضربي للمصفوفة (91)
المصفوفات المتساوية (63)	المعادلة المصفوفية (93)
جمع مصفوفتين (69)	مصفوفة الثوابت (93)
طرح مصفوفتين (69)	مصفوفة المتغيرات (93)
ضرب المصفوفة في عدد ثابت (70)	
المحددة (83)	

اختبر مفرداتك

اختر الكلمة المناسبة من المفردات أعلاه لتكمل كل جملة فيما يأتي:

- الترتيب على هيئة مستطيل لمتغيرات أو أعداد في صفوف أفقية وأعمدة رأسية تكتب بين قوسين يسمى \_\_\_\_\_ .
- عملية ضرب جميع عناصر المصفوفة في عدد تسمى \_\_\_\_\_ .
- تسمى المصفوفة التي تحوي الثوابت في نظام المعادلات \_\_\_\_\_ .
- كل قيمة في المصفوفة تسمى \_\_\_\_\_ .
- يُسمى عدد الصفوف  $\times$  عدد الأعمدة في المصفوفة \_\_\_\_\_ المصفوفة .
- المصفوفة المربعة التي عناصر القطر الرئيس فيها العدد 1 وباقي العناصر أصفار هي \_\_\_\_\_ .
- المصفوفة التي جميع عناصرها أصفار هي \_\_\_\_\_ .
- قيمة \_\_\_\_\_ المصفوفة  $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$  تساوي -1 .
- إذا كان حاصل ضرب مصفوفتين هو مصفوفة الوحدة؛ فإن كتبتا \_\_\_\_\_ المصفوفتين تكون \_\_\_\_\_ للأخرى .

ملخص الفصل

المفاهيم الأساسية

المصفوفات (الدرس 1-2)

- المصفوفة: هي ترتيب على هيئة مستطيل لمتغيرات أو أعداد في صفوف أفقية وأعمدة رأسية بين قوسين .
- المصفوفات المتساوية لها الرتبة نفسها، وعناصرها المتناظرة متساوية .

العمليات على المصفوفات (الدرسان 2-2 و 2-3)

- يمكن جمع المصفوفات أو طرحها إذا كان لهما الرتبة نفسها. وذلك بجمع العناصر المتناظرة أو طرحها .
- لضرب مصفوفة في عدد ثابت  $k$ ، اضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة في هذا العدد .
- يمكن ضرب مصفوفتين إذا كان عدد أعمدة الأولى يساوي عدد صفوف الثانية .

المحددات وقاعدة كرامر (الدرس 2-4)

- قيمة محددة المصفوفة المربعة من الرتبة  $2 \times 2$  تساوي حاصل ضرب عنصري القطر الرئيس مطروحاً منه حاصل ضرب عنصري القطر الآخر .
- تستعمل المحددات في حل أنظمة المعادلات الخطية، وفي إيجاد مساحة مثلث عُلّمت إحداثيات رؤوسه .

النظير الضربي للمصفوفة وأنظمة المعادلات

الخطية (الدرس 2-5)

- مصفوفة الوحدة هي مصفوفة مربعة عناصر القطر الرئيس فيها العدد 1 وباقي العناصر أصفار .
- تكون كل من المصفوفتين نظيراً ضربياً للأخرى إذا كان حاصل ضربيهما يعطي مصفوفة الوحدة .
- لحل معادلة مصفوفية من الشكل  $AX = B$ ، أوجد النظير الضربي لمصفوفة المعاملات، ثم اضرب طرفي المعادلة فيه .

المطويات منظم أفكار



تأكد من أن المفاهيم الأساسية مدونة في مطويتك.



مثال 1

**متحف:** يبين الجدول الآتي عدد زوار متحف في الفترة الصباحية والفترة المسائية خلال 3 أيام:

	اليوم الأول	اليوم الثاني	اليوم الثالث
الفترة الصباحية	37	19	26
الفترة المسائية	69	58	75

- (a) اكتب مصفوفة تمثل عدد الزوار.  
 (b) ما رتبة المصفوفة؟  $2 \times 3$   
 (c) اجمع عناصر كل من الصفين 1 و 2، وفسر النتائج.  
 مجموع عناصر الصف 1 هو 82، ويمثل عدد الزوار في الفترة الصباحية للأيام الثلاثة. ومجموع عناصر الصف 2 هو 202، ويمثل عدد الزوار في الفترة المسائية للأيام الثلاثة.

(10) **ناد رياضي:** يبين الجدول الآتي عدد المشتركين شهرياً وسنوياً في ناد رياضي في 3 رياضات مختلفة:

	تخفيض الوزن	السباحة	اللياقة البدنية
اشتراك شهري	64	108	31
اشتراك سنوي	42	9	68

- (a) نظم بيانات الجدول في المصفوفة  $A$ .  
 (b) ما رتبة المصفوفة  $A$ ?  
 (c) ما قيمة العنصر  $a_{23}$ ?  
 (d) ما قيمة العنصر  $a_{11}$ ?  
 (e) اجمع عناصر كل من الصفين الأول والثاني، وفسر النتائج.

مثال 2

أوجد ناتج  $2B + 3A$  إذا كانت  $A = \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$

$$3A = 3 \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 27 & 3 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}, 2B = 2 \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 6 & 14 \end{bmatrix}$$

$$2B + 3A = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 6 & 14 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 27 & 3 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 & 11 \\ 9 & 20 \end{bmatrix}$$

أوجد الناتج في كل مما يأتي، إذا كان ذلك ممكناً:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$3 \left( \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 9 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} \right) \quad (12)$$

مثال 3

أوجد  $XY$  إذا كانت  $X = \begin{bmatrix} 0 & -6 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ ,  $Y = \begin{bmatrix} 8 \\ -1 \end{bmatrix}$

$$XY = \begin{bmatrix} 0 & -6 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 8 \\ -1 \end{bmatrix}$$

اضرب الصفوف في الأعمدة

$$= \begin{bmatrix} 0(8) + (-6)(-1) \\ 3(8) + 5(-1) \end{bmatrix}$$

بسّط

$$= \begin{bmatrix} 6 \\ 19 \end{bmatrix}$$



أوجد الناتج في كل مما يأتي، إذا كان ذلك ممكناً:

$$[3 \quad -7] \cdot \begin{bmatrix} 9 \\ -5 \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 11 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 8 & -5 \end{bmatrix} \quad (14)$$

- (15) **مشتريات** اشترى راشد 4 علب حليب، و 2 kg تفاحاً، و 3 kg بطاطس، و كيساً واحداً من الأرز، وتبين المصفوفة أدناه سعر علبة الحليب، والكيلوجرام الواحد من التفاح، والكيلوجرام الواحد من البطاطس، وكذلك سعر كيس الأرز.
- |      |       |      |      |
|------|-------|------|------|
| أرز  | بطاطس | تفاح | حليب |
| [ 15 | 10    | 3    | 25]  |

استعمل ضرب المصفوفات لإيجاد إجمالي المبلغ الذي دفعه راشد.



2-4 المحددات وقاعدة كرامر (الصفحات: 83-90)

مثال 4

أوجد قيمة:  $\begin{vmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$

تعريف محدد الدرجة الثانية  
بسّط  $\begin{vmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 4(5) - 2(-6) = 20 + 12 = 32$

مثال 5

استعمل قاعدة كرامر لحل النظام:  
 $2a + 6b = -1$  ,  $a + 8b = 2$

$b = \frac{\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{4 + 1}{16 - 6} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

قاعدة كرامر  
احسب المحددات  
بسّط  $a = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 6 \\ 2 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-8 - 12}{16 - 6} = \frac{-20}{10} = -2$

الحل هو  $(-2, \frac{1}{2})$

أوجد قيمة كل محددة فيما يأتي:

(16)  $\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 7 & -3 \end{vmatrix}$  (17)  $\begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \\ -2 & 5 & 6 \end{vmatrix}$

استعمل قاعدة كرامر لحل كل نظام معادلات فيما يأتي:

$3x - y = 0$  (18)

$5x + 2y = 22$

$5x + 2y = 4$  (19)

$3x + 4y + 2z = 6$

$7x + 3y + 4z = 29$

(20) **حرف يدوية:** صنعت شيما 3 أساور، وعقدين بتكلفة مقدارها 85 ريالاً، وصنعت ليلى سوارين و 4 عقود بتكلفة مقدارها 110 ريالاً. فإذا كان للعقود التي صنعتها كل منهما التكلفة نفسها، وكذلك الأساور. فجد تكلفة كل من العقد، والسوار.

2-5 النظرير الضربي للمصفوفة وأنظمة المعادلات الخطية (الصفحات: 91-96)

مثال 6

حل المعادلة المصفوفية:  $\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 36 \end{bmatrix}$

**الخطوة 1:** جد النظرير الضربي لمصفوفة المعاملات.

$A^{-1} = \frac{1}{-12 - (-15)} \begin{bmatrix} -6 & 5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -6 & 5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$

**الخطوة 2:** حل المعادلة المصفوفية باستعمال  $\underline{X} = \underline{A}^{-1} \underline{B}$

$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -6 & 5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 15 \\ 36 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 90 \\ 27 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 9 \end{bmatrix}$

إذن الحل هو (30, 9).

أوجد النظرير الضربي لكل مصفوفة فيما يأتي، إن وجد:

(21)  $\begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$  (22)  $\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -5 & -13 \end{bmatrix}$

(23)  $\begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -8 & 4 \end{bmatrix}$

حل المعادلة المصفوفية فيما يأتي:

(24)  $\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix}$

(25)  $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}$

(26) **مشتريات:** اشترى سعود 2 kg مكسرات و 2 kg قهوة بمبلغ 140 ريالاً. واشترى ناصر 3 kg مكسرات و كيلوجراماً قهوة بمبلغ 170 ريالاً. فما سعر الكيلوجرام الواحد من كلا النوعين؟









## الإعداد للاختبارات المعيارية

### أسئلة الإجابات الشبكية

من المحتمل أن تواجه في الاختبارات المعيارية بالإضافة إلى أسئلة الاختيار من متعدد، وأسئلة الإجابات القصيرة، وأسئلة الإجابات المطولة، أسئلة الإجابات الشبكية. ويتطلب هذا النوع من الأسئلة كتابة الإجابة في نموذج خاص، وذلك بتظليل الدوائر التي تمثل الإجابات الصحيحة.

#### استراتيجيات حل أسئلة الإجابات الشبكية

##### الخطوة 1

اقرأ المسألة بتمعن، ثم حلها.

- تأكد من أن إجابتك لها معنى.
- إذا كان الوقت كافيًا، فتحقق من إجابتك.

##### الخطوة 2

اكتب إجابتك في مربع الإجابة.

- اكتب عددًا واحدًا فقط أو رمزًا في كل مربع إجابة على نموذج الإجابة الشبكية.
- لا تكتب أي أرقام أو رموز خارج مربعات الإجابة.
- يمكن أن تكون إجابات هذه الأسئلة أعدادًا كلية، أو كسورًا عشرية، أو كسورًا اعتيادية.

##### الخطوة 3

دوّن الإجابة في نموذج الإجابة الشبكية.

- ظلّل دائرة واحدة فقط لكل مربع إجابة، وتأكد من أنك ظللت قيمة مناظرة للتي في المربع.
- ظلّل بصورة واضحة وكاملة.

#### مثال

اقرأ المسألة الآتية جيدًا، وحدّد ما تحتاج إلى معرفته، ثم استعمل المعطيات لحلها.

زوّد محمد سيارته بالوقود مرتين في أثناء سفره إلى الرياض قادمًا من مكة المكرمة. فإذا كان سعر البنزين في المحطة الأولى 1.50 ريال لكل لتر، وفي المحطة الثانية كان السعر 1.45 ريال لكل لتر، وكان مجموع ما زوّد به سيارته من البنزين 100 لتر بسعر إجمالي 147.25 ريالًا. فكم لتر بنزين زود به سيارته من كل محطة؟

			3
	/	/	.
	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	●
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

3			
	/	/	.
	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
●	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

1	/	4	
	●	/	.
	0	0	0
●	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	●	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

3	.	5	
	/	/	.
	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
●	3	3	3
4	4	4	4
5	5	●	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9



اقرأ المسألة جيداً، إذ يمكن حلُّها باستعمال نظامٍ من معادلتين.

لتكن  $x$  تمثل عدد اللترات من المحطة الأولى، و  $y$  تمثل عدد اللترات من المحطة الثانية، لذا يكتب نظام المعادلتين الذي يمثل هذه الحالة على النحو الآتي:

$$x + y = 100$$

$$1.50x + 1.45y = 147.25$$

من الممكن حل هذا النظام جبرياً، ولكن يمكن حلُّه بشكل أسرع وبطريقة أسهل باستعمال المصفوفات والحاسبة البيانية.

حل المسألة

أدخل كلاً من مصفوفة المعاملات ومصفوفة الثوابت إلى الحاسبة البيانية، ثم أوجد الحل باستعمال النظير الضربي.

		4	5
	/	/	/
	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1.50 & 1.45 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 147.25 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 45 \\ 55 \end{bmatrix}$$

إذن زوّد محمد سيارته بـ 45 لترًا من المحطة الأولى، و 55 لترًا من المحطة الثانية.

## تمارين ومسائل

اقرأ كل مسألة، وحدّد ما تحتاج إلى معرفته، ثم استعمل المعطيات لحلّها. انسخ نموذج الإجابة، واستعمله في الإجابة.

(2) أوجد محددة المصفوفة:

$$H = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 \\ -5 & -7 & -1 \\ 4 & -8 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) أوجد محددة المصفوفة  $\begin{bmatrix} -1 & 4 \\ -3 & 20 \end{bmatrix}$ .






أسئلة الاختيار من متعدد

(4) النقاط  $D(-6, 2), E(3, 5), F(8, -7)$  هي رؤوس  $\triangle DEF$ . احسب مساحة هذا المثلث:

- A 54.5 وحدة مربعة. C 60 وحدة مربعة.  
B 58 وحدة مربعة. D 61.5 وحدة مربعة.

(5) ما النظام الذي تمثل حله المنطقة المظللة في الشكل أدناه؟



- A  $4x + 2y \geq 8, 3x + 4y \leq 12, 2x - 6y < 12$   
B  $4x + 2y \geq 8, 3x + 4y \geq 12, 2x - 6y < 12$   
C  $4x + 2y \leq 8, 3x + 4y \leq 12, 2x - 6y < 12$   
D  $4x + 2y \leq 8, 3x + 4y \geq 12, 2x - 6y < 12$

(6) مارتبة المصفوفة:  $D = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 9 & 2 \\ 1 & 0 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}$  ؟

- A  $4 \times 2$  C  $4 \times 8$   
B  $2 \times 4$  D  $8 \times 4$

(7) أي من الدوال الآتية يكون مداها:  $\{f(x) | f(x) \geq 0\}$  ؟

- A  $f(x) = [x]$   
B  $f(x) = |-x + 1|$   
C  $f(x) = -|x|$   
D  $f(x) = -[x] + 1$

اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

(1) إذا كانت  $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ ,

$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

فما قيمة  $2A + 3B$  ؟

A  $\begin{bmatrix} -6 & 3 & 9 \\ 0 & 9 & 5 \end{bmatrix}$  C  $\begin{bmatrix} -5 & 15 & 30 \\ 15 & 25 & 15 \end{bmatrix}$

B  $\begin{bmatrix} -4 & 2 & 6 \\ 0 & 6 & 4 \end{bmatrix}$  D  $\begin{bmatrix} -1 & 8 & 15 \\ 9 & 12 & 7 \end{bmatrix}$

(2) أوجد ناتج:  $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix}$ , إذا كان ذلك ممكناً.

A  $[-3]$  C  $\begin{bmatrix} 8 & -4 \\ 12 & 6 \end{bmatrix}$

B  $[11]$  D الضرب غير معرف

(3) في أي من الدوال الآتية يكون  $f\left(\frac{-1}{3}\right) \neq 0$  ؟

A  $f(x) = -|3x| + 1$

B  $f(x) = [3x + 1]$

C  $f(x) = |3x| + 1$

D  $f(x) = [3x] + 1$





### أسئلة ذات إجابات قصيرة

أجب عن كل مما يأتي:

(8) هل يوجد للمصفوفة  $B$  نظير ضربي؟ فسّر إجابتك.

$$B = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -9 & 6 \end{bmatrix}$$

(9) احسب قيمة محددة المصفوفة:

$$W = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & -4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

### أسئلة ذات إجابات مطولة

أجب عن كل مما يأتي موضِّحاً خطوات الحل:

(10) يستعمل حمد شبكة إحداثيات ليصمم أرضية جديدة في فناء منزله. فإذا كانت الأرضية تمثل حل نظام المتباينات

$$y \leq 20, x \leq 16, y \geq 0, x \geq 0, y \leq -x + 32$$

وحدة على شبكة الإحداثيات تمثل قدمًا واحدة على الأرض، فما

مساحة الأرضية بالقدم المربعة؟

(11) مع عمر 14 قطعة نقدية من فئة الريال، ونصف الريال. فإذا كانت القيمة الكلية لهذه القطع النقدية هي 10.5 ريال، فاستعمل هذه المعلومات للإجابة عن كل سؤال مما يأتي:

(a) افرض أن  $d$  تمثل عدد الريالات التي يملكها عمر، و  $q$  عدد أنصاف الريالات التي يملكها. اكتب نظام معادلات يمثل هذه الحالة.

(b) اكتب معادلة مصفوفية يمكن أن تستعمل لإيجاد قيم كل من  $d$  و  $q$ .

(c) حل المعادلة المصفوفية في الفرع b باستعمال النظير الضربي. ما عدد الريالات وأنصاف الريالات التي يملكها عمر؟



(12) مثل بياناً نظام المتباينات الآتي، ثم حدد رؤوس منطقة الحل وجد القيمة العظمى للدالة المعطاة في منطقة الحل:

$$x \geq 0, y \geq 0$$

$$x + 2y \leq 14$$

$$3x + 4y \leq 36$$

$$f(x, y) = 8x + 12y$$

(13) صف بالكلمات متى يمكن ضرب مصفوفتين، ومتى لا يمكن ضربهما، وأعط مثلاً على ذلك.

هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	إذا لم تستطع حل سؤال...
2-3	1-6	2-5	1-5	2-4	2-5	1-4	2-1	1-5	2-4	1-3	2-3	2-2	فعد إلى...



# كثيرات الحدود ودوالها

## Polynomials and Polynomial Functions

### فيما سبق:

درست تمثيل الدوال التربيعية بيانياً، وحل المعادلات التربيعية.

### والآن:

- أتعرف الأعداد المركبة، وأجري العمليات عليها.
- أحل معادلات تربيعية.
- أجمع كثيرات الحدود وأطرحها وأضربها وأقسمها.
- أحل دوال كثيرات الحدود.
- أصف التمثيل البياني لدوال كثيرات الحدود.
- أجد قيم دوال كثيرات الحدود، وأحل معادلات كثيرات الحدود.
- أجد عوامل دوال كثيرات الحدود وأصغارها.
- أحدد عدد جذور معادلة كثيرة حدود وأنوعها.

### لماذا؟


مواصلات: يمكن استعمال دوال كثيرات الحدود لتحديد جداول انطلاق الحافلات، والطاقة الاستيعابية للطرق السريعة، والأنماط المرورية، ومتوسط تكاليف الوقود. وأسعار كل من السيارات الجديدة والمستعملة.

### منظم أفكار

## المستويات

كثيرات الحدود ودوالها: اعمل المطوية لتساعدك على تنظيم ملاحظاتك حول كثيرات الحدود ودوالها، ابدأ بورقة A4.

- 1 اثن الورقة بعرض 5cm بصورة موازية للضلع الأطول.
- 2 اثن الورقة بصورة موازية للضلع الأقصر إلى أربعة أقسام متساوية العرض.
- 3 ثبت الحافتين الطرفيتين للشئيه كما يظهر في الشكل أدناه.
- 4 عنون الأقسام الأربعة بالعناوين: الأعداد المركبة، كثيرات الحدود، دوال كثيرات الحدود، معادلات كثيرات الحدود.







## التهيئة للفصل 3

تشخيص الاستعداد:

أجب عن الاختبار الآتي، وارجع إلى "المراجعة السريعة"؛ لمساعدتك على ذلك.

### مراجعة سريعة

#### مثال 1

أعد كتابة العبارة  $2xy - 3 - z$  على صورة جمع.

العبارة الأصلية	$2xy - 3 - z$
أعد الكتابة باستعمال الجمع	$= 2xy + (-3) + (-z)$

#### مثال 2

استعمل خاصية التوزيع لإعادة كتابة العبارة الآتية دون أقواس:

	$-3(a + b - c)$
العبارة الأصلية	$-3(a + b - c)$
خاصية التوزيع	$= -3(a) + (-3)(b) + (-3)(-c)$
بسط	$= -3a - 3b + 3c$

#### مثال 3

حل المعادلة:  $x^2 - 6x + 12 = 19$ .

يمكن استعمال طريقة إكمال المربع.

المعادلة الأصلية	$x^2 - 6x + 12 = 19$
اطرح 12 من كلا الطرفين	$x^2 - 6x = 7$
أضف 9 لكلا الطرفين	$x^2 - 6x + 9 = 7 + 9$
حلل $x^2 - 6x + 9$	$(x - 3)^2 = 16$
أوجد الجذر التربيعي لكلا الطرفين	$x - 3 = \pm 4$
أضف 3 لكلا الطرفين	$x = 3 \pm 4$
	الحلان هما: $-1, 7$

### اختبار سريع

أعد كتابة كل من العبارات الآتية في صورة جمع: (يستعمل مع الدرس 3-4)

- (1)  $-5 - 13$   
 (2)  $5 - 3y$   
 (3)  $5mr - 7mp$   
 (4)  $3x^2y - 14xy^2$   
 (5) **محاضرات:** حضر 20 شخصًا محاضرة، ثم غادروا القاعة في مجموعات ثنائية، فغادرت منهم  $x$  مجموعة. اكتب عدد الأشخاص الباقين على صورة جمع.

استعمل خاصية التوزيع لإعادة كتابة كل عبارة فيما يأتي دون أقواس: (يستعمل مع الدرس 3-4)

- (6)  $-4(a + 5)$   
 (7)  $-1(3b^2 + 2b - 1)$   
 (8)  $-\frac{1}{2}(2m - 5)$   
 (9)  $-\frac{3}{4}(3z + 5)$   
 (10) **هدايا:** وزع معلم قلمًا وحقيبة على كل طالب في صفٍ يضم 15 طالبًا. إذا كان ثمن القلم 8 ريالًا، والحقيبة 18 ريالًا، فاكتب عبارة تمثل ثمن الأقلام والحقائب. استعمل خاصية التوزيع لحساب الثمن.

حل كل معادلة فيما يأتي: (يستعمل مع الدرس 3-7)

- (11)  $x^2 + 2x - 8 = 0$   
 (12)  $x^2 - 5x + 6 = 0$   
 (13)  $x^2 - x - 20 = 0$   
 (14)  $x^2 - x = 0$   
 (15) **فيزياء:** إذا سقط جسم من ارتفاع 50ft عن سطح الأرض فإن ارتفاعه عن سطحها بعد  $t$  ثانية يعبر عنه بالصيغة  $h = -16t^2 + 50$ . استعمل المعادلة  $0 = -16t^2 + 50$  لحساب الزمن الذي يستغرقه الجسم حتى يصل إلى الأرض.






## الأعداد المركبة Complex Numbers

### لماذا؟

بالنظر إلى الشكل المجاور، تلاحظ أن التمثيل البياني للمعادلة  $y = x^2 + 2x + 4$  لا يقطع المحور  $x$ ، لذا ليس للمعادلة جذور حقيقية، فهل يعني ذلك أنه ليس للمعادلة حلول؟



$[-6, 10]$  scl: 0.5 by  $[-2, 10]$  scl: 0.5

للتأكد من ذلك استعمل الآلة الحاسبة بالضغط على مفتاح **on**، ومنها اختر **1** مستند جديد ثم اختر **1** إضافة تطبيق الحاسبة ثم اضغط **menu** واختر منها

3: العمليات الجبرية 3: اوقات كثرات الحدود 3: الجذور الحقيقية لكثيرات الحدود



ثم أدخل  $x^2 + 2x + 4$  واضغط **enter** **enter** فيظهر على الشاشة كلمة خطأ، وهذا يعني أنه لا توجد حلول حقيقية للمعادلة، ولكن هناك حلول تخيلية.

### فيما سبق:

درست تبسيط الجذور التربيعية.  
(مهارة سابقة)

### والآن:

- أجري العمليات على الأعداد التخيلية البحتة.
- أجري العمليات على الأعداد المركبة.

### المفردات

الوحدة التخيلية

imaginary unit

العدد التخيلي البحت

pure imaginary number

العدد المركب

complex number

المركبان المترافقان

complex conjugates

**الأعداد التخيلية البحتة:** قادت المعادلات "كالمعادلة السابقة" الرياضيين إلى تعريف الأعداد التخيلية، ووحدتها التخيلية  $i$ ، حيث تعرف **الوحدة التخيلية  $i$**  على أنها الجذر التربيعي الموجب للعدد  $-1$ ، وبعبارة أخرى فإن  $i = \sqrt{-1}$ ، وهذا يعني أن  $i^2 = -1$  والأعداد في الصورة  $i\sqrt{3}$ ،  $-2i$ ،  $6i$ ، تسمى **أعداداً تخيلية بحتة**، وهي جذور تربيعية لأعداد حقيقية سالبة. لأي عدد حقيقي موجب مثل  $b$ ، فإن:  $\sqrt{-b^2} = \sqrt{b^2} \cdot \sqrt{-1} = bi$ .

### الجذور التربيعية للأعداد السالبة

### مثال 1

بسّط كلاً مما يأتي:

$$\begin{aligned} \sqrt{-27} & \text{ (a)} \\ \sqrt{-27} & = \sqrt{-1 \cdot 3^2 \cdot 3} \\ & = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{3} \\ & = i \cdot 3 \cdot \sqrt{3} \\ & = 3i\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{-216} & \text{ (b)} \\ \sqrt{-216} & = \sqrt{-1 \cdot 6^2 \cdot 6} \\ & = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{6^2} \cdot \sqrt{6} \\ & = i \cdot 6 \cdot \sqrt{6} \\ & = 6i\sqrt{6} \end{aligned}$$

تحقق من فهمك

$$\sqrt{-125} \text{ (1B)} \quad \sqrt{-18} \text{ (1A)}$$

تُحقق الأعداد التخيلية البحتة كلاً من الخاصيتين (التجميعية والتبديلية) على الضرب، ويبين الجدول الآتي بعض قوى الوحدة التخيلية  $i$ :



$i^1 = i$	$i^2 = -1$	$i^3 = i^2 \cdot i = -i$	$i^4 = (i^2)^2 = 1$
$i^5 = (i^2)^2 \cdot i = i$	$i^6 = (i^2)^3 = -1$	$i^7 = (i^2)^3 \cdot i = -i$	$i^8 = (i^2)^4 = 1$



## مثال 2

### ضرب الأعداد التخيلية البحتة

أوجد ناتج كل مما يأتي :

$$(a) -5i \cdot 3i$$

$$\begin{aligned} -5i \cdot 3i &= -15i^2 \\ &= -15(-1) \\ &= 15 \end{aligned}$$

اضرب  
 $i^2 = -1$   
بسّط

$$(b) \sqrt{-6} \cdot \sqrt{-15}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{-6} \cdot \sqrt{-15} &= i\sqrt{6} \cdot i\sqrt{15} \\ &= i^2\sqrt{90} \\ &= -1 \cdot \sqrt{9} \cdot \sqrt{10} \\ &= -3\sqrt{10} \end{aligned}$$

$i = \sqrt{-1}$   
اضرب  
بسّط  
اضرب

تحقق من فهمك



$$i^{31} \quad (2C)$$

$$\sqrt{-20} \cdot \sqrt{-12} \quad (2B)$$

$$3i \cdot 4i \quad (2A)$$

يمكنك حل بعض المعادلات التربيعية باستعمال خصائص الجذر التربيعي.

### إرشادات للدراسة

#### خصائص الجذر التربيعي

راجع خصائص الجذر التربيعي التي درستها في الصف الثالث المتوسط.

## مثال 3

### معادلة حولها أعداد تخيلية بحتة

حل المعادلة :  $4x^2 + 256 = 0$

$$4x^2 + 256 = 0 \quad \text{المعادلة الأصلية}$$

$$4x^2 = -256$$

اطرح 256 من كلا الطرفين

$$x^2 = -64$$

اقسم كلا الطرفين على 4

$$x = \pm\sqrt{-64}$$

خاصية الجذر التربيعي

$$x = \pm 8i$$

$$\sqrt{-64} = \sqrt{64} \cdot \sqrt{-1} = 8i$$

تحقق من فهمك



$$x^2 + 4 = 0 \quad (3B)$$

$$4x^2 + 100 = 0 \quad (3A)$$

**العمليات على الأعداد المركبة :** تتكون العبارة  $2+3i$  من حدين غير متشابهين ولا يمكن جمعها، وهما العدد الحقيقي 2 والعدد التخيلي  $3i$ ، ويسمى هذا النوع من العبارات **العدد المركب**.

أضف إلى

مطويتك

### الأعداد المركبة (C)

### مفهوم أساسي

التعبير اللفظي: العدد المركب هو أي عدد يمكن كتابته على الصورة  $a + bi$  حيث  $a$  و  $b$  عددين حقيقيين، و  $i$  الوحدة التخيلية، ويسمى  $a$  الجزء الحقيقي، و  $b$  الجزء التخيلي.

وزارة التعليم  
Ministry of Education

$$1 - 3i = 1 + (-3)i$$

$$5 + 2i$$

مثالان:

2021 - 1443



يوضح شكل فن المجاور مجموعة الأعداد المركبة .

الأعداد المركبة $(a + bi)$	الأعداد الحقيقية $b = 0$
الأعداد التخيلية $b \neq 0$	الأعداد الحقيقية $b = 0$
الأعداد التخيلية البحتة $a = 0$	

- إذا كانت  $b = 0$  فإن العدد المركب يكون عددًا حقيقيًا.
- إذا كانت  $b \neq 0$  فإن العدد المركب يكون عددًا تخيليًا.
- إذا كانت  $a = 0, b \neq 0$  فإن العدد المركب يكون عددًا تخيليًا بحتًا.

يتساوى عدداً مركبان إذا فقط إذا تساوى الجزأين الحقيقيين، والجزأين التخيليين؛ أي أن:  
 $a + bi = c + di$  إذا فقط إذا كان  $a = c, b = d$ .

#### مثال 4 تساوي الأعداد المركبة

أوجد قيمتي  $x, y$  الحقيقيتين اللتين تجعلان المعادلة:  $3x - 5 + (y - 3)i = 7 + 6i$  صحيحة.  
 ساو الجزأين الحقيقيين أحدهما بالآخر، وكذلك الجزآن التخيليان.

الجزآن الحقيقيان	$3x - 5 = 7$	الجزآن التخيليان	$y - 3 = 6$
اجمع 5 لكلا الطرفين	$3x = 12$	اجمع 3 لكلا الطرفين.	$y = 9$
اقسم كلا الطرفين على 3	$x = 4$		

تحقق من فهمك

4) أوجد قيمتي  $x, y$  الحقيقيتين اللتين تجعلان المعادلة:  $5x + 1 + (3 + 2y)i = 2x - 2 + (y - 6)i$  صحيحة.

ويمكنك استعمال كل من الخاصية التبديلية والخاصية التجميعية وخاصية التوزيع عند جمع الأعداد المركبة وضربها، ولكي تجمع أو تطرح أعداداً مركبة، جمع الأجزاء المتشابهة؛ أي جمع الأجزاء الحقيقية معاً وجمع الأجزاء التخيلية معاً.

#### مثال 5 جمع الأعداد المركبة وطرحها

أوجد ناتج كل مما يأتي :

(a)  $(5 - 7i) + (2 + 4i)$

خواص التبديل والتجميع والتوزيع  
 بسط  $(5 - 7i) + (2 + 4i) = (5 + 2) + (-7 + 4)i$   
 $= 7 - 3i$

(b)  $(4 - 8i) - (3 - 6i)$

خواص التبديل والتجميع والتوزيع  
 بسط  $(4 - 8i) - (3 - 6i) = (4 - 3) + [-8 - (-6)]i$   
 $= 1 - 2i$

تحقق من فهمك

(5B)  $(4 + 6i) - (-1 + 2i)$

(5A)  $(-2 + 5i) + (1 - 7i)$

إرشادات للدراسة

المعاوقة :

في الأعداد المركبة تستعمل كلمة المعاوقة بدلاً من المقاومة.

تستعمل الأعداد المركبة في مسائل الكهرباء، ففي الدوائر الكهربائية ذات التيار المتناوب يمكنك تمثيل فرق الجهد، وشدة التيار، والمعاوقة بأعداد مركبة، ولضرب هذه الأعداد تستعمل طريقة التوزيع بالترتيب  
 وزارة التعليم  
 Ministry of Education  
 2021 - 1443



## مثال 6 من واقع الحياة

### ضرب الأعداد المركبة


**كهرباء:** يرتبط فرق الجهد  $V$ ، وشدة التيار  $C$ ، والمعاوقة  $I$  في الدوائر الكهربائية ذات التيار المتناوب بالصيغة  $V = C \cdot I$ . أوجد فرق الجهد في دائرة كهربائية ذات تيار متردد إذا كانت شدة تيارها  $2 + 4i$  أمبير، ومعاوقتها  $9 - 3i$  أوم.

$$\begin{aligned}
 & \text{الصيغة الرياضية} & V &= C \cdot I \\
 & & &= (2 + 4i) \cdot (9 - 3i) \\
 & \text{باستخدام طريقة التوزيع بالترتيب} & &= 2(9) + 2(-3i) + 4i(9) + 4i(-3i) \\
 & \text{اضرب} & &= 18 - 6i + 36i - 12i^2 \\
 & & &= 18 + 30i - 12(-1) \\
 & \text{اجمع} & &= 30 + 30i \\
 & & & \text{وعليه فإن فرق الجهد هو } 30 + 30i \text{ فولت.}
 \end{aligned}$$

تحقق من فهمك

(6) **كهرباء:** أوجد فرق الجهد لتيار متناوب شدته  $2 - 4i$  أمبير، ومعاوقته  $3 - 2i$  أوم.

يسمى العددان المركبان  $a - bi$ ،  $a + bi$  **مركبين مترافقين**، وناتج ضربهما هو عدد حقيقي دائماً على الصورة  $a^2 + b^2$ . ويمكنك استعمال هذه الحقيقة لإيجاد ناتج قسمة عددين مركبين.



### الربط مع الحياة

مصابيح الزينة من الأمثلة على الدوائر الكهربائية الموصولة على التوالي، ويؤثر عدد المصابيح فيها في شدة التيار، فينعكس هذا على شدة الإضاءة.

المصدر: كتاب الفيزياء المقرر للصف الثالث الثانوي، 1437 هـ.

## مثال 7

### قسمة الأعداد المركبة

أوجد ناتج كل مما يأتي:

$$\begin{aligned}
 & \text{(a)} & \frac{2i}{3 + 6i} &= \frac{2i}{3 + 6i} \cdot \frac{3 - 6i}{3 - 6i} \\
 & & &= \frac{6i - 12i^2}{9 - 36i^2} \\
 & \text{اضرب} & &= \frac{6i - 12(-1)}{9 - 36(-1)} \\
 & & &= \frac{6i + 12}{45} \\
 & \text{بسط} & &= \frac{4}{15} + \frac{2}{15}i \\
 & \text{اكتب الناتج على الصورة } a + bi & & \\
 & \text{(b)} & \frac{4 + i}{5i} &= \frac{4 + i}{5i} \cdot \frac{i}{i} \\
 & \text{اضرب في } \frac{i}{i} & &= \frac{4i + i^2}{5i^2} \\
 & \text{اضرب} & &= \frac{4i - 1}{-5} \\
 & & &= \frac{1}{5} - \frac{4}{5}i \\
 & \text{اكتب الناتج على الصورة } a + bi & &
 \end{aligned}$$

تحقق من فهمك

$$\frac{2+i}{1-i} \quad (7B)$$

$$\frac{-2i}{3+5i} \quad (7A)$$

### إرشادات للدراسة

**قراءة الرياضيات**  
يمكنك حل الفرع  $b$  من المثال 7 بضرب كل من البسط والمقام في العدد  $-5i$ ، ولكن للاختصار تم الضرب في العدد  $i$  فقط.





أوجد ناتج كل مما يأتي:

- المثالان 1, 2
- (1)  $\sqrt{-81}$  (2)  $\sqrt{-32}$
- (3)  $(4i)(-3i)$  (4)  $3\sqrt{-24} \cdot 2\sqrt{-18}$
- (5)  $i^{40}$  (6)  $i^{63}$

حل كل معادلة مما يأتي:

مثال 3

(7)  $4x^2 + 32 = 0$  (8)  $2x^2 + 24 = 0$

في كل معادلة مما يأتي أوجد قيمتي  $a, b$  الحقيقيتين اللتين تجعلانها صحيحة:

مثال 4

(9)  $3a + (4b + 2)i = 9 - 6i$  (10)  $4b - 5 + (-a - 3)i = 7 - 8i$

بسّط كلًا مما يأتي:

- الأمثلة 5, 6, 7
- (11)  $(-1 + 5i) + (-2 - 3i)$  (12)  $(7 + 4i) - (1 + 2i)$
- (13)  $(6 - 8i)(9 + 2i)$  (14)  $(3 + 2i)(-2 + 4i)$
- (15)  $\frac{3 - i}{4 + 2i}$  (16)  $\frac{2 + i}{5 + 6i}$

(17) **كهرباء:** تبلغ شدة التيار في أحد أجزاء دائرة كهربائية موصولة على التوالي  $5 - 3i$  أمبير، وفي الجزء الآخر من الدائرة  $7 + 9i$  أمبير. اجمع هذين العددين المركبين لإيجاد شدة التيار الكلية في الدائرة.

### تدرب وحل المسائل

أوجد ناتج كل مما يأتي:

- المثالان 1, 2
- (18)  $\sqrt{-121}$  (19)  $\sqrt{-169}$
- (20)  $\sqrt{-100}$  (21)  $\sqrt{-81}$
- (22)  $(-3i)(-7i)(2i)$  (23)  $4i(-6i)^2$
- (24)  $i^{11}$  (25)  $i^{25}$
- (26)  $\sqrt{-10} \cdot \sqrt{-24}$  (27)  $4i\left(\frac{1}{2}i\right)^2(-2i)^2$

حل كل معادلة مما يأتي:

مثال 3

(28)  $4x^2 + 4 = 0$  (29)  $3x^2 + 48 = 0$

(30)  $2x^2 + 10 = 0$  (31)  $6x^2 + 108 = 0$

في كل معادلة مما يأتي أوجد قيمتي  $x, y$  الحقيقيتين اللتين تجعلانها صحيحة:

مثال 4

(32)  $x + 1 + 2yi = 3 - 6i$  (33)  $2x + 7 + (3 - y)i = -4 + 6i$

(34)  $5 + y + (3x - 7)i = 9 - 3i$

(35)  $(2x - 4y)i + x + 5y = 15 + 58i$



أوجد ناتج كل مما يأتي:

(37)  $(11 - 8i) - (2 - 8i)$

(36)  $(-3 + i) + (-4 - i)$

الأمثلة 5, 6, 7

(39)  $(3 + 5i)(5 - 3i)$

(38)  $(1 + 2i)(1 - 2i)$

(41)  $\frac{2i}{1+i}$

(40)  $(4 - i)(6 - 6i)$

(43)  $\frac{5+i}{3i}$

(42)  $\frac{5}{2+4i}$

(45)  $(8 - 5i) - (7 + i)$

(44)  $(4 - 6i) + (4 + 6i)$

(47)  $(1 + i)(2 + 3i)(4 - 3i)$

(46)  $(-6 - i)(3 - 3i)$

(49)  $\frac{2 - i\sqrt{3}}{2 + i\sqrt{3}}$

(48)  $\frac{4 - i\sqrt{2}}{4 + i\sqrt{2}}$

(50) **كهرباء:** تبلغ المعاوقة في أحد أجزاء دائرة كهربائية  $7 + 8i$  أوم، وفي الجزء الآخر منها  $4i - 13$  أوم. اجمع هذين العددين المركبين لإيجاد المعاوقة الكلية في الدائرة الكهربائية.

**كهرباء:** استعمل الصيغة  $V = C \cdot I$ ، حيث  $V$  فرق الجهد، و  $C$  شدة التيار، و  $I$  المعاوقة في حل السؤالين 51, 52:

(51) إذا كانت شدة التيار في دائرة كهربائية  $3 + 6i$  أمبير، والمعاوقة  $5 - i$  أوم، فكم يكون فرق الجهد؟

(52) إذا كان فرق الجهد في دائرة كهربائية  $20 - 12i$  فولت، والمعاوقة  $4i - 6$  أوم، فكم تكون شدة التيار؟

(53) أوجد ناتج جمع  $ix^2 - (4 + 5i)x + 7$  إلى  $3x^2 + (2 + 6i)x - 8i$ .

(54) بسّط العبارة:  $[(2 + i)x^2 - ix + 5 + i] - [(-3 + 4i)x^2 + (5 - 5i)x - 6]$

(55) **تمثيلات متعددة:** ستكتشف في هذه المسألة جمع الأعداد المركبة في المستوى المركب. فالمستوى المركب يشبه إلى حد بعيد المستوى الحقيقي، وفيه تكون الأعداد الحقيقية على المحور الأفقي والأعداد التخيلية البحتة على المحور الرأسي.

(a) **بيانياً:** مثل العدد  $3 + 4i$  بيانياً في المستوى المركب، وذلك برسم قطعة مستقيمة من نقطة الأصل إلى النقطة  $(3, 4)$ ، وسمّ تلك النقطة  $A$ .

(b) **بيانياً:** مثل العدد  $-2 - 5i$  بيانياً في المستوى المركب وذلك برسم قطعة مستقيمة من نقطة الأصل إلى النقطة  $(-2, -5)$ ، وسمّها  $B$ .

(c) **بيانياً:** إذا كانت النقطتان  $A, B$  ونقطة الأصل ثلاثة رؤوس لمتوازي أضلاع فأكمل رسمه بإضافة النقطة الرابعة  $C$ .



(d) **تحليلياً:** ما العدد المركب الذي تمثله النقطة  $C$ ؟ وما العلاقة بين النقاط  $A, B, C$ ؟



الربط مع الحياة

الكهرباء هي عدد من التأثيرات الفيزيائية تشمل مجموعة متنوعة من الظواهر الناتجة عن وجود شحنة كهربائية وتدفقها. وتضم هذه الظواهر: البرق، والكهرباء الساكنة، والمجال والحث الكهرومغناطيسيين.



## مسائل مهارات التفكير العليا

(56) **اكتشف الخطأ:** قامت كلٌّ من صفاء ومنال بتبسيط  $(2i)(3i)(4i)$ ، فأَيُّ منهما على صواب؟ وضح إجابتك.

منال	صفاء
$24i^3 = -24$	$24i^3 = -24i$

(57) **تحذّر:** بسّط العدد المركب  $(1 + 2i)^3$ .

(58) **تبرير:** حدد إذا كانت الجملة الآتية صحيحة دائماً، أو صحيحة أحياناً، أو غير صحيحة أبداً. وضح إجابتك:

"يتكون كل عدد مركب من جزء حقيقي وجزء تخيلي"

(59) **مسألة مفتوحة:** اكتب عددين مركبين يكون ناتج ضربهما يساوي 20.

(60) **اكتب:** وضح كيف ترتبط الأعداد المركبة بالمعادلات التربيعية، وكيف تحدد إذا كان للمعادلة التربيعية حلول مركبة فقط أم لا؟

## تدريب على اختبار

حلول كتبي

(62) قيمة  $(3 + 6i)^2$  تساوي:

- (A)  $36 - 27i$   
 (B)  $9 + 36$   
 (C)  $9 - 36$   
 (D)  $-27 + 36i$

(61) ما قيمتا  $x, y$  الحقيقيتان اللتان تجعلان

$$(5 + 4i) - (x + yi) = (-1 - 3i) \text{ صحيحة؟}$$

- (A)  $x = 6, y = 7$   
 (B)  $x = 4, y = i$   
 (C)  $x = 4, y = i$   
 (D)  $x = 4, y = 7$

## مراجعة تراكمية

حلّ كل معادلة مما يأتي مستعملاً التحليل إلى العوامل: (مهارة سابقة)

$$6x^2 = 5x + 4 \quad (65)$$

$$4x^2 - 12 = 22x \quad (64)$$

$$2x^2 + 7x = 15 \quad (63)$$

**نظرية الأعداد:** استعمل معادلة تربيعية لإيجاد عددين حقيقيين يحققان كلاً ممّا يأتي، (إذا كان ذلك ممكناً): (مهارة سابقة)

(66) مجموعهما  $-3$ ، وناتج ضربهما  $-40$ .

(67) مجموعهما  $-21$ ، وناتج ضربهما  $108$ .

هل تمثل كلٌّ من ثلاثيات الحدود الآتية مربعاً كاملاً أم لا؟ (مهارة سابقة)

$$x^2 - 12x + 36 \quad (69)$$

$$x^2 + 16x + 64 \quad (68)$$

$$x^2 + 5x + 6.25 \quad (71)$$

$$x^2 + 8x - 16 \quad (70)$$

114 الفصل 3 كثيرات الحدود ودوالها







## القانون العام والمميز The Quadratic Formula and the Discriminant

### لماذا؟

أطلق سهم نحو هدف على الأرض، ويمكن التعبير عن ارتفاعه عن الأرض بالدالة التربيعية:

$$h = -4.9t^2 + 117t + 42$$

حيث  $h$  ارتفاع السهم بعد  $t$  ثانية من إطلاقه، وللتنبؤ بالزمن اللازم لوصول السهم إلى الهدف، نحل المعادلة:

$$-4.9t^2 + 117t + 42 = 0$$

ومن الصعب حل هذه المعادلة باستعمال التحليل إلى العوامل، أو التمثيل البياني، أو إكمال المربع.



### فيما سبق:

درست حل معادلات تربيعية بإكمال المربع. (مهارة سابقة)

### والآن:

- أحل معادلات تربيعية باستعمال القانون العام.
- أستعمل المميز لأحدد عدد جذور معادلة تربيعية وأنواعها.

### المفردات

القانون العام

Quadratic Formula

المميز

discriminant

**القانون العام:** تمكنت سابقاً من حل بعض المعادلات التربيعية بالتمثيل البياني، أو بالتحليل إلى العوامل، أو باستعمال خاصية الجذر التربيعي، أو بإكمال المربع، أو باستعمال القانون العام؛ وهو قانون يمكن استعماله لحل أية معادلة تربيعية، ويمكن اشتقاق هذا القانون من خلال حل معادلة تربيعية على الصورة القياسية.

مثال

$$2x^2 + 8x + 1 = 0$$

$$x^2 + 4x + \frac{1}{2} = 0$$

$$x^2 + 4x = -\frac{1}{2}$$

$$x^2 + 4x + \left(\frac{4}{2}\right)^2 = -\frac{1}{2} + \left(\frac{4}{2}\right)^2$$

$$(x + 2)^2 = -\frac{1}{2} + \left(\frac{4}{2}\right)^2$$

$$(x + 2)^2 = \frac{7}{2}$$

$$x + 2 = \pm\sqrt{\frac{7}{2}}$$

$$x = -2 \pm \sqrt{\frac{7}{2}}$$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{14}}{2}$$

الحالة العامة

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

معادلة تربيعية على الصورة القياسية

اقسم كلا الطرفين على  $a$

اطرح  $\frac{c}{a}$  من كلا الطرفين

أكمل المربع

حل الطرف الأيسر

بسّط الطرف الأيمن

خاصية الجذر التربيعي

اطرح  $\frac{b}{2a}$  من كلا الطرفين

بسّط

تعرف المعادلة:  $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$  **بالقانون العام** لحل المعادلات التربيعية.



القانون العام

على الرغم من أن طريقة التحليل إلى العوامل قد تكون الأسهل لحل بعض المعادلات التربيعية، إلا أن القانون العام يحل أي معادلة تربيعية.

مفهوم أساسي

القانون العام لحل المعادلة التربيعية

أضف إلى

مطويتك

التعبير اللفظي: يمكن حل المعادلة التربيعية المكتوبة على الصورة:  $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$  باستعمال القانون:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

مثال:  $x^2 + 5x + 6 = 0 \rightarrow x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4(1)(6)}}{2(1)}$

مثال 1

معادلة لها جذران نسبيين

حل المعادلة:  $x^2 - 10x = 11$  باستعمال القانون العام.

أولاً اكتب المعادلة على الصورة  $ax^2 + bx + c = 0$ ، وحدد قيم كل من  $a, b, c$ .

$$ax^2 + bx + c = 0$$

↓ ↓ ↓

$$x^2 - 10x = 11 \rightarrow 1x^2 - 10x - 11 = 0$$

ثم عوض بعد ذلك بتلك القيم في القانون العام.

$$\begin{aligned} x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ &= \frac{-(-10) \pm \sqrt{(-10)^2 - 4(1)(-11)}}{2(1)} \\ &= \frac{10 \pm \sqrt{100 + 44}}{2} \\ &= \frac{10 \pm \sqrt{144}}{2} \end{aligned}$$

$$\sqrt{144} = 12 \quad = \frac{10 \pm 12}{2}$$

$$x = \frac{10 - 12}{2} \quad \text{أو} \quad x = \frac{10 + 12}{2}$$

$$\text{بسط} \quad = -1 \quad = 11$$

وعليه يكون الحلان هما: 11، -1.

**تحقق:** عوض كلتا القيمتين في المعادلة الأصلية.

$x^2 - 10x = 11$	$x^2 - 10x = 11$
$(11)^2 - 10(11) \stackrel{?}{=} 11$	$(-1)^2 - 10(-1) \stackrel{?}{=} 11$
$121 - 110 \stackrel{?}{=} 11$	$1 + 10 \stackrel{?}{=} 11$
$\checkmark \quad 11 = 11$	$\checkmark \quad 11 = 11$

تحقق من فهمك

(1B)  $2x^2 + 25x + 33 = 0$

(1A)  $x^2 + 6x = 16$

عندما يكون ما تحت الجذر في القانون العام صفرًا، فإننا نحصل على جذر نسبي واحد، ويكون حل المعادلة في  $x = 0$ . هذه الحالة هو هذا الجذر النسبي، ولكنه مكرر مرتين.





### تاريخ الرياضيات

#### براهام جوبتا

(598-668 م) عالم رياضيات هندي، وهو أول من أوجد حلاً عاماً للمعادلة التربيعية في الصورة  $ax^2 + bx = c$ ، وهو ما يُسمى الآن القانون العام لحل المعادلة التربيعية.

## مثال 2

### معادلة لها جذر نسبي واحد (مكرر مرتين)

حلّ المعادلة:  $x^2 + 8x + 16 = 0$  باستعمال القانون العام .  
حدّد قيم كل من  $a, b, c$ ، وعوّض هذه القيم في القانون العام .

$$\text{القانون العام} \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$


$$\text{عوض عن } a \text{ بالعدد } 1, \text{ وعن } b \text{ بالعدد } 8, \text{ وعن } c \text{ بالعدد } 16 = \frac{-(8) \pm \sqrt{(8)^2 - 4(1)(16)}}{2(1)}$$

$$\text{بسّط} = \frac{-8 \pm \sqrt{0}}{2}$$

$$\sqrt{0} = 0 = \frac{-8}{2} = -4$$

الحل هو  $-4$  (مكرر مرتين).

**تحقق:** تحقق من صحة الحل بتمثيل الدالة المرتبطة بالمعادلة  $y = x^2 + 8x + 16$  بيانياً. مستعملاً خاصية الصفر في الحاسبة البيانية للحصول على قيمة صفر الدالة المرتبطة وهو:  $x = -4$



$[-10, 10]$  scl: 1 by  $[-6.67, 6.67]$  scl: 1

تحقق من فهمك

$$x^2 + 34x + 289 = 0 \quad (2B)$$

$$x^2 - 16x + 64 = 0 \quad (2A)$$

يمكنك التعبير عن الجذور غير النسبية بكتابتها في الصورة الجذرية .

## مثال 3

### الجذور غير النسبية

حلّ المعادلة:  $2x^2 + 6x - 7 = 0$  باستعمال القانون العام.

$$\text{القانون العام} \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$


$$\text{عوض عن } a \text{ بالعدد } 2, \text{ وعن } b \text{ بالعدد } 6, \text{ وعن } c \text{ بالعدد } -7 = \frac{-6 \pm \sqrt{(6)^2 - 4(2)(-7)}}{2(2)}$$

$$\text{بسّط} = \frac{-6 \pm \sqrt{92}}{4}$$

$$\sqrt{92} = \sqrt{4(23)} = 2\sqrt{23} = \frac{-6 \pm 2\sqrt{23}}{4} = \frac{-3 \pm \sqrt{23}}{2}$$

الحلّان التقريبيّان هما:  $0.9, -3.9$

**تحقق:** تحقق من صحة الحل بتمثيل الدالة المرتبطة بالمعادلة  $y = 2x^2 + 6x - 7$  بيانياً. مستعملاً خاصية الصفر في الحاسبة البيانية للحصول على القيمتين التقريبيتين لصفرَي الدالة المرتبطة وهما:  $-3.9, 0.9$



$[-10, 10]$  scl: 1 by  $[-15, 7]$  scl: 1

تحقق من فهمك

$$x^2 - 8x + 9 = 0 \quad (3B)$$

$$3x^2 + 5x + 1 = 0 \quad (3A)$$

### إرشادات للدراسة

#### إظهار كامل التمثيل البياني:

لإظهار التمثيل البياني للدالة كاملاً على الشاشة. اضغط مفتاح **menu** ومنها اختر: **4: تكبير/تصغير النافذة** ثم اختر **1: إعدادات النافذة** لتحديد التدرج المناسب للمتغير  $x$  فاختر مثلاً

الذمة الصغرى: 7  
والذمة العظمى: 7



الأعداد المركبة

تذكر أن تكتب حلك في الصورة  $a + bi$ ، وهذه الصورة تُسمى الصورة القياسية للعدد المركب.

مثال 4

الجذور المركبة

حلّ المعادلة:  $x^2 - 6x = -10$  باستعمال القانون العام.

$$\text{القانون العام} \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$


$$\text{عوض عن } a \text{ بالعدد } 1 \text{، وعن } b \text{ بالعدد } -6 \text{، وعن } c \text{ بالعدد } 10 \quad = \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4(1)(10)}}{2(1)}$$

$$\text{بسّط} \quad = \frac{6 \pm \sqrt{-4}}{2}$$

$$\sqrt{-4} = \sqrt{4 \cdot (-1)} = 2i \quad = \frac{6 \pm 2i}{2}$$

$$\text{بسّط} \quad = 3 \pm i$$

الحلّان هما:  $3 + i$ ،  $3 - i$  وهما عددان مركبان مترافقان.



**تحقق:** يظهر التمثيل البياني للدالة المرتبطة بالمعادلة أن الحلين عددان مركبان، ولكن لا يساعدك التمثيل البياني على إيجادهما. وللتحقق من صحة الحلين المركبين، عوضهما في المعادلة الأصلية.

المعادلة الأصلية

$$x = 3 + i$$

أوجد مفكوك  $(3 + i)^2$  وخاصية التوزيع

بسّط

$$i^2 = -1$$

المعادلة الأصلية

$$x = 3 - i$$

أوجد مفكوك  $(3 - i)^2$  وخاصية التوزيع

بسّط.

$$i^2 = -1$$

$$x^2 - 6x = -10$$

$$(3 + i)^2 - 6(3 + i) \stackrel{?}{=} -10$$

$$9 + 6i + i^2 - 18 - 6i \stackrel{?}{=} -10$$

$$-9 + i^2 \stackrel{?}{=} -10$$

$$\checkmark -9 - 1 = -10$$

$$x^2 - 6x = -10$$

$$(3 - i)^2 - 6(3 - i) \stackrel{?}{=} -10$$

$$9 - 6i + i^2 - 18 + 6i \stackrel{?}{=} -10$$

$$-9 + i^2 \stackrel{?}{=} -10$$

$$\checkmark -9 - 1 = -10$$

تحقق من فهمك

$$x^2 - 4x = -13 \quad (4B)$$

$$3x^2 + 5x + 4 = 0 \quad (4A)$$

**الجذور والمميز:** في المعادلة التربيعية، لاحظ العلاقة بين قيمة ما تحت الجذر وجذور المعادلة التربيعية في الأمثلة السابقة. العبارة  $b^2 - 4ac$  تسمى **المميز**.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \leftarrow \text{المميز}$$







ويمكنك استعمال المميز لتحديد عدد جذور المعادلة التربيعية وأنواعها، والجدول في الصفحة الآتية يلخص الأنواع الممكنة للجذور، وذلك للتأكد من صحة حلك.



في المعادلة  $ax^2 + bx + c = 0$  ، حيث  $a, b, c$  أعداد نسبية،  $a \neq 0$ .

**الجدور**  
تذكر أن حلول المعادلة تسمى جذوراً وهي قيم  $X$  التي يقطع عندها التمثيل البياني للدالة المرتبطة بالمعادلة المحور  $X$ .

مثال على التمثيل البياني للدالة المرتبطة بالمعادلة	عدد الجذور وأنواعها	قيمة التمييز
	جذران حقيقيان نسبيا	$b^2 - 4ac > 0$ والعبارة $b^2 - 4ac$ مربع كامل.
	جذران حقيقيان غير نسبيا	$b^2 - 4ac > 0$ والعبارة $b^2 - 4ac$ ليست مربعاً كاملاً.
	جذر حقيقي مكرر مرتين	$b^2 - 4ac = 0$
	جذران مركبان مترافقان	$b^2 - 4ac < 0$

مثال 5

وصف الجذور

أوجد قيمة التمييز لكل من المعادلتين التربيعيتين الآتيتين ، وحدد عدد جذور كل منهما وأنواعها:

$$x^2 + 22x + 121 = 0 \quad (b)$$

$$a = 1, b = 22, c = 121$$

$$\begin{aligned} b^2 - 4ac &= (22)^2 - 4(1)(121) \\ &= 484 - 484 \\ &= 0 \end{aligned}$$

التمييز يساوي صفراً؛ لذا يوجد جذر حقيقي واحد مكرر مرتين.

$$7x^2 - 11x + 5 = 0 \quad (a)$$

$$a = 7, b = -11, c = 5$$

$$\begin{aligned} b^2 - 4ac &= (-11)^2 - 4(7)(5) \\ &= 121 - 140 \\ &= -19 \end{aligned}$$

التمييز سالب؛ لذا يوجد جذران مركبان مترافقان.

تحقق من فهمك

$$-7x + 15x^2 - 4 = 0 \quad (5B)$$

$$-5x^2 + 8x - 1 = 0 \quad (5A)$$



درست فيما سبق طرائق مختلفة لحل المعادلات التربيعية، والجدول أدناه يلخص تلك الطرائق.

حالات استعمالها	إمكانية استعمالها	الطريقة
عندما لا يطلب إيجاد الحل الدقيق، وأفضل استعمال لها عند التحقق من معقولية الحلول التي يتم إيجادها بالطرائق الجبرية.	أحياناً	التمثيل البياني
عندما يساوي الحد الثابت صفرًا مثال: $x^2 - 7x = 0$ أو عندما يكون من السهل إيجاد العوامل. مثال: $x^2 - 5x + 6 = 0$	أحياناً	التحليل إلى العوامل
مع المعادلات المكتوبة على صورة مربع كامل يساوي ثابتًا. مثال: $(x - 5)^2 = 18$	أحياناً	خاصية الجذر التربيعي
مع المعادلات المكتوبة على الصورة: $x^2 + bx + c = 0$ مثال: $x^2 + 6x - 14 = 0$	دائمًا	إكمال المربع
عندما لا يمكن استعمال بقية الطرائق أو عندما يكون من الصعب استعمالها. مثال: $2.3x^2 - 1.8x + 9.7 = 0$	دائمًا	القانون العام

تأكد

حلّ كل معادلة مما يأتي باستعمال القانون العام:

(2)  $x^2 + 8x + 5 = 0$

(4)  $9x^2 + 6x - 4 = 0$

(6)  $22x = 12x^2 + 6$

(8)  $x^2 + 3 = -6x + 8$

(1)  $x^2 + 12x - 9 = 0$

(3)  $4x^2 - 5x - 2 = 0$

(5)  $10x^2 - 3 = 13x$

(7)  $-3x^2 + 4x = -8$

الأمثلة 1-4

أجب عن الفرعين a، b لكل معادلة تربيعية مما يأتي:

مثال 5

(a) أوجد قيمة المميز.

(b) أوجد عدد الجذور، وحدد أنواعها.

(10)  $2x^2 - 6x + 9 = 0$

(9)  $3x^2 + 8x + 2 = 0$

(12)  $5x^2 + 2x + 4 = 0$

(11)  $-16x^2 + 8x - 1 = 0$





حل كل معادلة مما يأتي باستعمال القانون العام:

$$4x^2 - 6 = -12x \quad (14)$$

$$x^2 + 45x = -200 \quad (13)$$

الأمثلة 1-4

$$12x^2 + 9x - 2 = -17 \quad (16)$$

$$5x^2 - 9 = 11x \quad (15)$$

أجب عن الفرعين a ، b لكل معادلة تربيعية مما يأتي:

(a) أوجد قيمة المميز.

مثال 5

(b) أوجد عدد الجذور، وحدد أنواعها.

$$2x^2 + 4x + 7 = 0 \quad (19)$$

$$3x^2 - 3x + 8 = 0 \quad (18)$$

$$2x^2 + 3x - 3 = 0 \quad (17)$$

$$x^2 + 2x - 4 = -9 \quad (22)$$

$$x^2 - 6x = -9 \quad (21)$$

$$-5x^2 + 4x + 1 = 0 \quad (20)$$

$$8x^2 = -2x + 1 \quad (25)$$

$$5x^2 + 8x = 0 \quad (24)$$

$$-6x^2 + 5 = -4x + 8 \quad (23)$$

$$0.6x^2 + 1.4x = 4.8 \quad (28)$$

$$0.8x^2 + 2.6x = -3.2 \quad (27)$$

$$4x - 3 = -12x^2 \quad (26)$$

(29) **التدخين:** تبذل دول العالم جهودًا مكثفة للتوعية بأخطار التدخين، وقد أثمرت عن تناقص أعداد المدخنين. وفي إحدى البلدان أجريت دراسة حول الإصابات بمرض سرطان الرئة بين كل 100000 شخص في بعض الأعوام، وكانت نتائجها التقريبية كما في الجدول المجاور. ويمكن تمثيل العدد التقريبي للمصابين بالدالة  $y = -0.26x^2 - 0.55x + 91.81$ ، حيث  $x$  عدد السنوات بعد عام 2000.



#### الربط مع الحياة

تأسس برنامج مكافحة التدخين التابع لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية في 1423/2/23هـ؛ لمكافحة التدخين بكافة أنواعه ووسائله. ويقدم خدماته في كافة المجالات التوعوية والعلمية والاستشارية المتعلقة بالتدخين وأضراره وطرق مكافحته في مدن ومحافظات المملكة.

المصدر: البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة  
www.moh.gov.sa/depts/TCP/Pages/About.aspx

العام	عدد الإصابات لكل 100000
2000	92
2002	90
2004	85
2010	?
2017	?

(a) احسب عدد المصابين بسرطان الرئة لكل 100000 شخص في عامي 2017، 2010.

(b) استعمل القانون العام لإيجاد قيمة  $x$  عندما  $y = 50$ .

(c) اعتمادًا على الدالة التربيعية، متى يصبح معدل الإصابة يساوي صفرًا؟ وهل هذا التوقع معقول؟ فسّر إجابتك.

(30) **نظرية الأعداد:** يعطى مجموع الأعداد الصحيحة المتتالية  $1, 2, 3, \dots, n$  بالقانون

$$S = \frac{1}{2} n (n + 1)$$

فكم عددًا صحيحًا متتاليًا بدءًا بالعدد 1 مجموعها يساوي 666؟

(31) **ترفيه:** يُعطى ارتفاع لعبة ترفيهية عن سطح الأرض وهي تتحرك بسرعة تصل إلى  $80 \text{ ft/s}$  بالدالة:

$$h = -16t^2 - 64t + 60$$

حيث  $h$  الارتفاع بالأقدام، و  $t$  الزمن بالثواني. فإذا علمت أنها ترتفع مسافة 60 ft ، فما الزمن الذي يستغرقه هبوطها من ارتفاع 60 ft إلى 0 ft ؟





## مسائل مهارات التفكير العليا

(32) **اكتشف الخطأ:** حددت كلٌّ من هدى وندى عدد حلول للمعادلة  $3x^2 - 5x = 7$ . فمن منهما إجابتها صحيحة؟ وضح إجابتك.

ندى	هدى
$3x^2 - 5x = 7$	$3x^2 - 5x = 7$
$b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4(3)(7)$	$3x^2 - 5x - 7 = 0$
$= -59$	$b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4(3)(-7)$
وبها أن المميز سالب فلا توجد للمعادلة حلول حقيقية.	$= 109$
	وبها أن المميز موجب فللمعادلة حلان حقيقيان.

(33) **تحّد:** حل المعادلة  $4ix^2 - 4ix + 5i = 0$  باستعمال القانون العام.

(34) **تبرير:** حدد ما إذا كانت كل جملة مما يأتي صحيحة دائماً أو صحيحة أحياناً أو غير صحيحة أبداً. ووضح إجابتك:

(a) إذا كانت إشارتا كلٍّ من المعاملين  $a, c$  في المعادلة التربيعية المكتوبة على الصورة القياسية مختلفتين، فإن جذري المعادلة حقيقيان.

(b) إذا كان مميز المعادلة التربيعية أكبر من 1، فإن لها جذرين حقيقيين غير نسبيين.

(35) **اكتب:** صف ثلاث طرائق مختلفة لحل المعادلة:  $x^2 - 2x - 15 = 0$ . وأيها تفضل؟ ولماذا؟

## تدريب على اختبار

(37) قيمة المميز للمعادلة  $x^2 - 8x = 0$  هي:

- A -64
- B -8
- C 8
- D 64

(36) أي المعادلات الآتية لها جذر حقيقي مكرر مرتين؟

- A  $x^2 - 2x + 5 = 0$
- B  $x^2 - 2x - 5 = 0$
- C  $x^2 = 19$
- D  $x^2 - 8x = -16$

## مراجعة تراكمية

أوجد قيمة  $c$  التي تجعل كل ثلاثية حدود مما يأتي مربعاً كاملاً. ثم اكتبها على صورة مربع كامل: (مهارة سابقة)

$$x^2 + \frac{4}{5}x + c \quad (40)$$

$$x^2 + 2.4x + c \quad (39)$$

$$x^2 + 13x + c \quad (38)$$

بسّط كلاً مما يأتي: (الدرس 3-1)

$$(4\sqrt{-9}) \cdot (2\sqrt{-25}) \quad (43)$$

$$\sqrt{-16} \quad (42)$$

$$i^{26} \quad (41)$$







## مجموع الجذرين وحاصل ضربهما

**الهدف**  
أكتب المعادلة التربيعية بمعرفة مجموع جذريها وحاصل ضربهما.

إذا علمت جذري معادلة تربيعية فإنه يمكنك كتابتها باستعمال مجموع جذريها وحاصل ضربهما.

للمعادلة التربيعية:  $x^2 + 5x - 24 = 0$  جذران هما  $3, -8$  ومجموعهما  $-5$ ، وحاصل ضربهما  $-24$ .

مجموع الجذرين:  $3 + (-8) = -5$  هو النظير الجمعي لمعامل  $x$

$$x^2 + 5x - 24 = 0$$

حاصل ضرب الجذرين:  $3(-8) = -24$  هو الحد الثابت

ويمكن تعميم ذلك لأية معادلة تربيعية باستعمال القانون العام لحل المعادلة التربيعية، فإذا كان جذرا المعادلة التربيعية  $r_1, r_2$  فإن:

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad r_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

مجموع الجذرين  
بسّط

$$r_1 + r_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-2b + 0}{2a} = -\frac{b}{a}$$

مجموع الجذرين يساوي  $-\frac{b}{a}$

اضرب الجذرين  
اضرب

$$r_1 \cdot r_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2}$$

الخاصية التوزيعية

$$= \frac{b^2 - b^2 + 4ac}{4a^2}$$

بسّط

$$= \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}$$

حاصل ضرب الجذرين يساوي  $\frac{c}{a}$

مما سبق يمكن التوصل للقانون الآتي الذي يستعمل لكتابة أية معادلة تربيعية عُلِمَ جذراها.

أضف إلى

مطويتك

**مفهوم أساسي**  
مجموع جذري معادلة وحاصل ضربهما

إذا كان  $r_1, r_2$  جذري المعادلة  $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$

$$\text{فإن } r_1 + r_2 = -\frac{b}{a}, \quad r_1 \cdot r_2 = \frac{c}{a}$$



### النشاط 1 استعمال مجموع جذرين وحاصل ضربهما

اكتب المعادلة التربيعية التي جذراها  $-7$  ,  $2$ .

**الخطوة 1 :** أوجد مجموع الجذرين:

$$r_1 + r_2 = 2 + (-7) \\ = -5$$

**الخطوة 2 :** أوجد حاصل ضرب الجذرين:

$$r_1 \cdot r_2 = 2(-7) \\ = -14$$

**الخطوة 3 :** اكتب المعادلة:

بما أن  $-5 = -\frac{b}{a}$  ,  $-14 = \frac{c}{a}$  ، فإذا كانت  $a = 1$  فإن:  $b = 5$  ,  $c = -14$ .

وبالتالي المعادلة:  $x^2 + 5x - 14 = 0$  تحقق المطلوب.



### النشاط 2 استعمال مجموع جذرين وحاصل ضربهما

اكتب المعادلة التربيعية التي جذراها  $-\frac{12}{5}$  ,  $\frac{3}{4}$ .

**الخطوة 1 :** أوجد مجموع الجذرين:

$$r_1 + r_2 = \frac{3}{4} + \left(-\frac{12}{5}\right) \\ = \frac{15}{20} - \frac{48}{20} = -\frac{33}{20}$$

**الخطوة 2 :** أوجد حاصل ضرب الجذرين:

$$r_1 \cdot r_2 = \frac{3}{4} \left(-\frac{12}{5}\right) \\ = -\frac{36}{20}$$

**الخطوة 3 :** اكتب المعادلة:

بما أن  $-\frac{33}{20} = -\frac{b}{a}$  ,  $-\frac{36}{20} = \frac{c}{a}$  ؛ فإذا كانت  $a = 20$  فإن:  $b = 33$  ,  $c = -36$ .

وبالتالي المعادلة:  $20x^2 + 33x - 36 = 0$  تحقق المطلوب.

تمارين:

اكتب المعادلة التربيعية التي جذراها العددين المعطيان في كل مما يأتي:

(1)  $-\frac{3}{4}, \frac{5}{8}$       (2)  $-7, \frac{2}{3}$       (3)  $\pm \frac{2}{5}$       (4)  $4 \pm \sqrt{3}$

(5)  $1 \pm \sqrt{6}$       (6)  $\frac{-2 \pm 3\sqrt{5}}{7}$       (7)  $7 \pm 3i$       (8)  $\sqrt{5} \pm 8i$

اكتب المعادلة التربيعية التي تحقق كلاً مما يأتي:

(9) مجموع جذريها  $4$  ، وحاصل ضربهما  $\frac{13}{12}$       (10) مجموع جذريها  $\frac{1}{6}$  ، وحاصل ضربهما  $\frac{5}{21}$





## العمليات على كثيرات الحدود Operations with Polynomials

### لماذا؟

يستغرق وصول ضوء الشمس إلى الأرض 8 دقائق تقريباً؛ إذ يسير الضوء بسرعة كبيرة تصل إلى  $3 \times 10^8$  m/s تقريباً.

ما الوقت الذي سيستغرقه وصول الضوء إلينا من مجرة تبعد مسافة  $2.367 \times 10^{21}$  m تقريباً؟



### فيما سبق:

درست إيجاد قيم القوى.  
(مهارة سابقة)

### والآن:

- أضرب وحيدات حد وعبارات تتضمن قوى، وأقسمها وأبسطها.
- أجمع كثيرات حدود، وأطرحها وأضربها.

### المفردات:

التبسيط

simplifying

درجة كثيرة الحدود

Degree of a polynomial

**ضرب وحيدات الحد وقسمتها** تذكر أن وحيدة الحد هي: عدد، أو متغير، أو حاصل ضرب عدد في متغير واحد أو أكثر بأسس صحيحة غير سالبة، وتتكون من حد واحد فقط. والجدول الآتي يلخص خصائص الأسس التي تساعد على ضرب وقسمة وحيدات الحد وتبسيطها، حيث إن عملية تبسيط عبارات تتضمن قوى تعني إعادة كتابتها دون أقواس أو أسس سالبة.

مثال	التعريف	الخاصية
$3^2 \cdot 3^4 = 3^{2+4} = 3^6$ $p^2 \cdot p^9 = p^{2+9} = p^{11}$	$x^a \cdot x^b = x^{a+b}$	ضرب القوى
$\frac{9^5}{9^2} = 9^{5-2} = 9^3$ $\frac{b^6}{b^4} = b^{6-4} = b^2$	حيث $x \neq 0$ ، $\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$	قسمة القوى
$3^{-5} = \frac{1}{3^5}$ $\frac{1}{b^{-7}} = b^7$	حيث $x \neq 0$ ، $x^{-a} = \frac{1}{x^a}$ ، $\frac{1}{x^{-a}} = x^a$	الأس السالب
$(3^3)^2 = 3^{3 \cdot 2} = 3^6$ $(d^2)^4 = d^{2 \cdot 4} = d^8$	$(x^a)^b = x^{ab}$	قوة القوة
$(2k)^4 = 2^4 k^4 = 16k^4$ $(ab)^3 = a^3 b^3$	$(xy)^a = x^a y^a$	قوة ناتج الضرب
$\left(\frac{x}{y}\right)^2 = \frac{x^2}{y^2}$ $\left(\frac{a}{b}\right)^{-5} = \frac{b^5}{a^5}$	$\left(\frac{x}{y}\right)^a = \frac{x^a}{y^a}$ ، $y \neq 0$ ، $\left(\frac{x}{y}\right)^{-a} = \left(\frac{y}{x}\right)^a = \frac{y^a}{x^a}$ ، $x \neq 0$ ، $y \neq 0$	قوة ناتج القسمة
$x^0 = 1$ ، $x \neq 0$	$x^0 = 1$ ، $x \neq 0$	القوة الصفرية



عند تبسيط وحيدة الحد، تأكد من أنك قد كتبتها في أبسط صورة.

أضف إلى

مطويتك

### تبسيط وحيدات الحد

### مفهوم أساسي

تكون وحيدة الحد في أبسط صورة عندما:

- لا تتضمن قوى قوة.
- يظهر كل أساس مرة واحدة.
- تكون جميع الكسور المتضمنة في أبسط صورة.
- لا تتضمن أقواساً أو أسساً سالبة.

### تبسيط العبارات

### مثال 1

بسّط كل عبارة فيما يأتي مفترضاً أن أيّاً من المتغيرات لا يساوي صفراً:

$$(a) \quad (2a^{-2})(3a^3b^2)(c^{-2})$$

اضرب 2 في 3، واضرب  $a^{-2}$  في  $a^3$

$$(2a^{-2})(3a^3b^2)(c^{-2}) = 6ab^2c^{-2}$$



تعريف الأسس السالبة

بسّط

$$= 6ab^2 \left( \frac{1}{c^2} \right)$$

$$= \frac{6ab^2}{c^2}$$

$$(b) \quad \frac{q^2r^4}{q^7r^3}$$

قسمة القوى

$$= q^{2-7} \cdot r^{4-3}$$

اطرح الأسس

$$= q^{-5}r$$

تعريف الأسس السالبة

$$= \frac{r}{q^5}$$

$$(c) \quad \left( \frac{-2a^4}{b^2} \right)^3$$

قوة ناتج القسمة

$$\left( \frac{-2a^4}{b^2} \right)^3 = \frac{(-2a^4)^3}{(b^2)^3}$$

قوة ناتج الضرب

$$= \frac{(-2)^3(a^4)^3}{(b^2)^3}$$

قوة القوة

$$= \frac{-8a^{12}}{b^6}$$

تحقق من فهمك



$$\frac{15c^5d^3}{-3c^2d^7} \quad (1B)$$

$$(2x^{-3}y^3)(-7x^5y^{-6}) \quad (1A)$$

$$(-2x^3y^2)^5 \quad (1D)$$

$$\left( \frac{a}{4} \right)^{-3} \quad (1C)$$

### إرشادات للدراسة

#### تحقق

يمكنك التحقق من إجابتك دائماً باستعمال تعريف الأسس، فمثلاً:

$$\frac{q^2}{q^7} = \frac{q \cdot q}{q \cdot q \cdot q \cdot q \cdot q \cdot q \cdot q}$$

$$= \frac{1}{q^5}$$



وزارة التعليم

Ministry of Education

2021 - 1443



**العمليات على كثيرات الحدود:** درجة كثيرة الحدود المبسطة هي أكبر درجة لوحدات الحد المكوّنة لها. فمثلاً درجة كثيرة الحدود  $x^2 + 4x + 58$  هي 2.

### إرشادات للدراسة

#### كثيرات الحدود

تذكر أن كثيرة الحدود هي وحدة حد أو مجموع وحدات حد، وتسمى كل وحدة حد منها حداً في كثيرة الحدود. ودرجة وحدة الحد هي مجموع أسس كل متغيراتها.

### مثال 2

#### درجة كثيرة الحدود

حدد ما إذا كانت كل عبارة فيما يأتي كثيرة حدود أم لا، وإن كانت كذلك فاذكر درجتها:

$$(a) \frac{1}{4}x^4y^3 - 8x^5$$

تعّد هذه العبارة كثيرة حدود؛ لأن كل حد فيها هو وحدة حد؛ ودرجة الحد الأول فيها تساوي  $4 + 3 = 7$ ، ودرجة الحد الثاني 5؛ لذا فإن درجة كثيرة الحدود 7.

$$(b) \sqrt{x} + x + 4$$

هذه العبارة ليست كثيرة حدود؛ لأن  $\sqrt{x}$  ليست وحدة حد.

$$(c) x^{-3} + 2x^{-2} + 6$$

هذه العبارة ليست كثيرة حدود؛ لأن كلاً من  $x^{-3}$ ،  $x^{-2}$  ليست وحدة حد؛ حيث  $x^{-3} = \frac{1}{x^3}$ ،  $x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ ، ووحدات الحد لا تتضمن متغيرات في المقام.

#### تحقق من فهمك

$$x^5y + 9x^4y^3 - 2xy \quad (2B)$$

$$\frac{x}{y} + 3x^2 \quad (2A)$$

يمكنك إجراء العمليات المطلوبة على كثيرات الحدود وتبسيطها تمامًا كما تبسط وحدة الحد، ثم تجمع الحدود المتشابهة.

### إرشادات للدراسة

#### طرائق بديلة

لاحظ أن المثال 3a يستعمل طريقة الجمع الأفقي. على حين يستعمل المثال 3b طريقة الجمع الرأسى، وكلتاهما تؤدي إلى الإجابة الصحيحة.

### مثال 3

#### جمع كثيرات الحدود وطرحها

أوجد ناتج كل مما يأتي، واكتبه في أبسط صورة:

$$(a) (4x^2 - 5x + 6) - (2x^2 + 3x - 1)$$

تخلص من الأقواس وجمع الحدود المتشابهة.

$$\text{العبارة الأصلية} \quad (4x^2 - 5x + 6) - (2x^2 + 3x - 1)$$

$$\text{وزّع العدد -1} \quad = 4x^2 - 5x + 6 - 2x^2 - 3x + 1$$

$$\text{جمع الحدود المتشابهة} \quad = (4x^2 - 2x^2) + (-5x - 3x) + (6 + 1)$$

$$\text{اجمع الحدود المتشابهة} \quad = 2x^2 - 8x + 7$$

$$(b) (6x^2 - 7x + 8) + (-4x^2 + 9x - 5)$$

رتب الحدود المتشابهة رأسياً، وأوجد ناتج الجمع.

$$6x^2 - 7x + 8$$

$$(+)\quad -4x^2 + 9x - 5$$

$$2x^2 + 2x + 3$$

#### تحقق من فهمك



$$(3x^2 - 6) + (-x + 1) \quad (3B)$$

$$(-x^2 - 3x + 4) - (x^2 + 2x + 5) \quad (3A)$$



يمكنك استعمال خاصية التوزيع لضرب كثيرات الحدود.

#### مثال 4 ضرب وحيدة حد في كثيرة حدود

أوجد ناتج:  $3x(2x^2 - 4x + 6)$ ، واكتبه في أبسط صورة.

$$\begin{aligned} \text{خاصية التوزيع} \quad 3x(2x^2 - 4x + 6) &= 3x(2x^2) + 3x(-4x) + 3x(6) \\ \text{اضرب في وحيدة الحد} \quad &= 6x^3 - 12x^2 + 18x \end{aligned}$$

تحقق من فهمك

$$-2a(-3a^2 - 11a + 20) \quad (4B)$$

$$\frac{4}{3}x^2(6x^2 + 9x - 12) \quad (4A)$$

#### مثال 5 ضرب كثيرات الحدود

أوجد ناتج:  $(n^2 + 4n - 6)(n + 2)$ ، واكتبه في أبسط صورة.

$$\begin{aligned} \text{خاصية التوزيع} \quad (n^2 + 4n - 6)(n + 2) &= n^2(n + 2) + 4n(n + 2) + (-6)(n + 2) \\ \text{خاصية التوزيع} \quad &= n^2 \cdot n + n^2 \cdot 2 + 4n \cdot n + 4n \cdot 2 + (-6) \cdot n + (-6) \cdot 2 \\ \text{اضرب وحيدات الحد} \quad &= n^3 + 2n^2 + 4n^2 + 8n - 6n - 12 \\ \text{اجمع الحدود المتشابهة} \quad &= n^3 + 6n^2 + 2n - 12 \end{aligned}$$

تحقق من فهمك

$$(2x^2 - 4x + 5)(3x - 1) \quad (5B)$$

$$(x^2 + 4x + 16)(x - 4) \quad (5A)$$

يمكنك استعمال كثيرات الحدود لتمثيل مواقف من واقع الحياة.

#### مثال 6 من واقع الحياة كتابة عبارة كثيرة حدود

**قيادة:** تتطلب أنظمة إحدى شركات النقل البري أن تكون مدة قيادة سائقي الشاحنات 10 ساعات يومياً، تخللها فترة استراحة، فإذا قاد أحد سائقي الشركة شاحنته في فترة ما قبل الاستراحة بسرعة 90km/h، وبعد الاستراحة بسرعة 100km/h، فاكتب كثيرة حدود تمثل المسافة التي قطعها.

التعبير اللفظي  
قاد السائق سيارته بسرعة 90 km/h في فترة ما قبل الاستراحة، و 100 km/h في فترة ما بعد الاستراحة.

المتغير  
ليكن  $x$  عدد ساعات القيادة قبل الاستراحة.

العبارة  
 $90x + 100(10 - x)$

$$\begin{aligned} \text{خاصية التوزيع} \quad 90x + 100(10 - x) &= 90x + 1000 - 100x \\ \text{اجمع الحدود المتشابهة} \quad &= 1000 - 10x \end{aligned}$$

فتكون كثيرة الحدود هي  $1000 - 10x$

تحقق من فهمك

**6 استثمار:** استثمر فيصل مبلغ 90000 ريال في مشروعين أحدهما صناعي نسبة ربحه السنوي 18%، والآخر مشروع عقاري نسبة ربحه السنوي 42%، فإذا كانت  $x$  تمثل المبلغ الذي استثمره فيصل في المشروع العقاري، فاكتب كثيرة حدود تمثل ربحه في المشروعين بعد عام واحد.

#### إرشادات للدراسة

##### قانون المسافة

تذكر أن:

$$\text{المسافة} = \text{السرعة} \times \text{الزمن}$$



#### الربط مع الحياة

تعقد معظم الدول دورات تدريبية متخصصة واختبارات مشددة لقائدي الشاحنات للتأكد من مستوى تأهيلهم لقيادتها، وتوعيتهم بكيفية التعامل مع الطرق السريعة، بما يقلل المخاطر ويؤمن حركة السير.



مثال 1 بسط كلاً مما يأتي مفترضاً أن أيّاً من المتغيرات لا يساوي صفراً:

(1)  $(2a^3b^{-2})(-4a^2b^4)$  (2)  $\frac{12x^4y^2}{2xy^5}$  (3)  $\left(\frac{2a^2}{3b}\right)^3$  (4)  $(6g^5h^{-4})^3$

مثال 2 حدد ما إذا كانت كل عبارة فيما يأتي كثيرة حدود أم لا، وإن كانت كذلك فاذكر درجتها:

(5)  $3x + 4y$  (6)  $\frac{1}{2}x^2 - 7y$  (7)  $x^2 + \sqrt{x}$  (8)  $\frac{ab^3 - 1}{az^4 + 3}$

الأمثلة 3, 4, 5 أوجد ناتج كل مما يأتي واكتبه في أبسط صورة:

(9)  $(x^2 - 5x + 2) - (3x^2 + x - 1)$  (10)  $(3a + 4b) + (6a - 6b)$

(11)  $3x^2(2xy - 3xy^2 + 4x^2y^3)$  (12)  $(n - 9)(n + 7)$

مثال 6 (13) **رياضة:** يمارس عثمان رياضتي الركض السريع ورفع الأثقال مدة 75 دقيقة يومياً. وعند ركضه يحرق 10 درجات حرارية في الدقيقة، أما عندما يرفع الأثقال فيحرق 7.5 درجات حرارية في الدقيقة. فإذا مارس رفع الأثقال  $x$  دقيقة في أحد الأيام، فاكتب كثيرة حدود تمثل عدد السعرات الحرارية التي حرقها في ممارسته للرياضتين ذلك اليوم.



## تمارين ومسائل

مثال 1 بسط كلاً مما يأتي مفترضاً أن أيّاً من المتغيرات لا يساوي صفراً:

(14)  $(5x^3y^{-5})(4xy^3)$  (15)  $\frac{-y^3z^5}{y^2z^3}$  (16)  $\frac{-7x^5y^5z^4}{21x^7y^5z^2}$  (17)  $(n^5)^4$

مثال 2 حدد ما إذا كانت كل عبارة فيما يأتي كثيرة حدود أم لا، وإن كانت كذلك فاذكر درجتها:

(18)  $2x^2 - 3x + 5$  (19)  $a^3 - 11$  (20)  $\frac{5np}{n^2} - \frac{2g}{h}$  (21)  $\sqrt{m - 7}$

الأمثلة 3, 4, 5 أوجد ناتج كل مما يأتي، واكتبه في أبسط صورة:

(22)  $(6a^2 + 5a + 10) - (4a^2 + 6a + 12)$  (23)  $4x(2x^2 + y)$

(24)  $(x - y)(x^2 + 2xy + y^2)$  (25)  $(a + b)(a^3 - 3ab - b^2)$

مثال 6 (26) **مزرعة:** استأجر سلمان عاملين بالتناوب لتنسيق مزرعته، فإذا تقاضى الأول 200 ريال عن كل يوم عمل، وتقاضى الثاني 150 ريالاً عن كل يوم عمل، واحتاجت المزرعة إلى 15 يوم عمل لتنسيقها، فاكتب كثيرة حدود تمثل تكلفة تنسيق المزرعة إذا عمل الأول مدة  $x$  يوماً.

بسط كلاً مما يأتي مفترضاً أن أيّاً من المتغيرات لا يساوي صفراً:

(27)  $\left(\frac{8x^2y^3}{24x^3y^2}\right)^4$  (28)  $\left(\frac{4x^{-2}y^3}{xy^{-4}}\right)^{-2}$  (29)  $(a^2b^3)(ab)^{-2}$

(30)  $(-3x^3y)^2(4xy^2)$  (31)  $\frac{3c^2d(2c^3d^5)}{15c^4d^2}$  (32)  $\frac{1}{4}g^2(8g + 12h - 16gh^2)$



(33)  $x^{-2}(x^4 - 3x^3 + x^{-1})$  (34)  $a^{-3}b^2(ba^3 + b^{-1}a^2 + b^{-2}a)$

(35)  $(n^2 - 7)(2n^3 + 4)$  (36)  $(2x - 2y)^3$





### الربط مع الحياة

يصعب التنبؤ بالطقس على كوكب المريخ، نظراً إلى بيئته المتقلبة. ويبدو أن فيه أعماق واد، وأكبر بركان في المجموعة الشمسية.


(37) **فلك:** ارجع إلى فقرة "لماذا" في بداية هذا الدرس.

- (a) ما الوقت الذي يستغرقه الضوء حتى يصل من المجرة المذكورة إلى الأرض؟  
 (b) ما الوقت الذي يستغرقه الضوء حتى يصل من الشمس إلى المريخ إذا كانت المسافة بينهما  $2.28 \times 10^{11}m$ ؟

(38) إذا كان  $5^k + 7 = 5^{2k} - 3$ ، فما قيمة  $k$ ؟

(39) ما قيمة  $k$  التي تجعل  $q^{41} = q^{4k} \cdot q^5$  صحيحة؟

(40) **تمثيلات متعددة:** استعمل النموذج المجاور الذي يمثل حاصل ضرب  $x + 3$  في  $x + 4$ .



(a) **هندسياً:** مساحة المستطيل تساوي حاصل ضرب طوله

في عرضه، أوجد حاصل ضرب  $x + 3$  في  $x + 4$  باستعمال النموذج.

(b) **جبرياً:** استعمل طريقة التوزيع بالترتيب لإيجاد حاصل ضرب  $x + 3$  في  $x + 4$ .

(c) **لفظياً:** وضح كيف يمثل النموذج كل حد في حاصل الضرب.

### مسائل مهارات التفكير العليا

(41) **برهان:** وضح كيف يمكن برهنة خاصية الأسس السالبة باستعمال خاصيتي قسمة القوى والقوة الصفرية؟

(42) **تحذ:** ما الذي يحدث للمقدار  $x^{-y}$  عندما تزداد قيمة  $y$  لكل  $x > 1, y > 0$ ؟

(43) **تبرير:** فسّر لماذا تكون العبارة  $0^{-2}$  غير معرّفة؟

(44) **مسألة مفتوحة:** اكتب ثلاث عبارات مختلفة مكافئة لـ  $x^{12}$ .

(45) **اكتب:** وضح لماذا تُعد خصائص الأسس مهمة في الفلك؟ وضحن توضيحك طريقة إيجاد الزمن اللازم لوصول الضوء من مصدر ما إلى أحد الكواكب.

### تدريب على اختبار

(47) أي مما يأتي ليس عاملاً لكثير الحدود  $x^3 - x^2 - 2x$ ؟

- A  $x$       B  $x + 1$   
 C  $x - 1$       D  $x - 2$

(46) **إجابة قصيرة:** بسّط المقدار  $\frac{(2x^2)^3}{12x^4}$ .

### مراجعة تراكمية

حلّل كل كثيرة حدود فيما يأتي: (مهارة سابقة)

(48)  $12ax^3 + 20bx^2 + 32cx$

(50)  $12y^2 + 9y + 8y + 6$

(52)  $8ax - 6x - 12a + 9$

(49)  $x^2 + 2x + 6 + 3x$

(51)  $2my + 7x + 7m + 2xy$

(53)  $10x^2 - 14xy - 15x + 21y$








## قسمة كثيرات الحدود Dividing Polynomials

### لماذا؟

تحتاج سلمى إلى  $(140x^2 + 60x)$  بوصة مربعة من الورق لعمل غلاف لكتاب طوله  $10x$  بوصات. ويظهر الشكل أدناه الجزء الذي تركته للشني على جانبي الغلاف. فإذا كان عرض كعب الغلاف  $2x$  بوصة، وعرض كل من الغلاف الأمامي والخلفي  $6x$  بوصة، فما عرض كل من جزأي الشني؟ يمكنك استعمال قسمة كثيرات الحدود لمساعدتك على إيجاد الجواب.



**القسمة الطويلة:** تعلمت في الدرس (3-3) قسمة وحيدات الحد، لذا يمكنك قسمة كثيرة حدود على وحيدة حد مستعملاً المهارات نفسها.

### فيما سبق:

درست قسمة وحيدات الحد. (الدرس 3-3)

### والآن:

- أقسم كثيرات الحدود مستعملاً القسمة الطويلة.
- أقسم كثيرات الحدود مستعملاً القسمة التركيبية.

### المفردات:

القسمة التركيبية  
Synthetic division

### مثال 1

#### قسمة كثيرة حدود على وحيدة حد

$$\text{بسّط العبارة: } \frac{6x^4y^3 + 12x^3y^2 - 18x^2y}{3xy}$$

اقسم كل حد في البسط على المقام

$$\begin{aligned} \frac{6x^4y^3 + 12x^3y^2 - 18x^2y}{3xy} &= \frac{6x^4y^3}{3xy} + \frac{12x^3y^2}{3xy} - \frac{18x^2y}{3xy} \\ &= \frac{6}{3} \cdot x^{4-1}y^{3-1} + \frac{12}{3} \cdot x^{3-1}y^{2-1} - \frac{18}{3} \cdot x^{2-1}y^{1-1} \\ &= 2x^3y^2 + 4x^2y - 6x \end{aligned}$$

اقسم

$$y^{1-1} = y^0 = 1$$

تحقق من فهمك

$$(18x^2y + 27x^3y^2z)(3xy)^{-1} \quad (1B) \quad (20c^4d^2f - 16cdf^2 + 4cdf) \div (4cdf) \quad (1A)$$

يمكنك استعمال عملية مشابهة للقسمة الطويلة لقسمة كثيرة حدود على كثيرة حدود أخرى. وتسمى خطواتها خوارزمية القسمة.

### إرشادات للدراسة

#### خطوات خوارزمية قسمة كثيرة حدود على أخرى:

- اكتب كثيرة الحدود في كل من المقسوم والمقسوم عليه، بحيث تكون حدودها مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب درجتها.
- ابدأ بقسمة الحد الأول في المقسوم على الحد الأول في المقسوم عليه، وضع الإجابة في المكان المخصص لذلك.
- اضرب ناتج القسمة في الخطوة السابقة في المقسوم عليه، وكتب الإجابة تحت المقسوم، واطرحه من المقسوم.
- استمر بقسمة الحد الثاني... إلخ، حتى تصل إلى أن يكون باقي القسمة 0، أو كثيرة حدود درجتها أقل من درجة المقسوم عليه.

### مثال 2

#### قسمة كثيرة حدود على كثيرة حدود أخرى

استعمل القسمة الطويلة لإيجاد ناتج:  $(x^2 + 3x - 40) \div (x - 5)$ .

$$\begin{array}{r} x + 8 \\ x - 5 \overline{) x^2 + 3x - 40} \\ \underline{-(x^2 - 5x)} \phantom{- 40} \\ 8x - 40 \\ \underline{-(8x - 40)} \\ 0 \end{array}$$

ناتج القسمة هو  $x + 8$ ، والباقي 0.

تحقق من فهمك

$$(x^2 + 7x - 30) \div (x - 3) \quad (2A)$$

$$(x^2 - 13x + 12) \div (x - 1) \quad (2B)$$





قد ينتج باقٍ عن قسمة كثيرتي حدود كما في قسمة الأعداد الكلية، فمثلاً عند إيجاد  $11 \div 3$  يكون الناتج 3 والباقي 2، وتكتب عادةً على الصورة  $3 + \frac{2}{3}$ . ويمكنك كتابة نتيجة قسمة كثيرتي حدود مع باقٍ بالطريقة نفسها.

### مثال 3 على اختبار

أي مما يأتي يكافئ العبارة:  $(a^2 + 7a - 11)(3 - a)^{-1}$  ؟

- A  $a + 10 - \frac{19}{3 - a}$   
 B  $-a + 10$   
 C  $-a - 10 + \frac{19}{3 - a}$   
 D  $-a - 10 - \frac{19}{3 - a}$

#### اقرأ فقرة الاختبار

بما أن العامل الثاني مرفوع للأس -1، فهذه إذن مسألة قسمة.

$$(a^2 + 7a - 11)(3 - a)^{-1} = \frac{a^2 + 7a - 11}{3 - a}$$

#### حل فقرة الاختبار

$$\begin{array}{r} -a - 10 \\ \hline -a + 3 \overline{) a^2 + 7a - 11} \\ \underline{(-) a^2 - 3a} \phantom{- 11} \\ 10a - 11 \\ \underline{(-) 10a - 30} \\ 19 \end{array}$$

لتسهيل عملية القسمة، أعد كتابة  $3 - a$  على الصورة  $3 - a$

$$\begin{array}{r} -a(-a + 3) = a^2 - 3a \\ 7a - (-3a) = 10a \\ -10(-a + 3) = 10a - 30 \\ -11 - (-30) = 19 \end{array}$$

ناتج القسمة هو  $-a - 10$ ، والباقي 19.

لذا فإن  $(a^2 + 7a - 11)(3 - a)^{-1} = -a - 10 + \frac{19}{3 - a}$ ، ومن ثم تكون الإجابة هي البديل C.

#### تحقق من فهمك

3) أي مما يأتي يكافئ العبارة:  $(r^2 + 5r + 7)(1 - r)^{-1}$  ؟

- A  $-r - 6 + \frac{13}{1 - r}$   
 B  $r + 6$   
 C  $r - 6 + \frac{13}{1 - r}$   
 D  $r + 6 - \frac{13}{1 - r}$

**القسمة التركيبية:** القسمة التركيبية هي طريقة مبسطة لقسمة كثيرة حدود على ثنائية حد.

أضف إلى

مطويتك

### القسمة التركيبية

### مفهوم أساسي

**الخطوة 1:** اكتب معاملات المقسوم بعد ترتيب حدوده تنازلياً بحسب درجتها. تأكد من أن المقسوم عليه على الصورة  $X - r$ ، ثم اكتب الثابت  $r$  في الصندوق، وكتب المعامل الأول أسفل الخط الأفقي.

**الخطوة 2:** اضرب المعامل الأول في  $r$ ، وكتب الناتج أسفل المعامل الذي يليه.

**الخطوة 3:** اجمع ناتج الضرب مع المعامل الذي فوقه.

**الخطوة 4:** كرر الخطوات 2، 3 على ناتج الجمع في الخطوة السابقة حتى تصل إلى ناتج جمع العددين في العمود الأخير. الأعداد في الصف الأخير تمثل معاملات ناتج القسمة، ودرجة الحد الأول أقل بواحد من درجة المقسوم، والعدد الأخير هو الباقي.

وزارة التعليم

Ministry of Education

2021-1443



## مثال 4 القسمة التركيبية

استعمل القسمة التركيبية؛ لإيجاد ناتج:  $(2x^3 - 13x^2 + 26x - 24) \div (x - 4)$ .

$$\begin{array}{r} 4 \quad 2 \quad -13 \quad 26 \quad -24 \\ \downarrow \\ \hline 2 \quad | \end{array}$$

**الخطوة 1:** اكتب معاملات المقسوم. وكتب الثابت  $r$  في الصندوق، وهو في هذا المثال 4. ثم اكتب المعامل الأول وهو 2 أسفل الخط الأفقي.

$$\begin{array}{r} 4 \quad 2 \quad -13 \quad 26 \quad -24 \\ \quad \quad 8 \\ \hline 2 \quad \nearrow \quad | \end{array}$$

**الخطوة 2:** اضرب المعامل الأول في الثابت  $r$ :  $2(4) = 8$ ، وكتب الناتج أسفل المعامل الثاني.

$$\begin{array}{r} 4 \quad 2 \quad -13 \quad 26 \quad -24 \\ \quad \quad 8 \\ \hline 2 \quad -5 \quad | \end{array}$$

**الخطوة 3:** اجمع ناتج الضرب مع المعامل الثاني:  $-13 + 8 = -5$

$$\begin{array}{r} 4 \quad 2 \quad -13 \quad 26 \quad -24 \\ \quad \quad 8 \quad -20 \quad 24 \\ \hline 2 \quad -5 \quad \nearrow \quad 6 \quad \nearrow \quad | \quad 0 \end{array}$$

**الخطوة 4:** اضرب المجموع وهو  $-5$  في الثابت  $r$ :  $-5 \times 4 = -20$ ،

واكتب الناتج أسفل المعامل التالي، ثم اجمع:

$26 + (-20) = 6$ . اضرب المجموع وهو 6 في الثابت  $r$ :

$6(4) = 24$ ، وكتب ناتج الضرب تحت المعامل التالي،

ثم اجمع:  $-24 + 24 = 0$ .

إذن ناتج القسمة هو  $2x^2 - 5x + 6$ ، والباقي 0.

$$\begin{array}{r} 2x^2 - 5x + 6 \\ (\times) \quad \quad \quad x - 4 \\ \hline -8x^2 + 20x - 24 \end{array}$$

**تحقق:** اضرب ناتج القسمة في المقسوم عليه، فيكون الناتج هو المقسوم.

$$\begin{array}{r} (+) \quad 2x^3 - 5x^2 + 6x \\ \hline 2x^3 - 13x^2 + 26x - 24 \end{array}$$

### تنبيه!

**القسمة التركيبية**  
تذكر أن الحدود تجمع ولا تطرح عند إجراء القسمة التركيبية.

### إرشادات للدراسة

**القسمة التركيبية**  
إذا لم يوجد أحد الحدود في كثيرة حدود المقسوم فأضفه وليكن معامله صفراً. فمثلاً إذا كان المقسوم  $2x^3 - 4x^2 + 6$  فاكتبه في صورة  $2x^3 - 4x^2 + 0x + 6$

تحقق من فهمك ✓

(4A)  $(2x^3 + 3x^2 - 4x + 15) \div (x + 3)$

(4B)  $(3x^3 - 8x^2 + 11x - 14) \div (x - 2)$

(4C)  $(4a^4 + 2a^2 - 4a + 12) \div (a + 2)$

(4D)  $(6b^4 - 8b^3 + 12b - 14) \div (b - 2)$





ولإجراء القسمة التركيبية يجب أن يكون المقسوم عليه على الصورة  $x - r$ ، وإذا كان معامل  $x$  في المقسوم عليه لا يساوي الواحد، فيجب إعادة كتابة عبارة القسمة بحيث يمكنك استعمال القسمة التركيبية.

### مثال 5 معامل $x$ في المقسوم عليه لا يساوي 1

استعمل القسمة التركيبية؛ لإيجاد ناتج:  $(3x^4 - 5x^3 + x^2 + 7x) \div (3x + 1)$ .

أعد كتابة العبارة ليكون معامل  $x$  في المقسوم عليه 1 وذلك بقسمة كل من البسط والمقام على 3.

بسّط كلاً من البسط والمقام

$$\frac{3x^4 - 5x^3 + x^2 + 7x}{3x + 1} = \frac{(3x^4 - 5x^3 + x^2 + 7x) \div 3}{(3x + 1) \div 3}$$

$$= \frac{x^4 - \frac{5}{3}x^3 + \frac{1}{3}x^2 + \frac{7}{3}x}{x + \frac{1}{3}}$$

وبما أن المقسوم لا يحتوي حدًا ثابتًا، فضع صفرًا مكانه.

$$x-r = x + \frac{1}{3}, r = -\frac{1}{3} \rightarrow -\frac{1}{3} \left| \begin{array}{cccc|c} 1 & -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} & \frac{7}{3} & 0 \\ & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \hline 1 & -2 & 1 & 2 & -\frac{2}{3} \end{array} \right.$$

وعليه فإن الناتج هو  $x^3 - 2x^2 + x + 2 - \frac{2}{3x + 1}$ . وأخيرًا بسّط الكسر

اضرب كلاً من البسط والمقام في العدد 3

$$\frac{\frac{2}{3}}{x + \frac{1}{3}} = \frac{3 \times \frac{2}{3}}{3 \times (x + \frac{1}{3})}$$

$$= \frac{2}{3x + 1}$$

وعليه يكون الناتج هو:  $x^3 - 2x^2 + x + 2 - \frac{2}{3x + 1}$ .

**تحقق:** أوجد ناتج القسمة مستعملاً القسمة الطويلة.

$$\begin{array}{r} x^3 - 2x^2 + x + 2 \\ 3x + 1 \overline{) 3x^4 - 5x^3 + x^2 + 7x} \\ \underline{(-) 3x^4 + x^3} \phantom{+ 2} \\ (-) -6x^3 + x^2 + 7x \\ \underline{(-) -6x^3 - 2x^2} \phantom{+ 7x} \\ (-) 3x^2 + 7x \\ \underline{(-) 3x^2 + x} \phantom{+ 2} \\ (-) 6x + 2 \\ \underline{(-) 6x + 2} \\ -2 \end{array}$$

وعليه يكون الناتج هو  $x^3 - 2x^2 + x + 2 - \frac{2}{3x + 1}$ . ✓

تحقق من فهمك ✓

(5B)  $(8y^5 - 2y^4 - 16y^2 + 4) \div (4y - 1)$

(5A)  $(8x^4 - 4x^2 + x + 4) \div (2x + 1)$

(5D)  $(6c^3 - 17c^2 + 6c + 8) \div (3c - 4)$

(5C)  $(15b^3 + 8b^2 - 21b + 6) \div (5b - 4)$



مثال 1 بسّط كلّ عبارة فيما يأتي :

$$(1) \frac{4xy^2 - 2xy + 2x^2y}{xy}$$

$$(2) (3a^2b - 6ab + 5ab^2)(ab)^{-1}$$

المثالان 2, 4 استعمل القسمة الطويلة (خوارزمية القسمة) أو القسمة التركيبية؛ لإيجاد الناتج في كلّ ممّا يأتي:

$$(3) (x^2 - 6x - 20) \div (x + 2) \quad (4) (2a^2 - 4a - 8) \div (a + 1)$$

$$(5) (3z^4 - 6z^3 - 9z^2 + 3z - 6) \div (z + 3) \quad (6) (y^5 - 3y^2 - 20) \div (y - 2)$$

مثال 3 (7) اختيار من متعدد: أيّ مما يأتي يكافئ العبارة:  $(x^2 + 3x - 9)(4 - x)^{-1}$  ؟

$$A \quad -x - 7 + \frac{19}{4 - x} \quad B \quad -x - 7 \quad C \quad x + 7 - \frac{19}{4 - x} \quad D \quad -x - 7 - \frac{19}{4 - x}$$

مثال 5 استعمل القسمة التركيبية؛ لإيجاد الناتج في كلّ مما يأتي :

$$(8) (10x^2 + 15x + 20) \div (5x + 5) \quad (9) (18a^2 + 6a + 9) \div (3a - 2)$$

$$(10) \frac{12b^2 + 23b + 15}{3b + 8} \quad (11) \frac{27y^2 + 27y - 30}{9y - 6}$$

## تدرب وحل المسائل

مثال 1 بسّط كلّ عبارة فيما يأتي :

$$(12) \frac{24a^3b^2 - 16a^2b^3}{8ab}$$

$$(14) \frac{7g^3h^2 + 3g^2h - 2gh^3}{gh}$$

$$(13) \frac{5x^2y - 10xy + 15xy^2}{5xy}$$

$$(15) \frac{4a^3b - 6ab + 2ab^2}{2ab}$$

$$(17) \frac{9n^3p^3 - 18n^2p^2 + 21n^2p^3}{3n^2p^2}$$

$$(16) \frac{16c^4d^4 - 24c^2d^2}{4c^2d^2}$$

المثالان 2, 4 استعمل القسمة الطويلة (خوارزمية القسمة) أو القسمة التركيبية؛ لإيجاد الناتج في كلّ ممّا يأتي:

$$(18) (a^2 - 8a - 26) \div (a + 2) \quad (19) (b^3 - 4b^2 + b - 2) \div (b + 1)$$

$$(20) (z^4 - 3z^3 + 2z^2 - 4z + 4)(z - 1)^{-1} \quad (21) (x^5 - 4x^3 + 4x^2) \div (x - 4)$$

$$(22) \frac{y^3 + 11y^2 - 10y + 6}{y + 2} \quad (23) (g^4 - 3g^2 - 18) \div (g - 2)$$

مثال 3 (24) أيّ مما يأتي يكافئ العبارة:  $(x^2 + x - 6)(2 - x)^{-1}$  ؟

$$A \quad x + 3 \quad B \quad -x - 1 \quad C \quad -x + 1 \quad D \quad -x - 3$$

مثال 5 استعمل القسمة التركيبية؛ لإيجاد الناتج في كلّ مما يأتي :

$$(25) (6a^2 - 3a + 9) \div (3a - 2) \quad (26) \frac{6x^5 + 5x^4 + x^3 - 3x^2 + x}{3x + 1}$$

(27) هندسة: صمّم صندوق على شكل متوازي مستطيلات بحيث ترتبط أبعاده بعلاقة معينة بدلالة المتغير  $x$ .

فإذا كان حجم الصندوق  $6x^3 + 31x^2 + 53x + 30$ ، وارتفاعه  $x + 2$ ، فما عرض قاعدته، وما طولها؟

(28) فيزياء: يرتبط فرق جهد التيار  $V$  بشدة التيار  $C$ ، والقوة  $P$  بالمعادلة  $V = \frac{P}{C}$ . فإذا عبّر عن القوة بالدالة

$P(t) = t^3 + 9t^2 + 26t + 24$ ، وشدة التيار بالمعادلة  $C = t + 4$ ، فاكتب عبارة تمثل فرق الجهد  $V$ .

بسّط كلّ عبارة فيما يأتي:

$$(29) (x^4 - y^4) \div (x - y)$$

$$(30) (28c^3d^2 - 21cd^2) \div (14cd) \quad (31) (a^3b^2 - a^2b + 2b)(-ab)^{-1}$$

$$(32) \frac{n^3 + 3n^2 - 5n - 4}{n + 4} \quad (33) \frac{p^3 + 2p^2 - 7p - 21}{p + 3} \quad (34) \frac{3z^5 + 5z^4 + z + 5}{z + 2}$$



(35) **أعمال:** يمكن تقدير عدد النسخ المباعة من مجلة باستعمال المعادلة  $n = \frac{3500a^2}{a^2 + 100}$ ؛ حيث  $a$  المبلغ الذي تنفقه المجلة على الإعلان بمئات الريالات، و  $n$  عدد النسخ المباعة من المجلة.

(a) أجرِ عملية القسمة المعبر عنها بالمقدار:  $\frac{3500a^2}{a^2 + 100}$

(b) كم نسخة بيعت من المجلة إذا أنفق على الدعاية والإعلان 6000 ريال؟

(36) **تمثيلات متعددة:** افترض أن مساحة مستطيل هي  $2x^2 + 7x + 3$ ، وطوله  $2x + 1$ .

(a) **حسياً:** مثل الموقف باستعمال البطاقات الجبرية، ثم استعملها لإيجاد عرض المستطيل.

(b) **رمزياً:** اكتب عبارة جبرية تمثل إيجاد عرض المستطيل.

(c) **جبرياً:** حل المسألة جبرياً باستعمال القسمة التركيبية أو القسمة الطويلة، وهل يتفق الحل باستعمال البطاقات الجبرية مع الحل الجبري؟



### الربط مع الحياة

فن الإعلان جزء من النشاط الترويجي المتعدد العناصر، ولكنه يتفوق من حيث إمكانية تحقيقه اتصالاً على نطاق واسع جداً في وقت محدود. ومع التطور التقني تطور تصميم وإخراج الدعاية والإعلانات. ومن أنواع الإعلانات: الإعلان المطبوع، الإعلان المباشر، الإعلان الخارجي، الإعلان المسموع/ المرئي، الإعلان التفاعلي.

### مسائل مهارات التفكير العليا

(37) **اكتشف الخطأ:** قسّم كلٌّ من خليفة وجمال  $2x^3 - 4x^2 + 3x - 1$  على  $x - 3$ ، فقال خليفة: إن الباقي 26، وقال جمال: إن الباقي -100. فأيهما إجابته صحيحة؟ فسّر إجابتك.

(38) **تحذّر:** إذا قُسمت كثيرة حدود على ثنائية حد وكان الباقي 0، فما الذي تستنتج عن العلاقة بينهما؟

(39) **تبرير:** راجع أحد أسئلة القسمة في هذا الدرس، وبيّن العلاقة بين درجة كل من: المقسوم، والمقسوم عليه، وناتج القسمة.

(40) **مسألة مفتوحة:** اكتب عبارة تتضمن قسمة كثيرتي حدود، بحيث يكون الباقي 3.

(41) حدد العبارة المختلفة عن العبارات الثلاث الأخرى، وفسّر إجابتك.

$$3xy + 6x^2$$

$$\frac{5}{x^2}$$

$$x + 5$$

$$5b + 11c - 9ad^2$$

(42) **اكتب:** استعن بالمعلومات المعطاة في فقرة "لماذا؟" في بداية هذا الدرس، واكتب تعليمات متسلسلة لعمل غلاف لكتاب الرياضيات باستعمال قسمة كثيرات الحدود.

### تدريب على اختبار

(43) أي مما يأتي يكافئ العبارة:

$$(-4x^2 + 2x + 3) - 3(2x^2 - 5x + 1)$$

**A**  $2x^2$       **C**  $-10x^2 + 17x$

**B**  $-10x^2$       **D**  $2x^2 + 17x$

(44) أيُّ كثيرات الحدود الآتية درجتها 3؟

**A**  $x^3 + x^2 - 2x^4$       **C**  $x^2 + x + 12^3$

**B**  $-2x^2 - 3x + 4$       **D**  $1 + x + x^3$

### مراجعة تراكمية

بسّط كلَّ عبارة فيما يأتي: (الدرس 3-3)

(45)  $4a(2a - 3) + 3a(5a - 4)$

(46)  $(xy)^2(2xy^2z)^3$

(47)  $(3ab^2)^{-2}(2a^2b)^2$

إذا كان  $h(x) = -2x^2 - 2x + 4$ ,  $f(x) = 4x + 3$ ، فأوجد قيمة كل مما يأتي: (الدرس 1-2)

(48)  $f(-6)$

(49)  $h(3)$

(50)  $f(c)$

(51)  $h(2b + 1)$





استعمل القسمة الطويلة (خوارزمية القسمة)؛ لإيجاد الناتج في كلِّ ممَّا يأتي:


$$(4r^3 - 8r^2 - 13r + 20) \div (2r - 5) \quad (13)$$

$$\frac{3x^3 - 16x^2 + 9x - 24}{x - 5} \quad (14)$$

استعمل القسمة التركيبية؛ لإيجاد الناتج في كلِّ ممَّا يأتي:

$$(4x^3 - 6x^2 + 6x - 3) \div (2x - 1) \quad (15)$$

$$(x^4 + 3x^3 - 2x^2 - 4x + 10) \div (x + 3) \quad (16)$$



(17) استعمل القسمة الطويلة لإيجاد ناتج:  
 $(x^2 + 2x - 24) \div (x - 4)$

حلول كتبي

بسط كلِّ مما يأتي:

$$(15-3i)-(4-12i)(2) \quad \sqrt{-81} \quad (1)$$

$$\frac{3-i}{2+5i}(4) \quad i^{37} \quad (3)$$

حل كلِّ من المعادلتين الآتيتين:

$$x^2 - 8x - 9 = 0 \quad (5)$$

$$-4.8x^2 + 1.6x + 24 = 0 \quad (6)$$


بسط كلِّ مما يأتي مفترضاً أن أيّاً من المتغيرات لا يساوي صفراً:

$$4t(3rt - r) \quad (8) \quad (3x^2y^{-3})(-2x^3y^5) \quad (7)$$

$$\left(\frac{p^2r^3}{pr^4}\right)^2 \quad (10) \quad \frac{3a^4b^3c}{6a^2b^5c^3} \quad (9)$$

$$(4m^2 - 6m + 5) - (6m^2 + 3m - 1) \quad (11)$$

(12) اختيار من متعدد: إذا علمت أن حجم متوازي المستطيلات في الشكل أدناه هو  $6x^3 + 19x^2 + 2x - 3$ ، فأَيُّ كثيرة حدود فيما يأتي تمثل مساحة قاعدته؟



$$6x^4 + 37x^3 + 59x^2 + 3x - 9 \quad A$$

$$6x^2 + x + 1 \quad B$$

$$6x^2 + x - 1 \quad C$$

$$6x + 1 \quad D$$







## دوال كثيرات الحدود Polynomial Functions

### لماذا؟

يمكن تمثيل حجم الهواء في رئتي الإنسان خلال دورة تنفس مدتها  $t$  ثانية بالدالة:  $v(t) = -0.037t^3 + 0.152t^2 + 0.173t$ ، حيث  $v$  الحجم بالترات،  $t$  الزمن بالثواني. وهذه الدالة مثال على دالة كثيرة حدود.



### فيما سبق:

درست تحليل التمثيل البياني للدوال التربيعية. (مهارة سابقة)

### والآن:

- أجد قيم دوال كثيرات الحدود.
- أتعرف الأشكال العامة للتمثيل البياني لدوال كثيرات الحدود، وأحدد عدد أصفارها الحقيقية.

### المفردات:

كثيرة حدود بمتغير واحد  
polynomial in one variable

المعامل الرئيس  
leading coefficient

دالة كثيرة الحدود  
polynomial function

دالة القوة  
power function

سلوك طرفي التمثيل البياني  
end behavior

صفر الدالة  
zero of a function

**دوال كثيرات الحدود:** كثيرة الحدود بمتغير واحد هي عبارة جبرية على الصورة:

$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ ، حيث  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$  أعداد حقيقية،  $a_n \neq 0$ ،  $n$  عدد صحيح غير سالب. وتكون كثيرة الحدود مكتوبة بالصيغة القياسية إذا كانت أسس المتغير في حدودها مرتبة ترتيباً تنازلياً، ودرجة كثيرة الحدود هي أس المتغير ذي أكبر أس فيها، ويُسمى معامل الحد الأول في كثيرة الحدود المكتوبة بالصيغة القياسية المعامل الرئيس.

المعامل الرئيس	الدرجة	مثال	كثيرة الحدود
12	0	12	الثابتة
4	1	$4x - 9$	الخطية
5	2	$5x^2 - 6x - 9$	التربيعية
8	3	$8x^3 + 12x^2 - 3x + 1$	التكعيبية
$a_n$	$n$	$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$	الصيغة العامة

### مثال 1 درجة كثيرة الحدود ومعاملها الرئيس

حدد الدرجة والمعامل الرئيس لكل كثيرة حدود بمتغير واحد فيما يأتي، وإذا لم تكن كثيرة حدود بمتغير واحد، فاذكر السبب:

(a)  $8x^5 - 4x^3 + 2x^2 - x - 3$

هذه كثيرة حدود بمتغير واحد، وأكبر أس للمتغير فيها 5، لذا درجتها 5، والمعامل الرئيس 8.

(b)  $12x^2 - 3xy + 8x$

هذه ليست كثيرة حدود بمتغير واحد؛ فهناك متغيران هما  $x, y$ .

(c)  $3x^4 + 6x^3 - 4x^8 + 2x$

هذه كثيرة حدود بمتغير واحد، وأكبر أس للمتغير فيها 8، لذا درجتها 8، والمعامل الرئيس -4.

### تحقق من فهمك

(1A)  $5x^3 - 4x^2 - 8x + \frac{4}{x}$  (1B)  $5x^6 - 3x^4 + 12x^3 - 14$  (1C)  $2x^3 - x^6 + 3$



**دالة كثيرة الحدود** هي دالة متصلة يمكن وصفها بمعادلة كثيرة حدود بمتغير واحد، فمثلاً  $f(x) = 3x^3 - 4x + 6$  دالة كثيرة حدود تكعيبية. وتكتب أبسط دوال كثيرات الحدود على الصورة  $f(x) = ax^b$ ، حيث  $a$  عدد حقيقي،  $b$  عدد صحيح غير سالب، وتسمى عندئذٍ **دوال القوة**.  
إذا علمت عنصرًا في مجال دالة كثيرة حدود، تستطيع معرفة القيمة المقابلة له في المدى.



### الربط مع الحياة

تصل سعة الرئة لدى الشخص البالغ السليم إلى 6 لترات تقريباً.

### مثال 2 من واقع الحياة إيجاد قيمة دالة كثيرة حدود

**التنفس:** ارجع إلى الفقرة في بداية الدرس، وأوجد حجم الهواء في الرئتين خلال دورة تنفس مدتها ثانيان. بتعويض العدد 2 في الدالة نجد  $v(2)$ ، وهو حجم الهواء في الرئتين خلال دورة تنفس مدتها ثانيين.

الدالة الأصلية	$v(t) = -0.037t^3 + 0.152t^2 + 0.173t$
عوض 2 بدلاً من $t$	$v(2) = -0.037(2)^3 + 0.152(2)^2 + 0.173(2)$
بسّط	$= -0.296 + 0.608 + 0.346$
اجمع	$= 0.658 \text{ L}$

تحقق من فهمك

(2) **تنفس:** أوجد حجم الهواء في الرئتين خلال دورة تنفس مدتها 4 ثوانٍ.

يمكنك إيجاد قيم الدوال عند متغيرات وعبارات جبرية.

### مثال 3 قيمة دالة كثيرة الحدود عند متغير

إذا كانت  $f(x) = x^2 + 2x - 3$ ، فأوجد:  $f(3c - 4) - 5f(c)$ .

لإيجاد قيمة  $f(3c - 4)$ ، عوض  $3c - 4$  بدلاً من  $x$  في الدالة  $f(x)$

الدالة الأصلية	$f(x) = x^2 + 2x - 3$
عوض $3c - 4$ بدلاً من $x$	$f(3c - 4) = (3c - 4)^2 + 2(3c - 4) - 3$
اضرب	$= 9c^2 - 24c + 16 + 6c - 8 - 3$
بسّط	$= 9c^2 - 18c + 5$

لإيجاد قيمة  $5f(c)$ ، عوض  $c$  بدلاً من  $x$  في الدالة  $f(x)$ ، واضرب الناتج في العدد 5.

الدالة الأصلية	$f(x) = x^2 + 2x - 3$
عوض $c$ بدلاً من $x$	$5f(c) = 5(c^2 + 2c - 3)$
خاصية التوزيع	$= 5c^2 + 10c - 15$

والآن أوجد قيمة  $f(3c - 4) - 5f(c)$ .

$$f(3c - 4) - 5f(c) = (9c^2 - 18c + 5) - (5c^2 + 10c - 15)$$

$$= 9c^2 - 18c + 5 - 5c^2 - 10c + 15$$

$$= 4c^2 - 28c + 20$$

تحقق من فهمك


(3A) إذا كانت  $g(x) = x^2 - 5x + 8$ ، فأوجد  $g(5a - 2) + 3g(2a)$ .

(3B) إذا كانت  $h(x) = 2x^2 + 5x + 3$ ، فأوجد  $h(-4d + 3) - 0.5h(d)$ .





**التمثيل البياني لدوال كثيرات الحدود:** إن التمثيل البياني لدالة كثيرة حدود يظهر عدد المرات التي قد يقطع فيها هذا التمثيل المحور  $x$ ، وهذا العدد يمثل درجة كثيرة الحدود.



مجال دالة كثيرة الحدود هو مجموعة الأعداد الحقيقية ويُحدد سلوك طرفي التمثيل البياني للدالة  $f(x)$  عندما تقترب  $x$  من المالانهاية  $(x \rightarrow +\infty)$ ، أو سالب المالانهاية  $(x \rightarrow -\infty)$  بكل من: درجة دالة كثيرة الحدود والمعامل الرئيس لها.

### قراءة الرياضيات

**الرمزان  $+\infty$  ,  $-\infty$**   
 نعبر عن التزايد غير المحدود لقيم المتغير  $x$ ، باستعمال الرمز  $+\infty$  ويُقرأ ما لا نهاية ويُكتب  $x \rightarrow +\infty$ .  
 كما نعبر عن التناقص غير المحدود لقيم المتغير  $x$ ، باستعمال الرمز  $-\infty$  ويُقرأ سالب ما لا نهاية ويُكتب  $x \rightarrow -\infty$ .

أضف إلى

مطوبتك

### سلوك طرفي التمثيل البياني لدالة كثيرة الحدود

### مفهوم أساسي

<p><b>الدرجة: فردية</b>  <b>المعامل الرئيس: موجب</b></p> <p>المجال: مجموعة الأعداد الحقيقية                      المدى: مجموعة الأعداد الحقيقية</p> <p>سلوك طرفي التمثيل البياني: (في اتجاهين مختلفين)</p> <p>عندما <math>x \rightarrow -\infty</math> فإن <math>f(x) \rightarrow -\infty</math>                      عندما <math>x \rightarrow +\infty</math> فإن <math>f(x) \rightarrow +\infty</math></p>	<p><b>الدرجة: زوجية</b>  <b>المعامل الرئيس: موجب</b></p> <p>المجال: مجموعة الأعداد الحقيقية                      المدى: مجموعة الأعداد الحقيقية الأكبر من أو التي تساوي القيمة الصغرى.</p> <p>سلوك طرفي التمثيل البياني: (في الاتجاه نفسه)</p> <p>عندما <math>x \rightarrow -\infty</math> فإن <math>f(x) \rightarrow +\infty</math>                      عندما <math>x \rightarrow +\infty</math> فإن <math>f(x) \rightarrow +\infty</math></p>
<p><b>الدرجة: فردية</b>  <b>المعامل الرئيس: سالب</b></p> <p>المجال: مجموعة الأعداد الحقيقية                      المدى: مجموعة الأعداد الحقيقية</p> <p>سلوك طرفي التمثيل البياني: (في اتجاهين مختلفين)</p> <p>عندما <math>x \rightarrow -\infty</math> فإن <math>f(x) \rightarrow +\infty</math>                      عندما <math>x \rightarrow +\infty</math> فإن <math>f(x) \rightarrow -\infty</math></p>	<p><b>الدرجة: زوجية</b>  <b>المعامل الرئيس: سالب</b></p> <p>المجال: مجموعة الأعداد الحقيقية                      المدى: مجموعة الأعداد الحقيقية الأقل من أو التي تساوي القيمة العظمى</p> <p>سلوك طرفي التمثيل البياني: (في الاتجاه نفسه)</p> <p>عندما <math>x \rightarrow -\infty</math> فإن <math>f(x) \rightarrow -\infty</math>                      عندما <math>x \rightarrow +\infty</math> فإن <math>f(x) \rightarrow -\infty</math></p>

### إرشادات للدراسة

**سلوك طرفي التمثيل البياني**  
 المعامل الرئيس ودرجة كثيرة الحدود هما العاملان الوحيدان في تحديد سلوك طرفي التمثيل البياني.



**صفر الدالة** هو الإحداثي  $x$  لنقطة تقاطع التمثيل البياني للدالة مع المحور  $x$ ، لذا فإنه يمكن تحديد عدد الأصفار المنتمية لمجموعة الأعداد الحقيقية لمعادلة كثيرة الحدود من التمثيل البياني لدالة كثيرة الحدود المرتبطة بها. تذكر أن مقاطع  $x$  تحدد هذه الأصفار؛ ولذا فإن عدد مرات تقاطع التمثيل البياني مع محور  $x$  يساوي عدد هذه الأصفار.

### إرشادات للدراسة

**الصفر المكرر**  
عندما يمس التمثيل البياني المحور  $x$ ، يكون للدالة صفراً متساويان (صفر مكرر).

### مفهوم أساسي


#### أصفار الدوال الفردية والزوجية الدرجة

أضف إلى


مطوبتك

يكون للدوال الفردية الدرجة عدد فردي من الأصفار المنتمية لمجموعة الأعداد الحقيقية، ويكون للدوال الزوجية الدرجة عدد زوجي من الأصفار أو لا يكون لها أصفار تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية.

كثيرتا حدود فرديتا الدرجة




لها صفر واحد حقيقي




لها 3 أصفار حقيقية

كثيرتا حدود زوجيتا الدرجة



لها 4 أصفار حقيقية




ليس لها أصفار حقيقية

### مثال 4


#### وصف دالة كثيرة الحدود من تمثيلها البياني

أجب عن الأسئلة الآتية لكل من التمثيلين البيانيين أدناه:

- صف سلوك طرفي التمثيل البياني.
- حدد ما إذا كانت درجة دالة كثيرة الحدود فردية أم زوجية.
- اذكر عدد الأصفار الحقيقية للدالة.



عندما  $x \rightarrow -\infty$   $f(x) \rightarrow +\infty$   
عندما  $x \rightarrow +\infty$   $f(x) \rightarrow -\infty$





عندما  $x \rightarrow -\infty$   $f(x) \rightarrow -\infty$   
عندما  $x \rightarrow +\infty$   $f(x) \rightarrow -\infty$

بما أن سلوك طرفي التمثيل البياني في اتجاهين مختلفين، فالدالة فردية الدرجة، وبما أن التمثيل البياني للدالة يقطع المحور  $x$  في 5 نقاط؛ لذا فللدالة 5 أصفار حقيقية.

بما أن سلوك طرفي التمثيل البياني في الاتجاه نفسه، فالدالة زوجية الدرجة، وبما أن التمثيل البياني للدالة يقطع المحور  $x$  في نقطتين؛ لذا فللدالة صفراً حقيقياً.

### تحقق من فهمك



وزارة التعليم

Ministry of Education

2021 - 1443



**مثال 1** حدد الدرجة والمعامل الرئيس لكل كثيرة حدود بمتغير واحد فيما يأتي، وإذا لم تكن كثيرة حدود بمتغير واحد فاذكر السبب:

$$11x^6 - 5x^5 + 4x^2 \quad (1) \quad -10x^7 - 5x^3 + 4x - 22 \quad (2)$$

$$14x^4 - 9x^3 + 3x - 4y \quad (3) \quad 8x^5 - 3x^2 + 4xy - 5 \quad (4)$$

**مثال 2** أوجد  $w(5)$ ,  $w(-4)$  لكل من الدالتين الآتيتين:


$$w(x) = -2x^3 + 3x - 12 \quad (5) \quad w(x) = 2x^4 - 5x^3 + 3x^2 - 2x + 8 \quad (6)$$

**مثال 3** إذا كانت  $c(x) = 4x^3 - 5x^2 + 2$ ,  $d(x) = 3x^2 + 6x - 10$  فأوجد كلًا مما يأتي:

$$c(y^3) \quad (7) \quad -4[d(3z)] \quad (8)$$

$$6c(4a) + 2d(3a - 5) \quad (9) \quad -3c(2b) + 6d(4b - 3) \quad (10)$$



**مثال 4** أجب عن الفروع  $a - c$  لكل من التمثيلين البيانيين أدناه:



(a) صف سلوك طرفي التمثيل البياني.

(b) حدد ما إذا كانت درجة دالة كثيرة الحدود فردية أم زوجية.

(c) اذكر عدد الأصفار الحقيقية للدالة.



## تمارين ومسائل

**مثال 1** حدد الدرجة والمعامل الرئيس لكل كثيرة حدود بمتغير واحد فيما يأتي، وإذا لم تكن كثيرة حدود بمتغير واحد فاذكر السبب:

$$-6x^6 - 4x^5 + 13xy \quad (13) \quad 3a^7 - 4a^4 + \frac{3}{a} \quad (14)$$

$$8x^5 - 12x^6 + 14x^3 - 9 \quad (15) \quad -12 - 8x^2 + 5x - 21x^7 \quad (16)$$

$$13b^3 - 9b + 3b^5 - 18 \quad (17) \quad (5 - 2y)(4 + 3y) \quad (18)$$

$$6x^5 - 5x^4 + 2x^9 - 3x^2 \quad (19) \quad 7x^4 + 3x^7 - 2x^8 + 7 \quad (20)$$

**مثال 2** أوجد  $p(-6)$ ,  $p(3)$  لكل دالة مما يأتي:

$$p(x) = x^4 - 2x^2 + 3 \quad (21) \quad p(x) = x^4 - 4x^3 + 3x^2 - 5x + 24 \quad (22)$$

$$p(x) = -x^3 + 3x^2 - 5 \quad (23) \quad p(x) = 2x^4 + x^3 - 4x^2 \quad (24)$$

**مثال 3** إذا كانت  $c(x) = 2x^2 - 4x + 3$ ,  $d(x) = -x^3 + x + 1$  فأوجد كلًا مما يأتي:

$$c(3a) \quad (25) \quad 5d(2a) \quad (26) \quad c(b^2) \quad (27)$$

$$d(4a^2) \quad (28) \quad d(4y - 3) \quad (29) \quad c(y^2 - 1) \quad (30)$$








مثال 4

أجب عن الفروع من a-c لكل التمثيلات البيانية الآتية:

- (a) صف سلوك طرفي التمثيل البياني.  
 (b) حدد ما إذا كانت درجة دالة كثيرة الحدود فردية أم زوجية.  
 (c) اذكر عدد الأصفار الحقيقية للدالة.



(34) **فيزياء:** تعطى الطاقة الحركية  $KE$  بالاجول لجسم متحرك كتلته  $m$  kg بالدالة  $KE(v) = 0.5mv^2$ ، حيث تمثل  $v$  سرعة الجسم بالأمتار لكل ثانية. أوجد الطاقة الحركية لعربة كتلتها 171 kg تسير بسرعة  $11m/s$ .

أوجد  $f(-2), f(8)$  لكل دالة مما يأتي:





$$f(x) = \frac{1}{8}x^4 - \frac{3}{2}x^3 + 12x - 18 \quad (36)$$

$$f(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^3 - 4x^2 \quad (35)$$

$$f(x) = \frac{5}{8}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{4}x + 10 \quad (38)$$

$$f(x) = \frac{3}{4}x^4 - \frac{1}{8}x^2 + 6x \quad (37)$$

حدّد التمثيل البياني المناسب لكل دالة في الأسئلة (39-42) مستعملًا درجة كثيرة الحدود وسلوك طرفي التمثيل البياني لها.



$$f(x) = -2x^2 + 8x + 5 \quad (40)$$

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 4x \quad (39)$$

$$f(x) = -4x^3 - 4x^2 + 8 \quad (42)$$

$$f(x) = x^4 - 3x^2 + 6x \quad (41)$$

إذا كانت  $c(x) = x^3 - 2x, d(x) = 4x^2 - 6x + 8$ ، فأوجد كلاً مما يأتي:

$$-2d(2a + 3) - 4c(a^2 + 1) \quad (44)$$

$$3c(a - 4) + 3d(a + 5) \quad (43)$$

$$-7d(a^3) + 6c(a^4 + 1) \quad (46)$$

$$5c(a^2) - 8d(6 - 3a) \quad (45)$$

(47) **ملايس:** تُمثل أرباح مصنع للملابس بدالة كثيرة الحدود  $w(x) = -x^4 + 40x^2 - 144$ ، حيث  $x$  عدد قطع الملابس المباعة بالألوف، و  $w(x)$  ربح المصنع بألوف الريالات.

- (a) أنشئ جدولاً لتمثيل الدالة بيانياً، ثم مثلها (استعمل قيم  $x$  التالية:  $-7, -6, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 4, 6, 7$ ).  
 (b) أوجد أصفار الدالة.

(c) بين أي قيمتين يجب أن يبيع المصنع من قطع الملابس ليحقق ربحاً.

(d) وضح لماذا أخذ صفراً فقط بعين الاعتبار في الفرع c.



الربط مع الحياة

فن صناعة تصميم الملابس يعتمد على العلم والجمال، ويقوم على عدة عناصر متكامل من حيث الخط والشكل واللون والنسيج، وتناسق من حيث التصميم والابتكار ليحصل الفرد في النهاية على زي يشعره بالتناسق، ويراعى مراحل ترتيب قياسية في مراحل إنتاج الملابس الجاهزة. وتنتج الملابس من الألياف الصناعية بجانب الألياف الطبيعية والمخلوطة ذات الطبيعة الخاصة.





(48) تمثيلات متعددة: افترض أن  $g(x) = (x-2)(x+1)(x-3)(x+4)$ .

- (a) تحليلياً: حدد المقطع  $x$  والمقطع  $y$  والجذور، ودرجة الدالة  $g(x)$ ، وصف سلوك طرفي تمثيلها البياني.  
 (b) جبرياً: اكتب الدالة بالصيغة القياسية.  
 (c) جدولياً: أنشئ جدولاً لتمثيل الدالة بيانياً، ثم مثلها.  
 (d) بيانياً: مثل الدالة بيانياً بتعيين نقاط، والتوصيل بينها بمنحنى.


صف سلوك طرفي التمثيل البياني لكل دالة فيما يأتي:

(51)  $h(x) = -4x^7 + 8x^6 - 4x$

(50)  $g(x) = 2x^5 + 6x^4$

(49)  $f(x) = -5x^4 + 3x^2$

### مسائل مهارات التفكير العليا



(52) اكتشف الخطأ: حدّد كل من ماجد وبدر عدد أصفار التمثيل البياني المجاور. فأيهما إجابته صحيحة؟ فسّر إجابتك.

**بدر**  
يوجد 7 أصفار، لأن التمثيل البياني يقطع المحور  $x$  سبع مرات.

**ماجد**  
يوجد 8 أصفار، لأن التمثيل البياني يقطع المحور  $x$  7 مرات، وأحد الجذور مكرر مرتين.

- (53) تحدّد: إذا كانت  $g(x)$  من عوامل  $f(x)$ ، وكانت درجة  $f(x)$  تساوي 5، ومعاملها الرئيس موجباً، وكانت درجة  $g(x)$  تساوي 3 ومعاملها الرئيس موجباً، فصف سلوك طرفي التمثيل البياني للدالة  $\frac{f(x)}{g(x)}$ ، وفسّر إجابتك.  
 (54) مسألة مفتوحة: مثل بيانياً كثيرة حدود زوجية الدرجة عدد جذورها 8، وأحدها مكرر مرتين.  
 (55) اكتب: صف المقصود بسلوك طرفي التمثيل البياني لدالة كثيرة حدود، وكيف يتم تحديده؟

### تدريب على اختبار

(57) إذا كان  $i = \sqrt{-1}$ ، فإن  $5i(7i)$  يساوي:

- A 70  
B 35  
C -35  
D -70

(56) ما باقي قسمة  $x^3 - 7x + 5$  على  $x + 3$ ؟

- A -11  
B 1  
C -1  
D 11

### مراجعة تراكمية

بسّط كل عبارة مما يأتي: (الدرس 3-4)

(60)  $\frac{18c^5d^2 - 3c^2d^2 + 12a^5c^3d^4}{3c^2d^2}$

(59)  $\frac{18ab^4c^5 - 30a^4b^3c^2 + 12a^5bc^3}{6abc^2}$

(58)  $\frac{16x^4y^3 + 32x^6y^5z^2}{8x^2y}$

حدد ما إذا كانت كل عبارة مما يأتي كثيرة حدود أم لا، وإن كانت كذلك فاذكر درجتها: (الدرس 3-3)

(63)  $3x^4 + 2x^2 - x^{-1}$

(62)  $9x^4 + 12x^6 - 16$

(61)  $8x^2 + 5x^4 - 6x + 4$

(66)  $x^2 - 13x + 12 = 0$

حل كلاً من المعادلات الآتية مستعملاً القانون العام لحل المعادلة التربيعية: (الدرس 3-2)


(65)  $x + x^2 + 1 = 0$

(64)  $x^2 - x - 3 = 0$





## حل معادلات كثيرات الحدود Solving Polynomial Equations



قُطع مكعب صغير من آخر كبير كما في الشكل المجاور، وأُعطي حجم الجزء المتبقي والعلاقة بين بعدي المكعبين، والمطلوب إيجاد أبعاد المكعبين الصغير والكبير. لاحظ أنه يمكن إيجادها بتحليل كثيرة الحدود التكعيبة  $x^3 - y^3$ .

لماذا؟

فيما سبق:

درست حل معادلات تربيعية بالتحليل إلى العوامل.  
(الدرس 2-3)

والآن:

- أحلل كثيرات الحدود.
- أحل معادلات كثيرات الحدود بالتحليل إلى العوامل.

**تحليل كثيرات الحدود:** تعلمت سابقاً أنه يمكنك تحليل كثيرات الحدود

التربيعية تماماً كما تحلل الأعداد الكلية، ولكن عواملها ستكون كثيرات حدود أخرى، وكما هو الحال في كثيرات الحدود التربيعية يمكنك تحليل بعض كثيرات الحدود التكعيبة بقوانين خاصة.

المفردات

- كثيرة حدود أولية  
prime polynomial
- الصورة التربيعية  
quadratic form

أضف إلى

مطوبتك

مجموع مكعبين والفرق بينهما

مفهوم أساسي

الحالة العامة	طريقة التحليل
$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$	مجموع مكعبين
$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$	الفرق بين مكعبين

تُسمى كثيرة الحدود التي لا يمكن تحليلها إلى كثيرتي حدود درجة كل منهما أقل من درجة كثيرة الحدود المُعطاة **كثيرة حدود أولية**.

مجموع مكعبين والفرق بينهما

مثال 1

حلل كلاً من كثيرتي الحدود الآتيتين تحليلاً تاماً، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فاكتب كثيرة حدود أولية:

(a)  $16x^4 + 54xy^3$

أخرج العامل المشترك الأكبر

$$16x^4 + 54xy^3 = 2x(8x^3 + 27y^3)$$

كل من  $8x^3$  و  $27y^3$  مكعب كامل، لذا تستطيع استعمال طريقة مجموع مكعبين.

$$8x^3 = (2x)^3; 27y^3 = (3y)^3$$

$$8x^3 + 27y^3 = (2x)^3 + (3y)^3$$

مجموع مكعبين

$$= (2x + 3y)[(2x)^2 - (2x)(3y) + (3y)^2]$$

بسّط

$$= (2x + 3y)(4x^2 - 6xy + 9y^2)$$

اكتب العامل المشترك الأكبر

$$16x^4 + 54xy^3 = 2x(2x + 3y)(4x^2 - 6xy + 9y^2)$$

(b)  $8y^3 + 5x^2$

الحد الأول مكعب كامل، لكن الحد الثاني ليس كذلك، لذا لا يمكن تحليل كثيرة الحدود باستعمال طريقة مجموع مكعبين، ولا يمكن تحليلها كذلك بطرائق تحليل كثيرات الحدود التربيعية، أو بإخراج العامل المشترك الأكبر؛ لذا فهي كثيرة حدود أولية.



تحقق من فهمك



وزارة التعليم

Ministry of Education

2021 - 1443


(1B)  $-54w^4 - 250wz^3$

(1A)  $5y^4 - 320yz^3$



يلخص الجدول الآتي معظم الطرائق المستعملة لتحليل كثيرات الحدود، وعندما تريد تحليل كثيرة حدود ابحث أولاً عن العامل المشترك الأكبر، ثم حدد ما إذا كانت كثيرة الحدود الناتجة بعد إخراج العامل المشترك الأكبر قابلة للتحليل أم لا مستعملاً واحدة أو أكثر من الطرائق المذكورة في الجدول أدناه:

ملخص المفهوم	طرائق التحليل	عدد الحدود
أضف إلى مطويتك		
نموذج	طريقة التحليل	عدد الحدود
$4a^3b^2 - 8ab = 4ab(a^2b - 2)$	إخراج العامل المشترك الأكبر	أي عدد
$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$	الفرق بين مربعين مجموع مكعبين الفرق بين مكعبين	حدان
$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$	ثلاثية حدود المربع الكامل	ثلاثة حدود
$acx^2 + (ad + bc)x + bd = (ax + b)(cx + d)$	ثلاثية الحدود بالصورة العامة	
$ax + bx + ay + by = x(a + b) + y(a + b)$ $= (a + b)(x + y)$	تجميع الحدود	أربعة حدود أو أكثر



## مثال 2 التحليل بتجميع الحدود

حلّل كلّاً من كثيرتي الحدود الآتيتين تحليلاً تاماً، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فاكتب كثيرة حدود أولية:

$$(a) \quad 8ax + 4bx + 4cx + 6ay + 3by + 3cy$$

العبرة الأصلية

جمع لإخراج العامل المشترك الأكبر

أخرج العامل المشترك الأكبر لكل تجميع

خاصية التوزيع

$$\begin{aligned} & 8ax + 4bx + 4cx + 6ay + 3by + 3cy \\ &= (8ax + 4bx + 4cx) + (6ay + 3by + 3cy) \\ &= 4x(2a + b + c) + 3y(2a + b + c) \\ &= (4x + 3y)(2a + b + c) \end{aligned}$$

$$(b) \quad 20fy - 16fz + 15gy + 8hz - 10hy - 12gz$$

العبرة الأصلية

جمع لإخراج العامل المشترك الأكبر

أخرج العامل المشترك الأكبر لكل تجميع

خاصية التوزيع

$$\begin{aligned} & 20fy - 16fz + 15gy + 8hz - 10hy - 12gz \\ &= (20fy + 15gy - 10hy) + (-16fz - 12gz + 8hz) \\ &= 5y(4f + 3g - 2h) - 4z(4f + 3g - 2h) \\ &= (5y - 4z)(4f + 3g - 2h) \end{aligned}$$

تحقق من فهمك

$$(2A) \quad 30ax - 24bx + 6cx - 5ay^2 + 4by^2 - cy^2$$

$$(2B) \quad 13ax + 18bz - 15by - 14az$$

### إرشادات للدراسة

التحقق من الإجابة؛  
للتحقق من صحة إجابتك، اضرب العوامل لتتحقق من صحة تحليل كثيرة الحدود.

تُعد طريقة التحليل بتجميع الحدود هي الطريقة الأساسية لتحليل كثيرات الحدود المكونة من أربعة حدود أو أكثر، أما كثيرات الحدود المتضمنة حدين أو ثلاثة حدود فيمكنك تحليلها اعتماداً على إحدى الطرائق الموجودة في الجدول أعلاه.



### مثال 3

#### التحليل باستعمال الفرق بين مربعين، ومجموع مكعبين، والفرق بين مكعبين

حلّل كلاً من كثيرتي الحدود الآتيتين، وإذا لم يكن ذلك ممكناً فاكتب كثيرة حدود أولية:

$$(a) \quad x^6 - y^6$$

يمكن اعتبار كثيرة الحدود هذه فرقاً بين مربعين أو فرقاً بين مكعبين، وفي مثل هذه الحالة يجب أن يتم التحليل أولاً على اعتبار أنها فرق بين مربعين قبل التحليل على اعتبار أنها فرق بين مكعبين؛ تسهياً للتحليل.

$$x^6 - y^6 = (x^3 + y^3)(x^3 - y^3)$$

مجموع مكعبين والفرق بين مكعبين

$$= (x + y)(x^2 - xy + y^2)(x - y)(x^2 + xy + y^2)$$

$$(b) \quad a^3x^2 - 6a^3x + 9a^3 - b^3x^2 + 6b^3x - 9b^3$$

بما أن كثيرة الحدود هذه من 6 حدود، إذن حلل أولاً بتجميع الحدود.

$$a^3x^2 - 6a^3x + 9a^3 - b^3x^2 + 6b^3x - 9b^3$$

$$= (a^3x^2 - 6a^3x + 9a^3) + (-b^3x^2 + 6b^3x - 9b^3)$$

$$= a^3(x^2 - 6x + 9) - b^3(x^2 - 6x + 9)$$

$$= (a^3 - b^3)(x^2 - 6x + 9)$$

$$= (a - b)(a^2 + ab + b^2)(x^2 - 6x + 9)$$

$$= (a - b)(a^2 + ab + b^2)(x - 3)^2$$

جمع لإخراج العامل المشترك الأكبر

أخرج العامل المشترك الأكبر لكل تجميع

خاصية التوزيع

الفرق بين مكعبين

ثلاثية حدود المربع الكامل

تحقق من فهمك


$$x^5 + 4x^4 + 4x^3 + x^2y^3 + 4xy^3 + 4y^3 \quad (3B)$$

$$a^6 + b^6 \quad (3A)$$

**حل معادلات كثيرات الحدود:** يمكنك تطبيق طرائق حل المعادلات التربيعية في حل معادلات كثيرات الحدود ذات الدرجات الأعلى من الدرجة الثانية.

#### حل معادلات كثيرات الحدود بالتحليل

#### مثال 4 من واقع الحياة



**هندسة:** ارجع إلى فقرة لماذا في بداية هذا الدرس. إذا كان طول حرف المكعب الصغير يساوي نصف طول ضلع المكعب الكبير، وحجم الجزء المتبقي  $7000\text{cm}^3$ ، فما بُعدا المكعبين؟

بما أن طول حرف المكعب الصغير يساوي نصف طول ضلع المكعب الكبير فيمكن أن يعبر عن طول ضلع المكعب الصغير بـ  $x$ ، وطول ضلع المكعب الكبير بـ  $2x$ . لاحظ أن حجم الجزء المتبقي يساوي حجم المكعب الكبير مطروحاً منه حجم المكعب الصغير.

حجم الجزء المتبقي

$$8x^3 = (2x)^3$$

بالطرح

اقسم على 7 للطرفين

اطرح 1000 من كلا الطرفين

فرق بين مكعبين

خاصية الضرب الصفري

$$(2x)^3 - x^3 = 7000$$

$$8x^3 - x^3 = 7000$$

$$7x^3 = 7000$$

$$x^3 = 1000$$

$$x^3 - 1000 = 0$$

$$(x - 10)(x^2 + 10x + 100) = 0$$

$$x^2 + 10x + 100 = 0 \quad \text{أو} \quad x - 10 = 0$$

$$x = -5 \pm 5i\sqrt{3} \quad x = 10$$

وبما أن العدد 10 هو الحل الحقيقي الوحيد. فإن طولي ضلعي المكعبين هما  $10\text{cm}$ ,  $20\text{cm}$ .

تحقق من فهمك

**4 هندسة:** إذا كان طول حرف المكعب الصغير ثلث طول ضلع المكعب الكبير، وحجم الجزء المتبقي  $3250\text{cm}^3$ ، فأوجد بُعدا المكعبين.



تستطيع أحياناً أن تكتب كثيرة حدود فيها المتغير  $x$  على الصورة  $au^2 + bu + c$ ، فمثلاً بفرض أن  $u = x^2$ ، يمكنك كتابة كثيرة الحدود  $x^4 + 12x^2 + 32$  على الصورة  $(x^2)^2 + 12(x^2) + 32$  أو  $u^2 + 12u + 32$ . وكثيرة الحدود الجديدة هذه تكافئ كثيرة الحدود الأصلية، ولكنها مكتوبة على الصورة التربيعية.

**مفهوم أساسي** الصورة التربيعية

أضف إلى مطوبتك

التعبير اللفظي: الصورة التربيعية لكثيرة الحدود هي:  $au^2 + bu + c$ ،  $a \neq 0$ ،  $a, b, c$  أعداد حقيقية، ويمكن أن نكتب بعض كثيرات الحدود في المتغير  $x$  على هذه الصورة، وذلك بعد تعريف  $u$  بدلالة  $x$ .

مثال:  $12x^6 + 8x^3 + 1 = 3(2x^3)^2 + 4(2x^3) + 1$

**إرشادات للدراسة**

الصورة التربيعية

لكتابة كثيرة حدود على الصورة التربيعية، اختر العبارة المكافئة لـ  $u$  بالنظر إلى الحدود التي تحوي متغيرات، واهتم خصوصاً بأسس المتغير الأصلي في تلك الحدود. فهناك كثيرات حدود لا يمكن كتابتها على الصورة التربيعية.

**مثال 5** كتابة عبارات في الصورة التربيعية

اكتب كلاً من العبارتين الآتيتين في الصورة التربيعية إن أمكن ذلك:

(a)  $150n^8 + 40n^4 - 15$

ابحث عن عاملين للعدد 150؛ أحدهما مربع كامل، وعن عاملين للعدد 40؛ أحدهما الجذر التربيعي لأحد عاملي العدد 150.

$150 = 6 \times 25$ ,  $40 = 8 \times 5$   $150n^8 + 40n^4 - 15 = 6 \times 25n^8 + 8 \times 5n^4 - 15$

$25n^8 = (5n^4)^2$   $= 6(5n^4)^2 + 8(5n^4) - 15$

(b)  $y^8 + 12y^3 + 8$

لا يمكن كتابتها على الصورة التربيعية؛ لأن  $(y^3)^2 \neq y^8$ .

**تحقق من فهمك**

(5A)  $x^4 + 5x + 6$  (5B)  $8x^4 + 12x^2 + 18$

يمكنك في بعض الأحيان استعمال الصورة التربيعية لحل معادلات كثيرات الحدود ذات درجات أكبر من الدرجة الثانية.

**مثال 6** حل معادلات كثيرات الحدود باستعمال الصورة التربيعية

حل المعادلة:  $18x^4 - 21x^2 + 3 = 0$

المعادلة الأصلية	$18x^4 - 21x^2 + 3 = 0$
$18x^4 = 2(3x^2)^2$	$2(3x^2)^2 - 7(3x^2) + 3 = 0$
افرض أن $u = 3x^2$	$2u^2 - 7u + 3 = 0$
حلل إلى العوامل	$(2u - 1)(u - 3) = 0$
خاصية الضرب الصفري	$u = 3$ أو $u = \frac{1}{2}$
عوض $3x^2$ بدلاً من $u$	$3x^2 = 3$ $3x^2 = \frac{1}{2}$
اقسم على 3	$x^2 = 1$ $x^2 = \frac{1}{6}$
أوجد الجذر التربيعي	$x = \pm 1$ $x = \pm \frac{\sqrt{6}}{6}$

حلول المعادلة هي:  $1, -1, \frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{6}$ .

**تحقق من فهمك**

(6A)  $4x^4 - 8x^2 + 3 = 0$  (6B)  $8x^4 + 10x^2 - 12 = 0$